

GOSUINUS JANUS LONCQ CORN. JAN. FILIUS, MEDICINAE PROFESSOR ULTRAIECTINUS *

EDUARDI SANDIFORT,

MEDICINÆ, ANATOMES, ET CHIRURGIÆ, IN ACADEMIA BATAVA, QUÆ LEIDÆ EST, PROFESSORIS

DESCRIPTIO MUSCULORUM HOMINIS.

LUGDUNI BATAVORUM,

APUD P. V. D. EYK ET D. VYGH,

MDCCLXXXI.

PRÆFATIO.

Mirabuntur, nec immerito, qui nonnisi ad titulum hujus libri respiciunt, me, post tot Celeberrimorum Anatomicorum labores, in illa Anatomes parte, quæ musculos explicat, post consummatissimam, & omni sensu perfectam, summi Albini Historiam, concinniorem hanc instrumentorum motus in lucem emisisse descriptionem, mirari autem desinent, & utilitatem, si quid video, agnoscent omnes, qui attenta mente eandem pervolverint.

PRÆFATIO.

Doluerunt ſæpius illi, qui auro cariores Albini Tabulas muſculorum inſpexerunt, non prodiisſe eorundem deſcriptionem, quæ, tabulis hisce accommodata, cum iisdem in uſum vocari poſſet, quemadmodum Anatomicorum ille Princeps, librum de Sceleto in lucem emittendo, tabulas oſſium reddidit utiliores. Impedivit autem ſummum virum, ſi forte tale quid meditatus fuerit, mors, quæ hoc eruditi orbis ornamentum, ante undecim annos, Palladi Leidenſi eripuit. Eodem anno in hanc Academiam vocatus, ſæpiusque ab eo tempore ad talem laborem excitatus, & quotannis perſpiciens, quantum in Auditores redundaret commodum, ſi compendium Ipſis offerrem, quod intricatam Muſculorum Hiſtoriam, ab Albino datam, intellectu faciliorem redderet, examinantibus Albinianas tabulas ad manus facile eſſe poſſet, quod breviſſime muſculorum naturam explicaret, repetendis & me-

mo-

moriæ imprimendis iis partibus, quæ quotidie in cadavere demonſtrantur, inſerviret, & in diſſectionibus ipſis viam monſtraret optimam, demum tempus, quod a multis, iisque diverſis, laboribus detrahere potui, componendo huic operi inſumendum eſſe, decrevi.

Perſpexerunt dudum talis libri utilitatem Anatomici, & elapſo jam ſeculo Cowperus myotomiam reformatam (a), hujus autem, quo vivimus, ævi initio Douglaſius comparatam muſculorum deſcriptionem (b), in lucem emiſerunt, paucique effluxerunt

(a) *Titulus hicce eſt: Myotomia Reformata; or a new Adminiſtration of all the Muſcles of humane bodies; wherein the true uſe of the muſcles are explained, the errors of former Anatomiſts concerning them confuted and ſeveral muſcles not hitherto taken notice of deſcribed. by William Cowper, ſurgeon. London* 1694. 8°.

(b) *Myographiæ comparatæ ſpecimen: or a comparative deſcription of all the Muſcles in a Mann and Quadruped by James Douglas London* 1707. 8°. *qui libellus prodiit Lugduni Batavorum titulo: Deſcriptio comparata muſculorum corporis humani & quadrupedis.*

runt anni, ex quo viri doctiſſimi, Innes (c) atque Walther (d), ſua compendia Studioſorum in utilitatem divulgarunt. Sed quanta inter eorum labores noſtrumque intercedat differentia, quisque, cui comparationem inſtituere placet, intelliget ſponte. Siſtit hicce muſculorum omnium, quales frequentius occurrunt, deſcriptiones, ex Albinianis tabulis compoſitas, quantum fieri potuit, concinnas, ſed exactas; quum autem duo tabularum genera ſint, quibus totam rem comprehendit, alterum, quod per totum corpus pertinentem muſculorum ſyntaxin, alterum, quod ſingulorum imagines, continet, opus hocce in duas ſectiones eſſe dividendum cenſui, prima de diviſione corporis in varias regiones egi,

mus-

(c) *A short deſcription of the human muſcles, chiefly as they appear on diſſection; together with their ſeveral uſes, and the ſynonyma of the beſt authors. by John Innes. Edinburgh.* 1776. 8°.

(d) *Myologiſches Handbuch zum gebrauche dererjenigen, die ſich in der Zergliederungskunſt üben auf dem Anatomiſchen Theater in Berlin. Berlin.* 1777. 8°.

musculos, in singulis regionibus sitos, enumeravi, cuique vero adscripsi icones, quibus ab Eustachio, nonnullisque aliis, sed præsertim ab Albino, in syntaxi exhibentur, sic ut situm, quem respectu aliorum habent omnes, inspectis tabulis citatis, cognoscere quisque possit; altera singulorum descriptiones dedi, & præcipue quidem illas Albini icones citavi, quæ musculum, de quo sermo est, solum aut una cum paucis aliis exhibent, omnes ipsius proprietates exactissime ob oculos ponunt; non vero illas solas adduxi. Quum enim Albinianæ tabulæ paucorum in manibus sint, nec semper conveniat, eas publicis in Bibliothecis examinare, Eustachius vero inter illos auctores merito recenseatur, quo carere nemo potest, qui corporis humani fabricam cognoscere cupit, antequam musculos, hac illave in regione sitos, exponerem, omnium, talem regionem occupantium, enumerationem præmisi, illasque ex Eustachianis

tabulis figuras adſcripſi, ex quibus muſculi egregie cognosci poſſunt, quin & cuique muſculo, in ipſa deſcriptione, omnium optimam iconem Euſtachianam addidi, ſicque effeci, ut etiam abſque Albinianis tabulis opus hocce eidem ſcopo, cui deſtinatum eſt, ut quippe Myologia rite addiſcatur, inſervire poſſit, modo tunc Euſtachianæ inſpiciantur tabulæ, & cum iis data ab Albino explicatio conferatur.

Licet autem ex Summi Anatomici tabulis, cum ipſo corpore ſæpius collatis, deſcriptionem hanc concinnaverim, tamen ſubinde ad Hiſtoriam Muſculorum mihi fuit recurrendum, in iis præcipue, quæ iconibus non exprimi potuerunt. Ne tamen credat quis, noſtri laboris talem eſſe naturam, ut dictæ Hiſtoria aut minoris aut nullius utilitatis dici debeat; de hac, de omnibus Albini ſcriptis, ſummo jure dicendum, quod de Veſalii operibus eo-

run-

rundem Editores celeberrimi professi sunt, neminem illis carere posse, qui res naturales, præstantiam hominis aut medicinam curat: utilitatem Albinianæ Historiæ hoc opere majorem reddere studui, de iis, quæ libro primo continentur, ne mentionem quidem feci; præter musculorum enumerationem, quæ libro secundo etiam datur, nihil eorum, quæ ille præterea continet, nostrum opus complectitur; quin & singulorum musculorum historia, libro tertio data, multo amplior est, insignem varietatum, in musculis observatarum, numerum; unius ejusdemque musculi diversas variorum auctorum denominationes continet, usumque omnium multo latius exponit: nostra descriptio compendium in usum eorum, qui Prælectionibus intersunt, illorum omnium, qui Anatomiæ operam dant, sistit, &, ut dictum, historiam musculorum comprehensu faciliorem reddit. Qui itaque instrumentorum motus notitiam

exactam ſibi comparare geſtit, primo breviorem noſtram deſcriptionem pervolvat, cum citatis iconibus, cum ipſo corpore, comparet, dein Albini Hiſtoriam menti imprimat, & fructus reportabit inſignes.

Difficilem, imo tædioſum, laborem fuiſſe, quem componendæ huic deſcriptioni impendere debui, agnoſcent, qui unquam tali operi manum admoverunt, hunc vero egregie compenſatum judicabo, ſi Anatomes cultoribus talem præſtiterit utilitatem, qualem inde hauriri poſſe, judico.

DESCRIPTIO MUSCULORUM HOMINIS.

SECTIO PRIMA.

Corporis in regiones divisio, musculorumque in singulis regionibus enumeratio.

Solent Anatomici corpus humanum in certas, a musculis occupatas, regiones distinguere, corpus viri universum in quadraginta & octo, fœminæ in quadraginta sex. Quadraginta quinque utrique communes sunt, virilis propriæ tres, fœminini una. Aliæ geminæ sunt, discretæque; id est dextræ & sinistræ; aliæ singulares ac mediæ, quæ tamen dextram partem similem habent sinistræ. In enumerandis hisce, & in describendis postea cunctis musculis in quaque regione inveniendis, is ordo optimus censendus, quo fere aliæ post alias a vertice ad extremas manus pedesque sequuntur, & secundum quem musculi simul in eodem corpore quæri possunt, sine notabili alicujus damno. Is autem hic est: Calva, quæ circa Auriculas, Facies, Malæ cum lateribus

Calvæ, Cava Oculorum, Auriculæ, Aures internæ, Collum, quæ ſub Malis, Pectus, latera Thoracis, Abdomen, quæ circa Funes Spermaticos ac Teſtes, media inter Thoracem Abdomenque, quæ ſub Pectore, Lumborum ac Coxarum pars prior, quæ circa Perinæum viri, aut Genitalis Mulieris Ambitus, quæ circum Anum, Dorſum cum Lumborum poſteriore parte & Cervice, Spatia intercoſtalia, Colli ſceleti latera parsque prior, Scapulæ cum ſuperiore Humerorum parte, Humeri, Cubiti, Manus, Nates, Femora, Crura, Dorſa pedum extremorum digitorumque pedum, Plantæ & digitorum pedum partes inferiores.

In his regionibus plures, paucioresque, musculi, ſedem ſuam fixam habent.

In Calva Epicranius (*a*).

Circa auriculam, Attollens Auriculæ (*b*), Anterior auriculæ (*c*), Retrahentes tres, ſuperior, medius, inferior (*d*).

In

(*a*) Partes occipitales Euſtach. Tab. 29. A. A. Albin. Tab. Muſcul. 5. a. b. c. d. d. in capite. Tab. 9. a. b. c. d. in capite. Partes frontales Euſtach. Tab. 32. a. a. Tab. 41. Fig. 1. E. E. Albin. Tab. Muſcul. 1. a. a. b. b. c. d. d. e. e. f. f. g. g. h. h. i. k. l. in capite. Tab. 5. h. in capite.

(*b*) Euſtach. Tab. 32. m. & Tab. 41. Fig. 1. A. Albin. Tab. Muſcul. 1. Γ. Δ. in capite 5. f. g. in capite Tab. 9. g. h. in capite.

(*c*) Santorin. Obſerv. Anat. Venetiis 1724. Tab. 3. Fig. 4. d. Albin. Tab. Muſcul. 1. Z. in capite Tab. 5. k. in capite. Tab. 9. i. in capite.

(*d*) Valſalv. de aure humana tract. Bononiæ 1704. Tab. 1. Fig. 3. C. C C. Albin. Tab. Muſcul. 5. m. n. o. in capite. Tab. 9. k. l. m. in capite.

In Facie, Orbiculares palpebrarum (*e*), Corrugatores superciliorum (*f*), Ciliares (*), Compreſſores narium (*g*), Levatores labii ſuperioris alarumque naſi (*h*), Levatores labii ſuperioris (*i*), Zygomatici minores (*k*), Levatores angulorum oris (*l*), Zygomatici majores (*m*), Depreſſores

(*e*) Euſtach. Tab. 32. b. b. utriusque lateris & Tab. 41. Fig. 1. F. F. utr. lat. Albin. Tab. Muſcul. 1. m. m. n. o. o. p. q. r. in capite, ubi juxta canthum majorem, porroque in ſupercilio tectus Frontali d. e. f. g.

(*f*) Santorin. Tab. 1. I. Albin. Tab. Muſcul. 2. a. b. in capite.

(*) Albin. Tab. Muſc. 2. h. h. in capite.

(*g*) Santorin. Tab. 1. a dextr. &. a. a. ſin. Albin. Tab. Muſcul. 1. t. u. In capite, ubi ex parte tectus Levatore labii ſuperioris, alæque naſi. x. y.

(*h*) Euſtach. Tab. 32. d. & Tab. 41. Fig. 1. H. Albin. Tab. Muſcul. 1. w. x. y. in capite, ubi principium ejus ex parte tectum Orbiculari palpebrarum q.

(*i*) Euſtach. Tab. 32. e. utr. lat. & Tab. 41. Fig. 1. I. K. dextr. Albin. Tab. Muſcul. 1. z. A. in capite, ubi principium ejus tectum Orbiculari palpebrarum q. m.

(*k*) Euſtach. Tab. 41. Fig. 1. L. Santorin. Tab. 1. Q. Albin. Tab. Muſculor. 1. C. in capite, ubi principium contectum eſt Orbiculari palpebrarum m.

(*l*) Euſtach. Tab. 32. f. utr. lat. & Tab. 41. Fig. 1. M. & Fig. 3. E. Albin. Tab. Muſcul. 2. B. C. in capite. Tab. 1. D. D. ubi tectus Zygomatici majoris parte exteriore G., quæ ſe continuat Depreſſori anguli oris, & per labium inferius excurrit; tectus & Zygomatico minore C, & portione ab Orbiculari palpebrarum accedente ad labium ſuperius B, & Levatore labii ſuperioris z. A.

(*m*) Euſtach. Tab. 32. g. utr. lat. & Tab. 41. Fig. 1. N. dextr. Albin. Tab. Muſcul. 1. E. F. G. in capite, ubi principium ex parte tectum Orbiculari palpebrarum m.

res angulorum oris (*n*), Depreſſores labii inferioris (*o*), Naſales labii ſuperioris (*p*), Buccinatores (*q*), Orbiculares oris (*r*), Depreſſores alarum naſi (*s*), Levatores menti (*t*). In

(*n*) Euſtach. Tab. 32. k. utr. lat. & Tab. 41. Fig. 1. P. utr. lat. Albin. Tab. Muſcul. 1. Q. R. R. S. in capite.

(*o*) Euſtach. Tab. 41. Fig. 1. Q. utr. lat. Albin. Tab. Muſcul. 2. K. K. L. M. in capite. Tab. 1. M. M. N. in capite, ubi majorem partem tecti Depreſſoribus angulorum oris Q. Q. & faſciculis ſubtilibus L. L., qui partim procedunt a Zygomaticis majoribus, partim a Depreſſoribus angulorum oris veluti abludunt.

(*p*) Santorin. Tab. 1. i. i. Albin. Tab. Muſcul. 2. G in capite Tab. 1. H. in capite, ubi ex parte tectus extremo Levatoris labii ſuperioris alæque naſi y., Levatoris labii ſuperioris A., portionis ab Orbiculari palpebrarum accedentis B., Zygomatici minoris C.

(*q*) Euſtach. Tab 41. Fig. 1. O. & Fig. 3. D. Albin. Tab. Muſcul. 3. v. w. x. y. z. in capite. Tab. 2. z. in capite, ubi pars tecta Levatore anguli oris B, & Depreſſore E; pars pone Maſſeterem r. delitescit. Tab. 1. T. in capite; ubi pariter tectus Levatore anguli oris D. & Depreſſore Q. S, & pone Maſſeterem V. delitescit, & præterea tectus Zygomatico majore E. G, & Latisſimo colli δ. γ. γ. Tab. 9. γ. in capite, tectus porro Zygomatico majore y., Masſetere δ., Latisſimo colli ξ. o.

(*r*) Euſtach. Tab. 41. Fig. 1. R. R. Albin. Tab. Muſcul. 1. I. K. K. in capite, ubi in labio inferiore tectus eſt Zygomaticis majoribus L. L. & Depreſſoribus labii inferioris L. Q. L. Q. Tab. 2. H. I. I. in capite, ubi in labio inferiore tectus eſt Depreſſoribus labii illius K. K. M.; pro parte inter eundem & Depresſoris anguli oris partem conſpicitur. Tab. 3. n. o. p. q. r. s. t. u. ubi primum initium tectum Levatore menti β.

(*s*) Cowper Myot. ref. ann. 1694. Fig. 3. D. Albin. Tab. Muſcul. 3. l. m. in capite, ubi tecta pars Orbiculari oris n. Tab. 2. F. in capite, ubi magnam partem tectus Naſali labii ſuperioris G. & Orbiculari oris H.

(*t*) Santorin. Tab. 1. q. r. Cowper Myotom. ann. 1694. Fig. 4. F. F. & ann. 1724. Tab. 31. ad num. 26. 26. Albin. Tab. Muſcul. 3.

β. β.

In Mala & latere Calvæ, Maſſeter (u), Temporalis (w).

In cavo Oculi, Levator palpebræ ſuperioris (x), Obliquus ſuperior oculi (y), Rectus attollens oculi (z), Rectus

β. β. γ. δ. in capite; ubi a principio tecti Orbiculari oris r. Tab. 2. N. O. in capite; ubi pars major ſubjecta Depreſſoribus labii inferioris K. K. Tab. 1. O. P. in capite, ubi pariter pars major ſubjecta Depreſſoribus labii inferioris M. M.

(u) Euſtach. Tab. 32. q. & Tab. 41. Fig. 1. D. Albin. Tab. Muscul. a parte priore Tab. 2. o — x. in capite. Tab. 1. V. W. X. Y. in capite, ubi partem tegit Zygomaticus major E., & Latiſſimus Colli γ. γ. A parte poſteriore Tab. 6. E. F. G. H. in capite. Tab. 5. p. q. in capite, ubi partem tegit Latiſſimus colli t., partem Zygomaticus major r; pars delitescit pone auriculam. A latere Tab. 9. δ — θ. in capite, ubi partem integit Latisſimus colli ξ. ο; partem Zygomaticus major y. z.

(w) Euſtach. Tab. 32. l. l. & Tab. 41. Fig. 1. B. & Fig. 3. A. Albin. Tab. Muſcul. a parte priore Tab. 2. i. &c. in capite, ubi zygoma ſubit, poſt ſubjectus Maſſeteri o. r. In Tab. 1. ſubjectus præterea aponeuroſi Epicranii a, in capite, & cum ea Attollenti auriculæ r. Δ, & Anteriori ejusdem Z., itemque Frontali b. d. & Orbiculari palpebrarum m. n. A parte poſteriore Tab. 6. A. &c. in capite; ubi ſubit zygoma, & deinde ſubjacet Maſſeteri E. G. In Tab. 5. præterea ſubjacet aponeuroſi Epicranii d. d., & cum ea Attollenti auriculæ f. g. & anteriori k.

(x) Euſtach. Tab. 39. Fig. 2. G. Albin. Tab. Muſcul. 11. Fig. 17. a. Ubi principium ejus ex parte ſubjacet principio obliqui ſuperioris d.

(y) Euſtach. Tab. 39. Fig. 2. E. & Fig. 4. D. Albin. Tab. Muſcul. 11. Fig. 17. d. ubi tendo ſub Levatore palpebræ ſuperioris a. primum, dein Recto attollente, incedit. Fig. 27. d.

(z) Euſtach. Tab. 39. Fig. 2. H. & Fig. 3. F. Albin. Tab. Muſcul. 11. Fig. 17. c. ubi ex parte tectus Levatore palpebræ ſuperioris a. Fig. 27. b. c. c.

ctus abductor oculi (*a*), Rectus adductor oculi (*b*), Rectus depreſſor oculi (*c*), Obliquus inferior (*d*).

In Auricula, Tragicus (*e*), Antitragicus (*f*), Major helicis (*g*), Minor helicis (*h*), Transverſus auriculæ (*i*).

In Aure interna, Externus mallei (*k*), Laxator tympa-

(*a*) Euſtach. Tab. 39. Fig. 2. I. Albin. Tab. Muſcul. 11. Fig. 17. f. Fig. 18. a. Fig. 19. a. Fig. 20. d. Fig. 27. h. i. k.

(*b*) Euſtach. Tab. 39. Fig. 2. D. Albin. Tab. Muſcul. 11. Fig. 17. e. ubi ſubjacet majorem partem obliquo ſuperiori d. & a principio etiam Levatori palpebræ ſuperioris. Fig. 18. c. Fig. 19. e. Fig. 20. a. Fig. 27. e. f. g.

(*c*) Euſtach. Tab. 39. Fig. 5. E. Albin. Tab. Muſcul. 11. Fig. 20. g g. Fig. 19. i. k. ubi a ſuperiore parte a principio tectus Recto adducente e. & abducente a. Fig. 18. d. d. Fig. 17. g. Fig. 27. l.

(*d*) Euſtach. Tab. 39. Fig. 5. D. Albin. Tab. Muſcul. 4. o. p. q. in capite. Tab. 3. i. k. in capite, ubi extremo ſuo Rectum abducentem g. ſubit.

(*e*) Valſalva de aure humana Tract. Bononiæ 1704. Tab. 1. Fig. 4. B. Santorin. Tab. 3. Fig. 4. F. Albin. Tab. Muſcul. 1. Λ. in capite. Tab. 9. p. in capite.

(*f*) Valſalva Tab. 1. Fig. 4. D. Santorin. Tab. 3. Fig. 4. g. Albin. Tab. Muſcul. 1. Π. in capite. Tab. 9. q. in capite.

(*g*) Santorin. Tab. 3. Fig. 4. b. Albin. Tab. Muſcul. 1. Θ. in capite. Tab. 9. n. in capite.

(*h*) Santorin. Tab. 3. Fig. 4. c. Albin. Tab. Muſcul. 1. Ξ. in capite. Tab. 9. o, in capite.

(*i*) Valſalva Tab. 1. Fig. 3. d. d. Albin. Tab. Muſcul. 11. Fig. 5. a—f.

(*k*) Du Verney Traité de l'organe de l'Ouïe. a Paris. 1683. Pl. 6. Fig. 5. C. D. Albin. Tab. Muſcul. 11. Fig. 28. b. c. d.

pani (*l*), Tensor tympani (*m*), Stapedius (*n*).

In Collo, Latissimi colli (*o*), Sternomastoïdei (*p*), Cleidomastoïdei (*q*), Coracohyoïdei (*r*), Sternohyoïdei (*s*), Sternothyreoïdei (*t*), Hyothyreoïdei (*u*), Biventres maxillæ

(*l*) Valsalva Tab. 3. Fig. 5. H. Albin. Tab. Muscul. 11. Fig. 28. a.

(*m*) Du Verney Pl. 6. Fig. 5. E. F. Cowper Myotom. ann. 1724. Tab. 26. Fig. 2. n. 42. Albin. Tab. Muscul. 11. Fig. 29. a. b. c. d.

(*n*) Du Verney Pl. 5. Fig. 8. B. & Pl. 8. Fig. 1. e. Albin. Tab. Muscul. 11. Fig. 28. i. Fig. 29. e. f.

(*o*) Eustach. Tab. 30. u. utr. lat. Albin. Tab. Muscul. 1. Ω. α. α. α. β. &c.

(*p*) Eustach Tab. 32. z. & Tab. 28. y. utr. lat. Albin. Tab. Muscul. A parte priore Tab. 1. Φ. μ. in collo, ubi cæterum tecti latissimo colli Ω; & extremum post auriculam delitescit. Tab 2. η. θ. ι. κ. λ. ν. in collo. A parte posteriore Tab. 5. u. &c. in collo. A latere Tab. 9. ϱ. in collo; ubi ex parte tectus Latissimo colli μ.

(*q*) Eustach. Tab. 32. A. utr. lat. Ab Albino una cum præcedenti iisdem tabulis iisdem litteris exhibetur.

(*r*) Eustach. Tab. 32. w. w. utr. lat. & Tab. 33. Z. utr. lat. & Tab. 41. Fig. 5. l. l. Albin. Tab. Muscul. 2. α. α. β. in collo; ubi tectus Sternocleidomastoïdeo η. θ. ι. κ., & a principio pone claviculam, Subclavium σ, & Serratum magnum Ψ. delitescit. Quibus partibus nudus in Tab. 2. iis subjacet latissimo colli Ω. Tab. 1. in collo; subjacet & Cucullari. A posteriore parte Tab. 6. η. circa humerum; ubi a principio post Suprapinatum ι in scapula.

(*s*) Eustach. Tab. 32. x. utr. lat. & Tab. 33. c. & Tab. 41. Fig. 5. m. Albin. Tab. Muscul. 2. γ. γ. δ. in collo, ubi ex parte tectus Sternomastoïdeo η. θ. & clavicula, sterno, costæ primæ cartilagine. Tab. 1. ι. in collo, ubi maximam partem Latissimus colli Ω. superinductus.

(*t*) Eustach. Tab. 32. y. utr. lat. Tab. 33. b. dextr. b. b. sin. Tab. 41. Fig. 5. n. n. dextr. & n. sin. Albin. Tab. Muscul. 3. π. π. σ. ς. ϱ. in collo, ubi principium post claviculam, sternum, costæ primæ cartila-

læ (*w*), Stylohyoïdei (*x*), Stylohyoïdei alteri (*y*), Styloglossi (*z*), Stylopharyngei (*a*), Mylohoïdei (*b*), Genio-

hyoï-

tilaginem. Tab. 2. ε. ε. ε. in collo, ubi tectus Sternohyoïdeo γ. γ. & Coracohyoïdeo α. β. & Sternocleidomaſtoïdeo κ. κ.; & quod ejus ibi tum ſupra tum infra Sternomaſtoïdeum nudum eſt, id in Tab. 1. poſt Latiſſimum colli Ω. in collo. Tab. 1. ν. in collo.

(*u*) Euſtach. Tab. 33. R. Tab. 41. Fig. 5. o. Albin. Tab. Muſcul. 3. ς. in collo. Tab. 2. Y. in collo, ubi majorem partem tectus Coracohyoïdeo α. β. & Sternohyoïdeo γ. δ., & qua parte ibi nudus, ea poſt Latiſſimum colli Ω. in collo Tab. 1. A latere Tab. 10. Fig. 1. q.

(*w*) Euſtach. Tab. 32. r. r. ſin. & r. dextr. Albin. Tab. Muſcul. a latere Tab. 10. Fig. 1. g. h i. i.; ubi principium poſt proceſſum mammillarem, partemque integit Stylohyoïdeus e. f. In Tab. 9. totus intectus Latisſimo colli μ. in collo, Sternocleidomaſtoïdeo ϱ, Splenio capitis υ, Stylohyoïdeo λ. &c. —— A parte priore Tab. 2. y. P. in capite; ubi partim poſt maxillam inferiorem delitescit, partim tectus Sternocleidomaſtoïdeo λ. in collo, partim Stylohyoïdeo R. Dein Tab. 1. Σ. in capite; ubi pariter poſt maxillam inferiorem delitescit, & tectus Sternocleidomaſtoïdeo Φ. in collo, & præterea poſt auriculam; infraque, qua nudus in Tab. 2., tectus Latiſſimo colli Ω. —— A parte poſteriore Tab. 6. L. in capite; ubi porro poſt Splenium capitis P. in cervice & Levatorem ſcapulæ Z. delitescit. Et quod nudum, id in Tab. 5. poſt Sternocleidomaſtoïdeum u. in collo.

(*x*) Euſtach. Tab. 32. s. utr. lat. Tab. 41. Fig. 5. i. Albin. Tab. Muſc. 10. Fig. 1. e. f. ubi ex parte tectus Biventre maxillæ g. i. Dein Tab. 9. λ. in capite; ubi ex parte tectus Latiſſimo colli μ., ex parte Sternocleidomaſtoïdeo ϱ. A priore parte Tab. 12. R. in collo.

(*y*) Euſtach. Tab. 1. Fig. 11. K.

(*z*) Euſtach. Tab. 33. M. Tab. 41. Fig. 8. H. Albin. Tab. 10. Fig. 2. k l. m. ubi a principio delitescit pone proceſſum mammillarem oſſis temporis. Dein Fig. 1. mox ſupra k., ubi maximam partem tectus Mylohyoïdeo d., Stylohyoïdeo e., Biventre maxillæ g. Tab. 9. inter κ. & λ. in collo, ubi tectus Stylohyoïdeo λ.

hyoïdei (c), Ceratoglossi (d), Basioglossi (e), Chondroglossi (ee), Genioglossi (f), Linguales (g), Constrictores

(b) Eustach. Tab. 33. P. Tab. 41. Fig. 8. F. Tab. 42. Fig. 4. G. utr. lat. Fig. 6. O. utr. lat. Albin. Tab. Muscul. 10. Fig. 11. f. &c. Fig. 10. l. &c. ubi ex parte tectus Constrictore pharyngis superiore a. e. e. Fig. 9. o. &c. ubi pariter ex parte tectus Constrictore superiore d., & præterea medio a. Eodemque modo Fig. 8. u. &c. Porro Fig. 13. r. s. t. u. Fig. 14. p. q. r. s. t. Fig. 15. x. y. z. α. β. Fig. 4. d. e. Fig. 2. w. ubi partem integit Constrictor pharyngis medius β., &, quod nudum, id in Fig. 1. subjacet Biventri maxillæ g.

(b) Eustach. Tab. 33. H. Tab. 35. k. k. utr. lat. Tab. 41. Fig. 5. a. Albin. Tab. Muscul. 10. Fig. 1. d. ubi partem Biventer maxillæ h. i. tegit. a latere. Tab. 3. ν. in collo. Tab. 2. Q. in collo, a priore parte.

(c) Eustach. Tab. 33. I. Tab. 41. Fig. 5. b. Fig. 8. M. Albin. Tab. Muscul. 10. Fig. 2. r. s. ubi parte extremi sui situs pone Basioglossum o. In Fig. 1. jacet post Mylohyoïdeum d.

(d) Eustach. Tab. 33. M. Tab. 41. Fig. 8. I. Albin. Tab. Muscul. 10. Fig. 2. n. Fig. 1. m. ubi tectus ex parte Biventre maxillæ g. i. ex parte Stylohyoïdeo e. In Tab. 9. post Sternomastoïdeum ρ in collo delitescit. A parte priore. Tab. 3. ν. in collo. Tab. 2. T. in collo.

(e) Eustach. Tab. 33. L. Tab. 41. Fig. 8. K. Albin. Tab. Muscul. 10. Fig. 2. o. ubi pars principii, quæ a basi hyoïdis oritur, tecta Geniohyoïdeo r. Dein Fig. 1. k. l. ubi ex parte tectus Mylohyoïdeo d., & Stylohyoïdeo e. f., & Biventre maxillæ inferioris i. Dein Tab. 9. mox infra Styloglossum, qui inter κ. & λ. in collo.

(ee) Albin. Tab. Muscul. 10. Fig. 4. t. Dein Fig. 3. mox supra κ. ubi maximam partem tectus fasciculis Genioglossi, quos per latus pharyngis curvat l; & quod in ea nudum, id in Fig. 2. post Ceratoglossum o. delitescit.

(f) Eustach. Tab. 33. K. Tab. 41. Fig. 11. A. & B. Fig. 8. L. Albin. Tab. Muscul. 10. Fig. 5. o. p. q. Dein Fig. 4. s f. Dein Fig. 3. i. k. Fig. 2. q. ubi pars tecta Basioglosso o.; & quod nudum est, id in Fig. 1. jacet post Mylohyoïdeum d.

res pharyngis inferiores (*h*), Conftrictores pharyngis medii (*i*), Conftrictores pharyngis fuperiores (*k*), Salpingopharyngei (*l*), Palatopharyngei (*m*), Conftrictores ifthmi fau-

(*g*) Albin. Tab. Mufcul. 10. Fig. 5. n. Fig. 4. r. Fig 3. h. Fig. 2. p. Ubi pars tecta Bafiogloffo o.

(*h*) Euftach. Tab. 41. Fig. 8. R. & Tab. 42. Fig. 4. K. Albin. Tab. Mufcul. 10. Fig. 3. z. Fig. 2. δ. Fig. 1. β. ubi pars principii fub Hyothyreoïdeo q. — A parte priore Tab. 3. ω. in collo; ubi partem integit Hyothyreoïdeus ς, pars delitescit poft Sternothyreoïdeum π. Tab. 2. X. in collo, ex parte pariter tectus Hyothyreoïdeo Y., præteréaque delitescens poft Sternocleidomaftoïdeum λ. Quæ autem pars ibi nuda, ea in Tab. 1. delitescit poft Latiffimum colli Ω. in collo. — A parte pofteriore. Tab. 10. Fig. 8. a. b. & a. b. c. d. e.

(*i*) Euftach. Tab. 41. Fig. 8. Q. Fig. 11. L. Tab. 42. Fig. 4. I. utr. lat. Albin. Tab. Mufcul. 10. Fig. 3. w. x. y., ubi pars ejus inferior tecta Conftrictore inferiore z. Dein Fig. 2. α. β. γ., ubi pariter pars ejus inferior tecta Conftrictore inferiore δ., & a principio præterea Ceratogloffo n. & Bafiogloffo o. tectus. Dein Fig. 1. δ. ε. ζ., ubi fimiliter pars inferior tecta Conftrictore inferiore β., & a principio Ceratogloffo m. tectus, & Bafiogloffo l. & Biventre maxillæ g.

(*k*) Euftach. Tab. 42. Fig. 4. H. utr. lat. Albin. Tab. Mufcul. 10. Fig. 3. p. q. r. s. t. u. n., ubi partem integit Conftrictor medius w. Dein Fig. 2. y. y. z. ubi fimiliter partem integit Conftrictor medius α., & præterea delitescit poft Stylopharyngeum w. & Styloglosfum k. Dein Fig. 1. η. ubi eodem modo pars tecta Conftrictore medio δ., & præterea pone Biventrem maxillæ g. delitescit. —— A parte pofteriore Tab. 10. Fig. 10. a — g. a — g. ubi ex parte poft Stylopharyngeos o. p. o. p. Dein Fig. 9. d. e. f. d. e. f.; ubi pariter poft Stylopharyngeos r. q. r. q. & præterea magnam partem fubjecti Conftrictoribus mediis a. a. Eodem modo Fig. 8. p. q. r. p. q. r. magnam partem fubjecti mediis n. n. o., & præterea Stylopharyngeis v. w. v. w.

(*l*) Euftach. Tab. 42. Fig. 6. L. Albin. Tab. Mufcul. 10. Fig. 13. q.

faucium (n). Levatores palati mollis (o), Circumflexi pala-

(m) Euftach. Tab. 42. Fig. 6. M. N. utr. lat. Albin. Tab. Muscul. A parte priore Tab. 10. Fig. 17. k. k. magnam partem tectus Conftrictore ifthmi faucium g. Pars quæ in pharynge eft Tab. 10. Fig. 11. e. quæ in Fig. 10. poft Conftrictorem pharyngis fuperiorem a. Pars quæ in palato eft Tab. 10. Fig. 13. n. o. p., ubi ex parte poft Salpingopharyngeum g. delitescit, & Azygo uvulæ m. fubjacet. Extremum commune Stylopharyngei & Palatopharyngei Tab. 10. Fig. 11. o. Dein Fig. 10. t. ubi a fuperiore parte fubjacet Conftrictori pharyngis fuperiori a., & quod nudum, id in Fig. 8. tectum Conftrictore inferiore. a. Pars quæ per palatum molle procedit. Tab. 10. Fig. 15. p. q. r. Dein Fig. 14. w., ubi tecta hæc pars Levatore palati mollis k. l. — Pars, quæ fe per latus pharyngis demittit. Tab. 10. Fig. 15. t. &c. Fig. 14. x. — Communis extremi Stylopharyngei & Palatopharyngei pars a Stylopharyngeo producta Tab. 10. Fig. 15. v. w. —— A latere Tab. 10. Fig. 4. f. f. ubi ex parte delitescit poft Stylopharyngeum d. Fig. 4. g. g. h. i. k. ubi pars pone offis hyoïdis cornu w. delitescit; pars pone ligamentum x, quod ab extremo hyoïdis cornu ad procesfum fuperiorem thyreoïdeæ pertinet; pars pone cartilaginem thyreoïdeam y. z. Dein Fig. 3. inter x. & y., itemque ε, ubi pars pariter poft cornu hyoïdis θ, & ligamentum ι, & thyreoïdeam κ, & prætereà tegitur Conftrictore pharyngis medio w. x. y. & inferiore z. Dein Fig. 2. inter β. & γ., itemque x.; ubi præterquam quod pariter poft cornu hyoïdis v, ligamentum modo dictum, Conftrictorem pharyngis medium α. β. γ., & inferiorem δ., thyreoïdeam ι., etiam poft Ceragloffum n. Dein Fig. 1. inter ε. & ζ, itemque p.; ubi eodem modo poft cornu hyoïdis n., ligamentum idem, Conftrictorem medium δ. ε. ξ., inferiorem β., thyreoïdeam; & præterea poft Hyothyreoïdeum q. r. —— A parte priore Tab. 3. χ. in collo, portio nuda inter cornu hyoïdis λ, ligamentum ψ., cartilaginem thyreoïdeam, Hyothyreoïdeum ς, & Conftrictorem pharyngis inferiorem ω, quibus porro fubjacet. Sic & Tab. 2. W. in collo, cæterum fubjacens iisdem, cornu hyoïdis, ligamento V., thyreoïdeæ, Hyothyreoïdeo Y. Z., Conftrictori inferiori X. Nuda in Tabulis mododictis pars in Tabula 1. delitescit poft Latisfimum colli Ω. in collo.

palati (*p*), Azygus uvulæ (*q*), Cricothyreoïdei (*r*), Cricoarytænoïdei poſtici (*s*), Arytænoïdei obliqui (*t*), Arytænoï-

(*n*) Valſalva Tab. 5. Fig. 1. C. utr. lat. Albin. Tab. Muſcul. 10. Fig. 17. f.g. a priore. — A latere Tab. 10. Fig. 5. g. Fig. 4. l. Fig. 3. c., ubi maximam partem delitescit poſt Conſtrictorem pharyngis ſuperiorem s.; Fig. 2. i.

(*o*) Euſtach. Tab. 42. Fig. 4. F. utr. lat. Fig 6. F. F. ſin. & F. dextr. Valſalva Tab. 4. n. dextr. Albin. Tab. Muſcul. a parte poſteriore Tab. 10. Fig. 14. g. h. i. k l. Fig. 13. g. h. i., ubi pars pone Salpingopharyngeum q.; cæterum ſub Palatopharyngeo n. Dein Fig. 12. parva pars w. à latere membranæ pharyngis. Sic & Fig. 11. b. Fig. 10. i. Fig. 9. k. — A latere Tab. 10. Fig. 5. b. Fig. 4. b. Fig. 3. b. ubi pars delitescit poſt Conſtrictorem ſuperiorem pharyngis q., Fig. 2. g.

(*p*) Euſtach. Tab. 41. Fig. 13. Θ. Tab. 42. Fig. 4. D. E. utr. lat. Fig. 6. D. E. utr. lat. Valſalva Tab. 4. m. utr. lat. Albin. Tab. Muſcul. à parte poſteriore Tab. 10. Fig. 16. i—n. Dein Fig. 15. h i. k. ubi pars, quæ in palato eſt, tecta membrana tendinoſa n., quæ ex naribus veniens procedit per ſuperiora palati mollis: tecta & principio Palatopharyngei q., & Conſtrictoris pharyngis ſuperioris o. Dein Fig. 14. n., ubi præterea majorem partem tectus Levatore palati mollis g. Sic & Fig. 13. k. Fig. 12. x. à latere membranæ pharyngis: & Fig. 11. c. Fig. 10. k. ubi & poſt Conſtrictorem ſuperiorem pharyngis b. delitescit: quemadmodum & Fig. 9. l. Fig. 8. t. —— A latere Tab. 10. Fig. 5. a. Fig. 4. a. Fig. 3. a. Fig. 2. f.

(*q*) Heiſter Compend. Anat. Tab. 8. Fig. 38. k. Albin. Tab. Muſcul. 10. Fig. 13. m.

(*r*) Euſtach. Tab. 41. Fig. 8. V. dextr. V. I. ſin. Fig. 11. S. utr. lat. Albin. Tab. Muſcul. a parte priore. Tab. 3. o. in collo, ubi tecta pars magna Sternothyreoïdeo π. σ., & quod nudum, id in Tab. 2. jacet poſt Sternohyoïdeum γ. in collo. A latere Tab. 10. Fig. 1. v. w. x. y.

(*s*) Euſtach. Tab. 42. Fig. 2. K. utr. lat. Albin. Tab. Muſcul. a poſteriore parte Tab. 10. Fig. 13. ι, ex parte ſubeuns cartilaginem thyreoïdeam

tænoïdeus transversus (u), Cricoarytænoïdei laterales (w), Thyreoarytænoïdei (x), Thyreo-arytænoïdei alteri (α), Thyreo-epiglottici majores (β), Thyreo-epiglottici minores (γ).

Sub Mala, Pterygoïdeus internus (y), Pterygoïdeus externus (z).

In-

deam μ. In Fig. 12. velatus membrana pharyngis v, præter partem exiguam, infra κ., quæ & in Fig. 11. A. & in Fig. 10. η. & in Fig. 9. I. A latere Tab. 10. Fig. 6. a. Fig. 5. δ. ubi maximam partem delitescit post cartilaginem thyreoïdeam α, & post membranam pharyngis. Sic & Fig. 4. δ. Et quod nudum, id in Fig. 3. delitescit post Constrictorem inferiorem pharyngis z. δ.

(t) Eustach. Tab. 42. Fig. 2. G. & H.H. Albin. Tab. Muscul. a posteriore parte Tab. 10. Fig. 13. η. ubi dextrum decussat sinister. In Fig. 12. velati membrana pharyngis v. — A latere Tab. 10. Fig. 6. I. m. m. ubi sinister l. decussat dextrum m. m.

(u) Eustach. Tab. 42. Fig. 2. F. F. F. F. Albin. Tab. Muscul. 10. Fig. 13. θ. θ. θ. θ., ubi ex parte tectus Arytænoïdeis obliquis. η. η. Cæterum in Fig. 12. velatus membrana pharyngis v. — A latere Tab. 10. Fig. 6. o. pariter ex parte tectus obliquis l. m. m.

(w) Eustach. Tab. 42. Fig. 1. L. Albin. Tab. Muscul. 10. Fig. 6. b. ubi extremo majorem partem subit Thyreoarytænoïdeum alterum c.

(x) Eustach. Tab. 42. Fig. 1. K. Albin. Tab. Muscul. 10. Fig. 6. e., ubi partem ejus integit Thyreo-epiglotticus major f. g. & Thyreo-arytænoïdeus alter c.

(α) Albin. Tab. Muscul. 11. Fig. 6. c d.

(β) Albin. Tab. Muscul. 10. Fig. 6. f. g. ex parte tectus Thyreo-arytænoïdeo altero c.

(γ) Albin. Tab. Muscul. 10. Fig. 6. i. extremo suo ibi delitescens post Thyreoarytænoïdeum alterum. c.

(y) Eustach. Tab. 41. Fig. 13. r. Tab. 2. F. Albin. Tab. Mus-

 cul-

In Pectore Pectorales (a), Serrati antici (b), Subclavii (c).

In

cul. 4. r. in capite; ubi a principio delitescit pone processum pterygoïdeum, & præterea pone maxillam inferiorem, circa quam sequitur post Temporalis extremum. Dein Tab. 3. ζ. in capite; ubi insuper pone Buccinatorem v. delitescit, & tectus Pterygoïdeo externo ε. Quodque in Tab. 3. nudum, id in Tab. 2. post Masseterem r. in capite. — A parte posteriore Tab. 7. c. in capite; ubi porro post procesfum mammillarem delitescit, & Trachelomastoïdeum z. B. in cervice. Dein Tab. 6. I. in capite, porro delitescens post Splenium capitis P. in cervice. Dein Tab. 5. ρ. in capite; ubi ex parte tectus Latissimo colli t, & porro delitescit post Sternomastoïdeum u. in collo, & post auriculam. — A latere Tab. 10. Fig. 1. b. c. à principio delitescens post processum mammillarem. Tab. 9. ι. κ. in capite; ubi partem integit Latissimus colli π. ξ., pars delitescit post Sternomastoïdeum ρ. in collo, pars post auriculam.

(z) Eustach. Tab. 41. Fig. 13. Δ. utr. lat. Albin. Tab. Muscul. 3. ε.,ε. in capite, ubi ex parte delitescit post Buccinatorem v., os maxillare superius, & jugale, postque zygoma, & processum coronoïdeum maxillæ inferioris, circa quem post Temporalis extremum sequitur. Dein Tab. 2. A. in capite; ubi pariter post os maxillare superius delitescit, & post jugale, postque Buccinatorem z., præterea que post Masseterem r. — A latere Tab. 10. Fig. 1. a., partim tectus Pterygoïdeo interno b., partim subjectus maxillæ inferiori.

(a) Eustach. Tab. 32. K. Tab. 28 F. utr. lat. Albin. Tab. Muscul. 1. ξ. in trunco, ubi ex parte velatus Latisſimo Colli α, α, α. & tectus Deltoïde M. &c. — A latere Tab. 9. H. I. in trunco.

(b) Eustach. Tab. 32. I. Albin. Tab. Muscul. 2. υ. &c. in pectore. In Tab. 1. subjacet Pectorali ξ. in trunco, & Deltoïdi M. in humero. — A latere Tab. 9. G. in trunco; ubi ob sublatum brachium ea parte nudatus à Pectorali H.

(c) Eustach. Tab. 32. G. Albin. Tab. Muscul. 2. σ. ς. ς: ς. in pectore; ubi pars pone processum Coracoïdeum delitescit. In Tab. 1.

sub-

In latere Thoracis Serratus magnus (*d*).

In Abdomine Obliqui externi abdominis (*e*), Obliqui interni

subjacet Pectorali ξ. in trunco, & Deltoïdi M. in humero; interque eos delitescit post Latissimum colli θ. α. in trunco. — A posteriore parte Tab. 6. θ. circa humerum.

(*d*) Eustach. Tab. 30. D. Tab. 32. M. utr. lat. Tab. 36. f. Tab. 33. m. Albin. Tab. Muscul. 9. K. L. M. N. O. P. Q. in trunco; ubi tectus Serrato antico G., Pectorali H., Latissimo dorsi Ω., Obliqui externi abdominis capitibus U. V. W. — A parte priore. Tab. 2. Ψ. Ω. A. B. C. D. E. F. G. &c. in trunco; ubi & tectus Serrato antico υ. &c. & delitescit post Subclavium σ. &c. Dein Tab. 1. χ. ψ. ω. a. b. in trunco; ubi tectus Pectorali ξ. in pectore, & Obliqui externi abdominis capitibus e. f. g. in trunco, & Latissimo dorsi τ. — A parte posteriore, Tab. 6. Π. Σ. Φ. Ψ. Ω. A. B. in latere thoracis, & ζ. circa humerum; ubi cæterum sub scapula, ejusque interiori parti insidente Subscapulari; proximisque musculis, Terete majore ψ. in scapula, Rhomboïdeo majore x. in dorso, Levatore scapulæ Z. in cervice, Coracohyoïdeo π. circa humerum. Et quod nudum illa in tabula, id in quinta sub Latissimo dorsi P. in dorso, & Cucullari B. in collo & dorso.

(*e*) Eustach. Tab. 32. T. Tab. 28. I. K. utr. lat. Tab. 29. W. utr. lat. Albin. Tab. Muscul. a latere Tab. 9. S. &c. in trunco: ubi a superiore parte Pectorali H. I. subjacet; dein capitis suis servato magno N. R. O. R. P. R. Q; dein Latissimo dorsi. Ω. E. D. & inter D. & C. — A parte priore Tab. 1. d. &c. in trunco; ubi superiore parte subjacet Pectorali ξ. in trunco; dein capitibus suis Serrato magno ω. a. b., dein Latissimo dorsi τ. υ. — A posteriore parte Tab. 5. W. in dorso; ubi partem tegit Latissimus dorsi P. Q.

(*f*) Eustach. Tab. 32. R. Tab. 29. V. utr. lat. Tab. 36. i. Albin. Tab. Muscul. a parte priore Tab. 2. M. &c. in trunco; ubi pars superior eademque major lamellæ posterioris earum, in quas se aponeurosis ejus juxta Rectum dividit, Recto illi Z. Z. &c. subjecta; infraque ante eum funiculus spermaticus r. cum Cremasteris principio q. dependet. In Tab. 1. Obliquo externo d. &c. in trunco subjacet. — A parte posteriore Tab. 6. M. &c. in inferiori trunci parte; ubi à principio

terni abdominis (*f*), Transversi abdominis (*g*), Recti abdominis (*h*), Pyramidales (*i*).

Circa Funem Spermaticum ac Testem, Cremaster (*k*).

In

cipio superinducto lato Latissimi dorsi tendine U. tectus. Quaque parte nudus est in Tabula illa, ea in Tab. 5. subjacet Latissimo dorsi P. Q, & obliquo externo abdominis W. in dorso. — A latere in Tab. 9. jacet post Obliquum externum abdominis S. &c. in trunco, & Latissimum dorsi Ω, A.

(*g*) Eustach. Tab. 33. q. utr. lat. Tab. 37. o. utr. lat. Albin. Tab. Muscul. a parte priore Tab. 3. l — q. in trunco; ubi capita ejus subjecta costis; & primum etiam Intercostali interno quinto b, & sexto h.; quartum octavo e., quintum nono f. Reliquum in Tab. 2. subjacet, Obliquo interno M. &c. in trunco. — A parte posteriore: principia lati tendinis, quo Transversus incipit, una cum principiis lamellæ interioris, qua communis aponeurosis Obliqui interni & Serrati postici inferioris procedit a processibus transversis lumborum Tab. 7. subjacent capiti communi Sacrolumbaris & Longissimi dosi δ. ε. in trunco. Porro Tab. 7. Y. Z. in trunco; ubi ex parte subjacet aponeurosi communi Serrati postici inferioris & Obliqui interni Abdominis γ. γ., itemque Intercostali interno undecimo X. Quod vero nudum in Tab. 6. delitescit post Serratum posticum inferiorem C. K. & Obliquum internum M. N. in trunco.

(*h*) Eustach. Tab. 33. n. Albin. Tab. Muscul. 2. Z. Z. &c. in trunco, in dextro latere, ubi a principio subjacet Pyramidali l., in sinistro præterea ex parte tectus, supra quidem lamella priori earum, in quas aponeurosis Obliqui interni se juxta Rectum dividit; infra autem communi aponeurosi Obliquorum & Transversi; cujus illa tantum pars apparere ibi potest, quæ fit a lamella priore earum, in quas se aponeurosis Obliqui interni juxta Rectum dividit W. X. &c. In Tab. autem 1. reliquum ejus subjacet, infra quidem communi aponeurosi Obliquorum & Transversi, dein communi Obliquorum aponeurosi; quarum sola pars, quam aponeurosis Obliqui externi efficit, ibi apparere potest o. p. &c. in trunco: dein ubi thoracem conscendit, soli aponeurosi illi Obliqui externi; denique Pectorali ξ. in trunco.

Inter abdomen thoracemque, Diaphragma (*l*).

Sub Pectore, Triangularis sterni (*m*).

In Lumborum & Coxarum parte priore, Psoæ parvi (*n*),

Psoæ

(*i*) Eustach. Tab. 33. u. Albin. Tab. Muscul. 2. l. m. in trunco; ubi ex parte tectus communi aponeurosi Transversi & Obliquorum, cujus sola apparere ibi potest lamella prior earum, in quas se aponeurosis Obliqui interni dividit, Y. Q. in trunco. Et quod nudum ibi, id in Tab. I. aponeurosi communi modo dictæ subjectum, cujus sola apparere pars potest, quæ Obliqui externi est, q. w. in trunco.

(*k*) Eustach. Tab. 32. r. utr. lat. & Tab. 33. w. x. utr. lat. Albin. Tab. Muscul. 2. p. q. in trunco, ubi pars etiam pone funiculum spermaticum & testem. Dein Tab. 1. z. in trunco; ubi principium latet sub Aponeurosi Obliqui externi abdominis x.

(*l*) Vesalius de hum. corp. fabr. Lib. 2. Tab. 7. Δ. Albin. Tab. Muscul. a parte priore Tab. 4. M — o. in trunco, ubi caput quartum sinistrum ex parte subjacet Psoæ magno t.; dextrum Psoæ parvo r., & magno t., primum ex parte Psoæ magno inter v. & w. —— A parte posteriore Tab. 8. μ. in lumbis, ubi partem integit Quadratus Lumborum λ.

(*m*) Vesalius de hum. corp. fabr. lib. 2. Tab. 8. β. Cowper Myotom. 1724. Tab. 33. Fig. 1. n. 77. utr. lat. Albin. Tab. Muscul. a parte priore Tab. 3. x. in trunco; ubi extremo superinducta lamella interior aponeurosis Obliqui interni abdominis s: cæterumque costis subjectus, sternoque & Intercostalium internorum sexto h, quinto b., quarto a., tertio Z. Quæ vero nuda ibi pars est, ea lamellæ interioris aponeurosis Obliqui interni parti, quæ ibi rescissa est, subjecta. A posteriore parte Tab. 10. Fig. 24.

(*n*) Eustach. Tab. 38. q. Albin. Tab. Muscul. 4. r. s. in trunco; ubi a principio post Diaphragma R. delitescit; in fine post Psoam magnum t.

(*o*) Eustach. Tab. 38. r. r. s. sin. Albin. Tab. Muscul. 4. t. &c. in trunco; ubi ex parte tectus Psoa parvo r. s. & Diaphragmate

C Q R.

Pſoæ magni (o), Quadrati lumborum (p), Iliaci interni (q).

Cir-

Q. R. Dein Tab. 3. τ. υ. in femore; ubi non niſi pars, quæ in femore eſt, apparet. Dein Tab. 2. z. in femore; ex parte tectus Obliquo interno abdominis O. in trunco, itemque Pectineo Γ. in femore. Dein Tab. 1. F. in femore, tectus Obliquo externo abdominis u. v. in trunco, & Pectineo E. in femore, & Sartorio H. — A latere Tab. 9. o. in ſiniſtra coxa. Extremum ejus a parte poſteriore Tab. 8. π. in coxa & femore; ubi pars extremi tecta Obturatore externo ϱ, & Adductore magno femoris ω. Dein Tab. 7. Ω. in coxa & femore; ubi extremi pars eodem modo tecta Obturatore externo Σ., & Adductore magno femoris O. Et quod nudum, id in Tab. 6. poſt Quadratum femoris z. in inferiore trunci parte. Reliquum Pſoæ magni Tab. 8. ν. in coxa; dein Tab. 7. y. in coxa; Tab. 6. m. in inferiore trunci parte; cæterum deliteſcens poſt Pyriformem n., & Gluteum medium i.

(p) Euſtach. Tab. 38. p. utr. lat. Tab. 39. Fig. 1. n. utr. lat. Albin. Tab. Muſcul. A parte priore Tab. 4. p. in trunco; ubi cæterum tectus Pſoa magno t., & deliteſcit poſt Diaphragma, T. S. R. in trunco, & Ψ. R. A parte poſteriore Tab. 8. δ. in lumbis; ubi ex parte ſubjacet Intertransverſariis lumborum Ψ. Ω. α. β. γ. Et quod ibi nudum, id tectum principio tendineo Transverſi abdominis cum ſuperinducto ei communi principio tendineo Obliqui interni abdominis, & Serrati poſtici inferioris, & capite communi Sacrolumbalis & Longisſimi dorſi, δ. ε. in trunco Tab. 7.

(q) Euſtach. Tab. 38. u. Albin. Tab. Muſcul. 4. y. in trunco; ex parte ſubjectus Pſoæ magno t. Dein Tab. 3. ς. in femore; ubi non apparet, niſi pars, quæ in femore eſt, tecta etiam partim Transverſo abdominis p. p. in trunco; partim Pſoa magno τ. υ. in femore. Dein Tab. 2. y. in femore; tectus Obliquo interno abdominis O. O. in trunco, Pſoa magno z. in femore, & Pectineo Γ., & Recto cruris x. Dein Tab. 1. G. in femore, tectus Obliquo externo abdominis u. in trunco, Pſoa magno F. in femore, & Sartorio H. — A parte poſteriore Tab. 8. ο.

(&

Circa perinæum viri, Acceleratores (*r*), Erectores penis (*s*).

In Genitalis muliebris ambitu, Constrictor cunni (*t*), Erectores clitoridis (*u*).

Circa anum, Sphincter externus ani (*w*), Transversi perinæi

(& reliquum quoque hujus Iliaci ξ.) in coxa & femore; ubi partem extremi tegit Obturator externus ρ. Dein Tab. 7. Ψ. in coxa & femore; pariter tecta parte Obturatore externo Σ. Et quod nudum, id in Tab. 6. post Quadratum femoris z. in inferiore trunci parte.

(*r*) Vesalius de h. c. f. Lib. 2. Tab. cap. 49. Fig. 1. H. I. Albin. Tab. Muscul. 4. η. η. in trunco; ubi partim tecti sphinctere externo ani θ., partim Transversis perinæi ι. ι., partim Erectoribus penis ζ. ζ. pars ob propendentem penis portionem non conspicua. Dein Tab. 3. μ. in trunco; ubi pars eodem modo tecta Sphinctere externo λ., pars Erectore penis ν.

(*s*) Vesalius de h. c. f. Lib. 2. Tab. cap. 49. Fig. 1. K. L. Albin. Tab. Muscul. 4. ζ. ζ. in trunco, ubi extrema non conspicua ob penis portionem propendentem.

(*t*) Eustach. Tab. 14. Fig. 1. M. M. Santorin. Tab. 11. Fig. 1. G.

(*u*) Eustach. Tab. 14. Fig. 1. N. N.

(*w*) In viro Eustach. Tab. 29. c. & Tab. 36. r. Albin. Tab. Muscul. a parte posteriore, Tab. 6. f. in inferiore trunci parte. Dein Tab. 5. η. circa nates. —— A parte priore Tab. 4. θ. in trunco, ubi mucro ob propendentem penis partem non conspicuus. Eodem modo Tab. 3. λ. in trunco.

(*x*) In viro Cowper Myotom. ann. 1724. Tab. 19. n. 9. utr. lat. Santorin. Tab. 3. Fig. 5. I. I. In fœmina Santorin. Tab. 2. Fig. 1. g. g. Albin. Tab. Muscul. 4. ι. in trunco, ubi subit Sphincterem ani externum θ. A parte posteriore Tab. 6. h. in inferiore parte trunci, ubi extremum subit Sphincterem ani externum f. Dein Tab. 5. inter ζ. & η. in nate; ubi pariter subit Sphincterem externum η., & post Gluteum magnum γ. delitescit.

rinæi (x), Transversi-perinæi alteri (y), Levatores ani (z), Coccygei (a), Sphincteres interni ani (b).

In Dorso cum lumborum posteriore parte & cervice, Cucullares (c), Latissimus dorsi (d), Rhomboïdei majores (e), Rhom-

(y) In viro Santorin. Tab. 3. Fig. 5. H. H. In fœmina Santorin. Tab. 2. Fig. 1. F. Albin. Tab. Muscul. 6. g. in inferiore trunci parte; ubi extremo subit Levatorem ani e.: & quod nudum, id in Tab. 5. delitescit post Gluteum magnum γ. in nate.

(z) Eustach. Tab. 39. d. utr. lat. Tab. 36. q. utr. lat. Tab. 37. r. utr. lat. Albin. Tab. Muscul. a parte posteriore. Tab. 6. e. e. in inferiore trunci parte, ubi subeunt Sphincterem ani externum f. Dein Tab. 5. ε. in natibus, ubi pariter subeunt Sphincterem externum η. & post Gluteos magnos γ. γ. delitescunt.

(a) Eustach. Tab. 36. f. Albin. Tab. Muscul. 6. d. in inferiore trunci parte, ubi parte quadam post Levatorem ani e. In Tab. 5. subjacet Gluteo magno γ. in nate.

(b) Eustach. Tab. 10. Fig. 2.

(c) Eustach. Tab. 29. P. Tab. 31. M. utr. lat. Tab. 32. E utr. lat. Albin. Tab. Muscul. 5. B. &c. in capite, collo, dorso. A latere Tab. 9. ω. &c. in capite, collo, trunco. Ut & Tab. 1. Ψ. in collo, ex parte tectus Latissimo colli Ω. &c.

(d) Eustach. Tab. 29. R. utr. lat. Tab. 32. L. utr. lat. Albin. Tab. Muscul. a parte priore Tab. 1. τ. υ. φ. in trunco; ubi a superiore parte post Pectoralem ξ. delitescit. In Tab. 2. pars extremi Φ. in humero, tecta Coracobrachiali & Bicipite brachii u. w. y. z: quæ in Tab. 1. tecta Pectorali ξ. in trunco, & Deltoïde M. &c. in humero. — A parte posteriore Tab. 5. P. &c. in dorso; tectus a principio Cucullari B F. in fine subeuns Teretem majorem O. — A latere Tab. 9. Ω. &c. in trunco; ubi a principio Cucullari ω. tectus, in fine subit brachium.

(e) Eustach. Tab. 29 O. dextr. Albin. Tab. Muscul. 6. p. &c. in dorso; ubi ex parte sub Rhomboïdeo minore m. In Tab. 5. subjacet Cucullari B. in dorso, & Latissimo dorsi P.; parva parte nudus L.

Rhomboïdei minores (*f*), Serrati poſtici ſuperiores (*g*), Serrati poſtici inferiores (*h*), Levatores ſcapularum (*i*), Splenii capitis (*k*), Splenii colli (*l*). Biventres cervi- cis

(*f*) Euſtach. Tab. 29. N. Albin. Tab. Muſcul. 6. m. in dorſo. In Tab. 5. ſubjectus Cucullari B. in collo & dorſo.

(*g*) Euſtach. Tab. 29. M. Tab. 36. e. Albin. Tab. Muſcul. 6. æ. &c. in cervicis & dorſi latere ſiniſtro; ubi partem tegit Levator ſcapulæ Z., extremisque ſcapulam ſubit, Serrato magno ſubjectus. Deinde in latere dextro æ. b.; ubi pariter partem tegit Levator ſcapulæ Z: cætetem tectus Rhomboïdeo minore m., & majore p. p. q.: quæque nuda eſt pars, ea in Tab. 5. ſubjacet Cucullari B. in collo & dorſo.

(*h*) Euſtach. Tab. 36. g. h. Albin. Tab. Muſcul. 6. C. &c. in inferiore trunci parte; ubi principio ejus ſuperinductus latus tendo U., quo Latisſimus dorſi incipit. In Tab. 5. poſt Latiſſimum dorſi P. &c. in dorſo totus delitescit.

(*i*) Euſtach. Tab. 29. L. Tab. 36. d. Albin. Tab. Muſcul. a parte priore Tab. 2. π. in collo; ubi cæterum poſt claviculam, Coracohyoïdeum α. ſupra claviculam, Sternocleidomaſtoïdeum λ. In Tab. 1. poſt Cucullarem ψ. in collo & trunco. — A parte poſteriore Tab. 6. Z. in cervice; ubi extremo delitescit poſt Splenium capitis P. Dein Tab. 5. A. in collo; cæterum tectus ibi Cucullari B., & Sternocleidomaſtoïdeo u.; & ibi delitescens quoque poſt Splenium capitis z. Dein a latere Tab. 9. ψ. in collo; ubi ſimiliter Cucullari ω. cæterum ſubjacet; & Sternocleidomaſtoïdeo ϱ.

(*k*) Euſtach. Tab. 29. I. dextr. Tab. 36. c. Albin. Tab. Muſcul. 6 P. in cervice; ubi infra tectus Serrato poſtico ſuperiore æ. b. Dein Tab. 5. z. in collo, ea parte nudus; cæterum tectus Cucullari B., & in fine Sternocleidomaſtoïdeo u. Dein à latere Tab. 9. υ. in collo, nudus ea parte; cæterumque tectus pariter Cucullari ω., & Sternocleidomaſtoïdeo ϱ.

(*l*) Euſtach. Tab. 37. c. Albin. Tab. Muſcul. 6. T. U. V. in ſiniſtra parte cervicis & dorſi; ubi majorem partem tectus Serrato poſtico ſuperiore æ. b., & Levatore ſcapulæ Z. Dein T. in dextra parte

cis (*m*), Complexi (*n*), Trachelomaſtoïdei (*o*), Trans-
ver-

te cervicis & dorſi Tab. 6., ubi pariter tectus Levatore Z., & Serrato poſtico ſuperiore æ. b., & ab inferiore præterea parte Rhomboïdeo majore p. p. q., & quæ ibi nuda pars ejus, ea in Tab. 5. ſubjacet Cucullari B. in collo & dorſo. — A latere autem Tab. 9. φ. in collo, nudus parte illa; ibi cæterum tectus Cucullari ω., & in fine ſubjectus Sternocleidomaſtoïdeo ϱ.

(*m*) Veſalius de h. c. f. Lib. 2. Tab. 13. A. B. C. D. Albin. Tab. Muſcul. 7. f—n. in cervice & trunco; ubi infra tectus Longisſimo dorſi ψ., & Transverſali Cervicis. Dein Tab. 6. M. N. in cervice, & y. in dorſo; ubi tectus Splenio capitis P., & colli T. U. V., & Serrato poſtico ſuperiore æ. b., & quæ ibi in ſiniſtro latere ab inferiore parte nuda pars y., ea in dextro latere Rhomboïdeo majore p. p. q. tecta. Dein Tab. 5. y. in cervice; ubi cæterum tectus Splenio capitis z., & Cucullari C., & Sternocleidomaſtoïdeo x. — A latere. Tab. 9. τ. in capite & collo; ubi tectus Splenio capitis υ. & colli φ., & Cucullari r. ω. & Sternocleidomaſtoïdeo ϱ. σ.

(*n*) Veſalius de h. c. f. Lib. 2. Tab. 13. G. G. Albin. Tab. Muſcul. 7. u. v. in cervice & trunco; ubi magnam partem ſubjacet Biventri f—n., & Trachelomaſtoïdeo z. A., cum Transverſali cervicis, & Longisſimo dorſi ψ. Et qua parte nudus illa in Tabula eſt, ea ſubjacet Splenio capitis P., & colli T. in cervice Tab. 6. — A priore parte Tab. 3. E. in collo; ubi tectus Obliquo ſuperiore capitis Æ., & qua nudus ibi, ſequitur in Tab. 2. poſt Biventrem maxillæ y. in collo.

(*o*) Veſalius de h. c. f. Lib. 2. Tab. 13. E. F. Euſtach. Tab. 37. b. utr. lat. Albin. Tab. Muſcul. 7. z. &c. in cervice; ubi & tectus portione Longisſimi dorſi ψ., & Transverſali cervicis C. Dein Tab. 6. W. in cervice; ubi præterea Serrato poſtico ſuperiori æ. b. ſubjacet, & Levatori ſcapulæ Z., & Longisſimi dorſi portioni X., & Splenio colli T., & Splenio capitis P. Et quod nudum ibi, id in Tab. 5. ſubjacet Cucullari B. in cervice & dorſo. — A priore parte Tab. 3. E., in collo; ubi poſt Scalenum medium E., & Complexum E. Et qua nudus ibi, ſubjacet in Tab. 2. Sternomaſtoïdeo λ. in collo, & Biventri maxillæ y.

verſales cervicis (*p*), Cervicales deſcendentes (*q*), Longisſimi dorſi & Sacrolumbales (*r*), Spinales dorſi (*s*), Semiſpinales dorſi (*t*), Spinales cervicis (*u*), Interſpinales cer-

(*p*) Euſtach. Tab. 37. d. Albin. Tab. Muſcul. 7. C. C. in cervice, ubi præterea Longisſimo dorſi ✠. ſubjacet, & Cervicali deſcendenti D., & Trachelomaſtoïdeo z. Dein Tab. 6. Y. in cervice; ubi etiam Serrato poſtico ſuperiori æ. b. ſubjacet, & Levatori ſcapulæ Z., & Longisſimo dorſi X: ſupra quoque delitescit ſub Splenio colli T. & capitis P. Et quod in Tabula illa 6. nudum, id in Tab. 5. ſubjacet Cucullari B. in collo & dorſo.

(*q*) Albin. Tab. Muſcul. 7. D. D. in trunco.

(*r*) Euſtach. Tab. 36. l. γ. δ. Albini Tab. Muſcul. 7. δ — Ω. in trunco, cum D. in cervice; ubi poſtremus tendo Longisſimi cum Cervicalis deſcendentis tendine conjunctus, ſe flectit poſt Transverſalem cervicis C. C. in cervice. Dein Tab. 6. κ — ο. in trunco, & X. in cervice; ubi majorem partem tecti lato tendine, quo incipiunt Serratus poſticus inferior & Obliquus internus abdominis, cui ſuperinductus latus tendo U., quo Latisſimus dorſi incipit, tecti & Serrato poſtico inferiore C. D., & Rhomboïdeo majore p. p. q., & Serrato poſtico ſuperiore æ. b., & Levatore ſcapulæ Z. Et quod illa in Tabula in dextro latere nudum eſt, id in Tab. 5. tegit Latisſimus dorſi P. & Cucullaris B., in dorſo; præter exiguam partem M. ibidem.

(*s*) Euſtach. Tab. 37. l. utr. lat. Albin. Tab. Muſcul. 7. i. in trunco. Dein Tab. 6. α. in dorſo, ubi magnam partem tectus Serrato poſtico inferiore C., & Rhomboïdeo majore p. p. q., & Splenio colli V. in latere ſiniſtro. Et quod nudum in illa Tabula, id in Tab. 5. contectum Latisſimo dorſi P., & Cucullari B. in dorſo.

(*t*) Albin. Tab. Muſcul. 8. p. in dorſo. Dein Tab. 7. a. b. c. d. e. g. h., ubi cæterum tectus Spinali dorſi i., Longisſimo dorſi Σ., & Biventre cervicis h., in cervice. Dein Tab. 6. z. in dorſo; ubi præterea tectus Splenio colli U. V., & Splenio capitis P. in cervice: & qua nudus ibi, in dextro latere jacet poſt Rhomboïdeum majorem p. p. q. in dorſo.

cervicis (*w*), Recti postici majores capitis (*x*), Recti postici minores capitis (*y*), Obliqui inferiores capitis (*z*), Obliqui superiores capitis (*a*) Multifidi Spinæ (*b*), Interspi-

(*u*) Eustach. Tab. 39. Fig. 1. f. Albin. Tab. Muscul. 8. n. 2. &c. in dorso & cervice. Dein Tab. 7. o. o. in cervice & trunco, ubi præterea tectus Biventre cervicis l. i. &c. & Complexo u; & Longissimo dorsi ✠. Σ. Dein Tab. 6. ubi non distinctus a Semispinali dorsi z. in dorso: cæterum subjectus Splenio colli T., & capitis P. in cervice; & Serrato postico superiori æ. b. in dorso; & qua in sinistro latere cum Semispinali dorsi nudus z., in dextro subjacet Rhomboïdeo majori p. p. q. in dorso.

(*w*) Cowper Myotom. ann. 1694. Fig. 8. L. L. L., & ann. 1724. Tab. 44. Fig. 1. n. 100. Albini Tab. Muscul. 8. n. o. p. q. r. in colli sinistra parte. Dein in dextra, ubi tres superiores n. o. p. ex parte subjacent Spinali cervicis 2. Dein Tab. 7. p. q. r. s. t. in cervice; ubi superiores tres r. s. t. pariter Spinali cervicis o. ex parte subjacent; supremus t. etiam Biventri cervicis l. Et qua nudi ibi, in Tab. 6. subjacent Splenio capitis P. in cervice: supremus etiam ex parte nudus ab eo, mox infra O., subjacens Cucullari B. in collo & dorso Tab. 5.

(*x*) Eustach. Tab. 39. Fig. 1. b. Albin. Tab. Muscul. 8. d. &c. in capite & collo; ubi extremo suo subit Obliquum superiorem g. In Tabula autem 7. delitescit post Complexum cum Biventre cervicis u. l. in cervice.

(*y*) Eustach. Tab. 39. Fig. 1. a. Albin. Tab. Muscul. 8. a. &c. in capite & collo, ubi ex parte tectus Recto postico majore d.: quod vero nudum, id in Tab. 7. subjacet Complexo cum Biventre cervicis, u. l. in cervice.

(*z*) Eustach. Tab. 39. Fig. 1. d. Albin. Tab. Muscul. 8. k. &c. in collo. Dein Tab. 7. y. in cervice; ubi cæterum tectus Complexo u; & Trachelomastoïdeo z. B., & qua parte nudus, ea in Tab. 6. delitescit post Splenium capitis P. in cervice.

(*a*) Eustach. Tab. 39. Fig. 1. c. Albin. Tab. Muscul. 8. g. &c. in capite & collo. Dein Tab. 7. w. x. in cervice; ubi cæterum tectus Com-

ſpinales lumborum (*c*), Interſpinales dorſi (*d*), Intertrans-verſarii lumborum (*e*), Intertransverſarii dorſi (*f*), Leva-tores

Complexo u., Biventre cervicis l., & Trachelomaſtoïdeo z. B. Et qua parte nudus ibi, ea Splenio capitis ſubjacet P. in cervice Tab. 6. A priore parte Tab. 4. s. in capite, & Tab. 3. Æ. in capite.

(*b*) Euſtach. Tab. 39. Fig. 1. m. m. utr. lat. in cervice. Cowper Myotom. ann. 1694. Fig. 8. K. Albin. Tab. Muſcul. 8. n. 14. 14. in latere ſiniſtro; ubi ſummum ejus extremum tectum Obliquo inferiore capitis, k. l. in capite & collo. Dein n. 14. 14. in latere dextro, ubi præterea tectus Spinali cervicis 2., & Semiſpinali dorſi p. in dorſo. Dein Tab. 7. x. in trunco; ubi præter partem illam in totum tectus capite communi Longiſſimi dorſi & Sacrolumbalis δ. ε. in trunco, & Longisſimo dorſi Σ. in trunco; & Spinali dorſi i. in trunco; & Complexo u. in cervice. Pars autem quæ nuda ibi eſt, ea in Tab. 5. jacet ſub Gluteo magno γ. in nate.

(*c*) Albin. Tab. Muſcul. a parte poſteriore Tab. 8. Θ. Λ. Ξ. Π. Σ. Φ. ſecundum ſpinam; ubi a latere iis adjacet Multifidus 14. & Tab. 7. A poſteriore autem parte jacent poſt latum tendinem, quo incipiunt Serratus poſticus inferior & Obliquus internus abdominis, cui tendini ſuperinductus latus tendo, quo Latiſſimus dorſi incipit U. Tab. 6. in trunco.

(*d*) Albin. Tab. Muſcul. Tab 8. Γ. Δ. ſecundum ſpinam; ubi & a latere iis adjacet Multifidus 14. Et a poſteriore etiam parte jacent poſt latum tendinem, quo incipiunt Serratus poſticus inferior & Obliquus internus abdominis, cui tendini ſuperinductus latus tendo, quo Latisſimus dorſi incipit U. Tab. 6. in trunco.

(*e*) Albin. Tab. Muſcul. 8. Ψ. Ω. α. β. γ. in lumbis. Qui in Tab. 7. poſt commune principium Sacrolumbalis & Longisſimi dorſi. δ. ε. in trunco.

(*f*) Albin. Tab. Muſcul. 8. f. g. h. i. k. l. m. n. o. in latere ſiniſtro. In dextro tertius h., quartus i, quintus k, ſextus l., ex parte tecti Semiſpinali dorſi q r. s. t.: ſeptimus m., octavus n., nonus o., Spinali cervicis 3. 4. 5. Et qua ibi nudi, ſubjecti Longisſimo dorſi Σ. in trunco Tab. 7.

tores coſtarum breviores (*g*), Levatores coſtarum longiores (*h*).

In ſpatiis intercoſtalibus, Intercoſtales externi (*i*), interni (*k*).

In

(*g*) Verheyen Tab. 35. Fig. 1. e. e. Albin. Tab. Muſcul. 8. κ. λ. μ. ν. ξ. ο. π. ϱ. σ. ς. τ. υ. in dorſo, ubi, præter tres primos, tecti Intertransverſariis dorſi f. g. h. i. k. l. m. n. o.: nonus, decimus & undecimus tecti Levatoribus longioribus A. F. G.; tres primi tecti Spinali colli 6. 7. 8.; itemque quartus, quintus, ſextus; ſeptimus autem, octavus, nonus, decimus Semiſpinali dorſi t. s. r. q.; omnes Multifido. In Tab. autem 7. præterea ſuperinductus Longiſſimus dorſi μ. Σ. Ψ., & Sacrolumbalis ν — Π., cum Cervicali deſcendente D., in trunco; & ſuperioribus aliquot etiam Transverſalis cervicis C. C., & Complexus u.; primo & ſecundo Scalenus poſticus F.: ex parte autem nudus ſecundus I., tertius K., quartus L., quintus M.; iisque partibus in Tab. 6. inſidet Serratus poſticus ſuperior æ. b. in dorſi ſiniſtra parte; ubi ſolius quinti pars nuda Φ., quam in dextra parte integit Rhomboïdeus major q. — A priore parte primus Tab. 4. σ. in collo; ex parte tectus Scaleni medii cauda ♂. ad proceſſum transverſum vertebræ colli primæ pertinente. Et Tab. 3. Ξ. in collo, pariter tectus cauda Scaleni medii c. modo dicto.

(*h*) Verheyen Tab. 35. Fig. 1. f. f. Albin. Tab. Muſcul. 8. A. F. G. in dorſo; ubi ex parte ſubjacent Intertransverſariis dorſi i. h. g. Dein ſuperinductus Longisſimus dorſi cum Sacrolumbali μ. &c. in trunco. Tab. 7.

(*i*) Euſtach. Tab. 39. Fig. 1. i. l. &c. utr. lat. Tab. 33. l. &c. utr. lat. Albin. Tab. Muſcul. 8. H. I. K. L. M. N. O. P. Q. R. S. in dorſo, ubi ex parte tecti Levatoribus brevioribus coſtarum λ — υ., & nonus præterea, decimus, & undecimus, Levatoribus longioribus A. F. G. Dein Tab. 7. N — W. in trunco, ubi tecti Sacrolumbali ν — Π., cum Cervicali deſcendente D.; præter primum: & præterea ſecundus N., tertius O., & quartus P., tecti Levatoribus brevioribus K. L. M.: primus autem delitescit poſt Levatorem breviorem I.; & Scalenum poſticum F.; ex parte etiam poſt Longisſimum dorſi Φ. Σ. Ψ. delitescunt,

quin-

In colli sceleti lateribus parteque priore, Scaleni priores (*l*), me-

quintus, sextus, septimus, octavus. Dein Tab. 6. φ. χ. ψ. ω. Γ. Δ. Δ. Θ. Λ. in dorsi parte sinistra; ubi quod eorum in Tab. 7. nudum, majorem partem tectum Serrato postico superiore æ b., Serrato magno Π—B., & Serrato postico inferiore C — L.; respondetque pars dextra, nisi quod quæ pars quarti φ, & quinti χ., & sexti ψ., nuda in sinistra, tecta sit in hac Rhomboïdeo majore q.; tecta & pars septimi ω. Et quæ in dextra parte Tab. 6. nuda sunt; ea Latissimus dorsi P. in dorso Tab 5. integit. — A priore parte Tab. 4. ς. ϛ. τ. υ. φ. χ. ψ. ω. A. in trunco, & Tab. 3. G — S. in trunco. Dein Tab. 2. K.K.K.K. K.K. in trunco, ubi tecti Serrato magno ψ — G, & antico υ. In pectore, primusque præterea delitescit post Subclavium σ. in pectore. Nudamque primi in Tab. 2. partem Pectoralis ξ. in trunco Tab. 1. integit: cæterorum Obliquus externus abdominis d. &c. —— Ex interiore parte Tab. 4. primus ς., secundus ϛ., tertius τ. infra collum intus in thorace; ubi secundus ϛ. tectus Intercostali interno secundo C.

(*k*) Eustach. Tab. 38. l.l. &c. utr. lat. Tab. 33. h. i. Albin. Tab. Muscul. a parte posteriore Tab. 8. T. — Z. a. æ. b. c. in dorso. In dextro autem latere delitescunt post externos H — S. in dorso, præter partem undecimi c., quæ & in Tab. 7. X. in trunco, & in Tab. 6. Ξ in dorso, ex parte tecta Obliquo interno abdominis R. S.; & quæ ibi superest nuda pars, ea tecta Obliquo externo abdominis W. in trunco Tab. 5., & Latissimo dorsi P. — A priore parte Tab. 4. B. C. D. E. F. G. H. I. K. in sinistra trunci parte. Dein in dextra B. C. D. ubi tecti externis ς. ϛ. τ., plenius autem in Tab. 3. T. Y. Z. a — k. in trunco, tecti externis G — S. Dein Tab. 2. L. L. &c. in trunco; ubi pariter tecti externis K. K. &c., itemque secundus, tertius, & quartus, Serrato antico υ. in pectore; quintusque etiam, & sexti & septimi portiones priores separatæ, ex parte subjacent Recto abdominis Z. &c. Dein quæ nuda in Tabula illa sunt, in Tab. 1. subjacent Pectorali ξ. in trunco, & Obliquo externo abdominis D. &c. —— A parte interiore secundus Tab. 4. C. C. infra collum, intus in thorace. Undecimi Tab. 4. L. L. L. in trunco, ubi tecti Diaphragmate U. Θ. Π. Π., U. Σ. Σ. Σ. Ω. Nonus Tab. 8. æ. in dorsi parte dextra.

medii (*m*), postici (*n*), Recti interni majores capitis (*o*), Longi

(*l*) Eustach. Tab. 38. i. Tab. 33. a. utr. lat. Albin. Tab. Muscul. 3. Π. Σ. &c. in collo, ubi infra post claviculam; caudæ in fine subjectæ Recto interno majori capitis Γ., Longique colli extremo Θ. ad processum transversum vertebræ colli secundæ pertinenti. Dein Tab. 2. ϱ. in pectore; ubi cæterum post claviculam, Coracohyoïdeum α. in collo, Sternocleidomastoïdeum ν. ι. λ. Et quæ pars in Tabula illa nuda, ea in Tab. 1. post Pectoralem ξ. in trunco.

(*m*) Eustach. Tab. 28. g. utr. lat. Tab. 39. Fig. 1. c. Tab. 37. f. utr. lat. Albin. Tab. Muscul. a parte priore Tab. 4. β. γ. &c. in collo; ubi a principio post claviculam. Dein Tab. 3. A. B. C. &c. in collo; ubi a principio pariter post claviculam, & magnam præterea partem tectus Scaleno priore Π. &c., inque fine Recto capitis interno majori Γ. Dein Tab. 2. ο. ο. in collo, tectus Coracohyoïdeo α. juxta claviculam & Sternocleidomastoïdeo ι. λ. Et quæ nuda sunt in illa Tabula, ea post Latissimum colli Ω. &c. in collo Tab. 1. — A parte posteriore Tab. 8. s. &c. in collo, ubi infra tectus Levatore costæ primæ κ. supra, Intertransversario colli posteriore sexto ς. Dein Tab. 7. E. in cervice; ubi præterea tectus Scaleno postico F. G. H., Cervicali descendente D. cum supremo Longissimi dorsi tendine, Transversali cervicis C., Trachelomastoideo z: & quod nudum id in Tab. 6. subjacet Levatori scapulæ Z. in cervice. —— A latere Tab. 9. χ. in collo.

(*n*) Eustach. Tab. 37. e. Albin. Tab. Muscul. 7. F. G. H. in cervice, & trunco; ubi in fine subjacet Cervicali descendenti D, & Transversali cervicis C. C. Reliquum autem in Tab. 6. tegit Levator scapulæ Z. in cervice.

(*o*) Eustach. Tab. 38. c. Tab 41. Fig. 13. Π. Fig. 8. a. Tab. 33. Τ. Albin. Tab. Muscul. 3. Γ. in collo. Dein Tab. 2. ξ. in collo, ubi partim post Sternomastoïdeum ν. λ. In Tab. 1. ob superinductum Latissimum colli Ω. non apparet pars ejus, quæ in Tab. 2.

(*p*) Eustach. Tab. 38. d. & e. f. Tab. 41. Fig. 13. Σ. utr. lat. Albin. Tab. Muscul. 4. t. &c. in collo. Dein Tab. 3. Δ. Θ. in collo; ubi partim tectus Recto capitis interno majore Γ., partim post Con-

stri-

gi colli (*p*), Recti interni minores capitis (*q*), Recti laterales capitis (*r*), Intertransverſarii colli priores (*s*), Intertransverſarii colli poſteriores (*t*).

In ſcapula, & humeri ſuperiore parte, Deltoïdes (*u*), Su-

ſtrictorem inferiorem pharyngis ω, partim poſt Sternothyreoïdeum π. delitescit, &c. Quod autem in Tabula illa nudum, id in Tab. 2. delitescit poſt Sternomaſtoïdeum ν. λ. in collo.

(*q*) Euſtach. Tab. 38. b. utr. lat. Tab. 41. Fig. 13. Ξ. utr. lat. Partim jacet poſt Rectum internum majorem in Fig. 19. Tab. 16. Albin. partim ab ejus externo latere nudus ab eo.

(*r*) Euſtach. Tab. 38. a. utr. lat. Tab. 41. Fig. 13. Λ. utr. lat.

(*s*) Cowper Myotom. ann. 1724. Tab. 44. Fig. 1. Intertransverſales colli; ubi priores a poſterioribus non diſtincti. Albin. Tab. Muſcul. 4. ξ. quartus, ο tertius, π. ſecundus, ϱ. primus, in collo; ubi illi ex parte ſubjacent Scaleni medii caudis μ. λ. ι. ν., & primus Longi colli caudæ z. α. pertinenti ad proceſſum transverſum vertebræ colli ſecundæ; ſecundus, tertius, & quartus, ejusdem Longi capitibus, quæ oriuntur a procesſibus transverſis vertebrarum colli x. w. v. Dein Tab. 3. primus Λ. in collo; ubi pariter ex parte ſubjacet Longi colli caudæ Θ. pertinenti ad proceſſum transverſum vertebræ colli ſecundæ; & præterea Scaleni prioris caudæ Φ., reliqui autem tres delitescunt poſt Rectum capitis internum majorem Γ.

(*t*) Albin. Tab. Muſcul. 4. jacent poſt Intertransverſarios priores ξ. ο. π. ϱ. in collo, & Scaleni medii caudas μ. λ. ι. ν. A poſteriore parte Tab. 8. δ. ε. ζ. η. θ. ι. in collo, ubi ſextus δ. ex parte poſt Obliquum capitis inferiorem k.

(*u*) Euſtach. Tab. 32. n. 22. Tab. 29. n. 6. Albin. Tab. Muſcul. a parte priore Tab. 1. M. &c. in humero; ubi a principio velatus Latisſimo colli α. α. α.; in fine tectus Bicipite brachii W. in brachio. —— A parte poſteriore Tab. 5. ζ. &c. in humero; ubi a principio ſubjacet Cucullari G. in dorſo, in fine Brevi ξ. in humero. —— A latere Tab. 9. A. &c. in ſiniſtro brachio, ubi in fine poſt Brachialem internum S.

Supraſpinatus (w), Infraſpinatus (x), Teres minor (y), Teres major (z), Subſcapularis (a).

In

(w) Euſtach. Tab. 29. n. 8. Albin. Tab. Muſcul. a parte priore Tab. 2. r. s. in brachio; ubi ex parte ſub conjunctione ſcapulæ & claviculæ in ſummo humero: cæterum ibi poſt Coracohyoïdeum, qua is de ſcapula ſurgit; & delitescens poſt Subclavium σ in pectore; & quod nudum illa in Tabula, ſubjacet id Deltoïdi M. &c. in humero Tab. 1. — A parte poſteriore Tab. 6. ι. in ſcapula. In Tab. 5. tectus Cucullari B H. H. in collo & dorſo.

(x) Euſtach. Tab. 29. n. 12. utr. lat. Albin. Tab. Muſcul 6 μ. &c. in ſcapula; ubi ex parte ſub Terete minore τ., & extremo ſuo ſuperiorem ſcapulæ proceſſum aliquantum ſubit. Dein Tab. 5. I. K. in dorſo; ubi ex parte & Latisſimo dorſi P. tectus, & Cucullari B. G. & Deltoïde ζ &c in humero. — A latere Tab. 9. Π. in trunco; ubi pariter pars Latisſimo dorſi Ω. tecta, pars Cucullari Ξ., pars Deltoïde A. &c. in brachio ſiniſtro.

(y) Euſtach. Tab. 29. n. 13. utr. lat. Albin. Tab. Muſcul. 6. τ. in ſcapula; ubi ab initio ex parte tectus Infraſpinato σ., & Terete majore ψ. Dein Tab. 5. N. in dorſo, ubi pariter tectus Infraſpinato I. & Terete majore O., & præterea Deltoïde ζ in humero. — A latere Tab. 9. Φ in trunco; ubi quoque ex parte ab initio tectus Infraſpinato. Π. & Terete majore Ψ, dein Deltoïde A. &c. in brachio ſiniſtro.

(z) Euſtach. Tab. 29. n. 15. Tab. 36. V. Tab. 38 F. Albin. Tab. Muſcul. a parte priore Tab 3. z. α. in ſcapula; ubi partem Subſcapularis v. tegit, partem Coraco-brachialis η. ζ. in humero. Dein Tab. 2. Σ in ſcapula; ubi pariter tectus Subſcapulari Λ. in ſcapula, & Coraco-brachiali u. in brachio; & præterea extremo Latiſſimi dorſi Φ. in ſcapula. Dein Tab. 1. σ. σ. in trunco, ubi tectus Latiſſimo dorſi τ., & delitescit poſt Pectoralem ξ.: in brachio autem dextro, quia pendet, ita delitescit poſt eos illa pars, quæ in ſiniſtro, quia ſublatum, nuda, ut nihil cerni ejus queat. — A parte poſteriore Tab. 7. κ λ. μ. in ſcapula, ubi extremo ſuo os humeri ſubit. Dein Tab. 6. ψ. ψ. circa humerum, ubi pars ſubjacet Infraſpinato σ. σ., pars Tereti minori τ.,

pars

In humero, Biceps brachii (*b*), Coraco-brachialis (*c*), Brachialis internus (*d*), Triceps brachii (*e*).

In

pars Longo C. D. in brachio: in brachio finiftro etiam brevi A. Dein Tab. 5. O. in dorfo; ubi pariter pars Infrafpinato I. fubjacet, & Tereti minori N., & Longo o. in humero; & præterea Latiffimo dorfi P. & Deltoïdi ζ. in humero. ——— A latere Tab 9. Ψ. in trunco; ubi pars fubjecta Infrafpinato Π.; pars Latiffimo dorfi Ω., pars Deltoïdi A. &c. in brachio finiftro.

(*a*) Euftach. Tab. 33. n. 33. utr. lat. Tab. 38. E. Albin. Tab. Mufcul. 4. Φ. &c. in fcapula. Dein Tab. 3. v. v. &c. in fcapula; ubi ex parte tectus Coraco-brachiali cum capite breviore Bicipitis brachii β. &c. in humero. Dein Tab. 2. Λ. Λ. Π. Ξ. in fcapula, ubi pariter tectus Coraco-brachiali cum capite breviore Bicipitis Brachii w. in brachio, & præterea delitescit poft Serratum anticum υ. φ., & Subclavium σ. in pectore. Et quod nudum in Tab. 2. ejus pars in prima tecta Deltoïde M. &c. in humero, reliquo delitescente poft Pectoralem ξ. in trunco.

(*b*) Euftach. Tab. 32. n. 23. 24. 25., utr. lat. Albin. Tab. Mufcul. 2. w—γ. in brachio. Dein Tab. 1. W—Γ. in brachio; ubi a principio fubjacet Pectorali ξ. in pectore, & Deltoïdi M. &c. in humero; in fine Pronatori tereti Φ. in brachio dextro. — A pofteriore parte Tab. 6. O. in brachio. — A latere Tab. 9. P. Q. R. In brachio finiftro, η. θ. ι. in dextro.

(*c*) Euftach. Tab. 32. n. 21. 21. & Tab. 33. n. 36. utr. lat. Albin. Tab. Mufcul. a parte priore Tab. 3. ζ. η. β. &c. in humero; ubi in fine aliquantum tectus Brachiali interno μ. Dein Tab 2. u. in brachio; magnam partem tectus Bicipite brachii w. x. Dein Tab. 1. R. S. in brachio; ubi pariter tectus Bicipite brachii X., & præterea Pectorali ξ. in trunco, & Deltoïde M. in humero. — A parte pofteriore Tab. 7. γ. in brachio, ubi pars fubjacet Tereti majori μ., & Subfcapulari ι., in fcapula; pars Brachiali externo ξ. ο. in brachio: pars offi humeri. Et quæ pars ibi nuda, ea in Tab. 6. tecta Longo C., & Brevi ω, in humero: exigua parte, inter eos & Teretem majorem ψ. in fcapula, nuda; quam in Tab. 5. Deltoïdes integit, ζ. &c. in humero.

In Cubito, Supinator longus (*f*), Radialis externus longior

(*d*) Euſtach. Tab. 32. n. 28. 28. utr. lat. Tab. 38. G. Albin. Tab. Muſcul. 3. κ. &c. in humero; ubi in fine ſubjacet portioni ad Flexorem longum pollicis accedenti Φ. in cubito. Dein Tab. 2. θ — κ. in brachio; ubi cæterum Bicipiti brachii α. β. γ. ſubjacet, & Sublimi D. in cubito. Dein Tab. 1. Λ. Λ. Λ. in brachio; pariter cæterum ſubjectus Bicipiti brachii Y. Z. Γ., & præterea Pronatori tereti Φ. & Supinatori longo Π. — A parte exteriore. Tab. 7. ω. A. in brachio: ubi ex parte ſubjacet Radiali externo longiori C. C. Dein Tab. 6. P. in brachio, ubi pariter tectus Radiali externo longiore R., & præterea Tricipite brachii ω. F. Dein Tab. 5. ✝. in humero, pariter tectus Tricipite brachii ξ. ϱ., & Radiali externo longiore B. in cubito, & præterea Supinatore longo ω. — A latere Tab. 9. S. in brachio ſiniſtro, ζ. in dextro.

(*e*) Euſtach. Tab. 29. n. 16. 17. 18. utr. lat. Tab. 32. n. 26. 27. utr. lat. Albin. Tab. Muſcul. a parte interiore Tab. 2. δ. ε. ζ. η. in brachio; ubi ex parte poſt Coraco-brachialem u., Bicipitemque brachii x. z. α. delitescit; & Longus ε. à ſuperiore parte ſubit Teretem majorem Σ. in ſcapula, Brevis δ. tectus Brachiali interno θ. in brachio. Dein Tab. 1. T. V. Δ. Θ. in brachio; ubi eodem modo poſt Coraco-brachialem R. S., & Bicipitem brachii W. X. Y. delitescit: & Longus T. ſubit Teretem majorem σ. in trunco, Brevis V. tectus Brachiali interno Λ. Separatim autem Brachialis externus Tab. 3. θ. ι. in humero, ex parte tectus Coraco-brachiali ζ.: dein Tab. 2. ζ. η. in brachio, & Tab. 1. Δ. Θ. in brachio. — A parte exteriore Tab. 6. ω. — N. in brachio; ubi principium Longi D. tectum Terete minore τ. in ſcapula. Dein Tab. 5. ξ. — χ. E. in humero; ubi Longi ο. & Brevis ξ. principium tectum Deltoïde ζ. &c. — A latere Tab. 9. T. — X. in brachio ſiniſtro, α. — ε. in dextro.

(*f*) Euſtach. Tab. 32. n 30. utr. lat. Albin. Tab. Muſcul. 1. Π. Σ. in brachio; ubi a principio ſubjacet Brachiali interno Λ., juxta finem Abductori longo pollicis χ. b., & Extenſori minori. c. — A poſteriore parte Tab. 5. ω. in cubito; ubi a principio tectus Tricipite brachii ξ. ϱ. in humero, dein Radiali externo longiore A. in cubito. — A latere Tab. 9. Z. a. in brachio ſiniſtro, κ. in dextro.

gior (*g*), Radialis externus brevior (*h*), Extenſor com-
munis

(*g*) Euſtach. Tab. 29 n. 31. 31. 31. Tab. 33. n. 52. 61. Albin. Tab. Muſcul. a parte exteriore Tab. 7. B. — F. in cubito; ubi pars prior tecta Radiali externo breviore G. H. Dein Tab. 6. Q. — U. in brachio; ubi a principio ſubjectus Tricipiti brachii L.; tendine autem Abductori longo pollicis Λ., Extenſori minori Ψ., majori a. c.; prætereaque etiam pars prior tecta Radiali externo breviore V. Dein Tab. 5. A. — D. in cubito; ubi eodem modo ſubjectus Tricipiti brachii ϱ. in humero, Abductori longo pollicis 21. in cubito, Extenſori minori 24., majori 13., Radiali externo breviori H., & præterea Supinatori longo ω. — A latere Tab. 9. g. h. i. i. i. k. in brachio ſiniſtro. — A parte priore Tab. 3. σ. — υ. in cubito ſiniſtro (π. ϱ. in dextro); ubi a principio poſt Brachialem internum ξ. Dein Tab. 2. ν. — ϱ. in cubito ſiniſtro (λ. μ. in dextro); ubi eodem modo poſt Brachialem internum ι., & præterea tectus Abductore longo pollicis Z. (a. b. d. in cubito dextro), & Extenſore minore e., & majore g. Dein Tab. 1. f. g. h. i. in brachio ſiniſtro (g. h. in dextro), ſubjectus pariter Abductori longo pollicis φ. (χ. b. in brachio dextro) Extenſori minori c., majori y., in manu ſiniſtra, & præterea Supinatori longo π. in brachio.

(*h*) Euſtach. Tab. 29. n. 30. 30. 30. Tab. 23. n. 58. 62. Albin. Tab. Muſcul. a parte exteriore Tab. 7. G. H. I. in cubito; ubi ex parte ſubjacet Radiali externo longiori B. E., & Supinatori brevi K. Dein Tab. 6. V. W. X. in brachio; ubi pariter ſubjectus Radiali externo longiori Q. T., & Supinatori brevi Δ.; & præterea Abductori longo pollicis Λ., Extenſori minori Ψ., majori, a. c. & Indicatori f. h. Dein Tab. 5. H. S. I. I. in cubito; pariter ſubjectus Radiali externo longiori A. D., Abductori longo pollicis 21., Extenſori minori 24., majori 13., & præterea Extenſori communi digitorum d. r. — A latere Tab. 9. l. m. m. m. in brachio ſiniſtro. — A parte priore Tab. 3. φ. φ. χ. χ. ψ. in cubito ſiniſtro (φ. χ. in dextro); ubi ex parte ſubjectus Radiali externo longiori σ. — τ. (π. ϱ. in cubito dextro). Dein Tab. 2. σ. σ. ς. ς. ς. in cubito ſiniſtro (σ. ς. in dextro); ubi pari modo ſubjectus Radiali externo longiori ν. ξ. ο. (λ. μ. in cubito dextro), & præterea

 Ab-

munis digitorum manus (*i*), Extenſor proprius digiti minimi manus (*k*), Ulnaris externus (*l*), Anconeus (*m*), Supina-

Abductori longo pollicis Z., Extenſori minori e., majori. g., & Indicatori Ψ. in manu ſiniſtra. Dein Tab. I. k. k. l. l. l. in brachio ſiniſtro, ſubjectus pariter Radiali externo longiori f. g. i., Abductori longo pollicis φ., Extenſori minori c., majori y. in manu; & præterea Extenſoris communis digitorum tendini ad indicem pertinenti o., & Supinatori longo Π. Σ. in brachio.

(*i*) Euſtach. Tab. 29. n. 28. Albin. Tab. Muſcul. 5. d. &c. in cubito. Præterea 5. Tab. I. m. n. o. p. q. in brachio ſiniſtro. Tab. 9. p. q. r. s. t. in brachio ſiniſtro, manuque; & in manu dextra.

(*k*) Euſtach. Tab. 29. n. 27. Albin. Tab. Muſcul. 5. a. &c. in cubito. Præterea Tab. I. r. s. in brachio ſiniſtro. Tab 7. n. 5. in manu ſiniſtra. Tab. 9. v. w. in brachio ſiniſtro, manuque, & in manu dextra.

Quomodo tendines Extenſorum, communis, & proprii, cohæreant cum Interoſſeis, Lumbricalibus &c., ac deſinant, exhibetur Tab. 5. y. z. γ. δ. ε. η. θ. ι. κ., X. Z. ν. ξ. ο. σ. τ. υ., W. Z. ψ. ω. Γ. Ξ. Π. Σ. Φ., V. Z. 2. 3. 4. 7. 8. 9. 10. in manu dextra. Tab. 6. α. ε. η. θ. ι. λ. μ. ν. ξ., β. ε. σ. ς. ϛ. υ. Φ. χ. ψ., γ. ε. c. f. g. l. m. n. o. δ. ε. r. s. t. v. w. x. y. in manu dextra. Tab. 7. b. f. g. h. i. k. n. o. p. q., c. f. u. v. w. z. α. β. γ., d. f. η. θ. ι. ν. ξ. ο. π., e. f. ς. ϛ. τ. Φ. χ. ψ. ω. in manu dextra. Præterea Tab. I. K. L. M. N. O., P. R., P., Q. in manu ſiniſtra. Et Tab. 2. n. 8. 9. 11. 12. 13. 14. 6. 15. 6. 3. in manu ſiniſtra. Et Tab. 3. m. n. r. s. t. u. v. y. z. w. x. in manu ſiniſtra. Dein Tab. 5. ψ. ω. Γ. Δ. Δ. in manu ſiniſtra. Tab. 6. λ. μ. ν. ξ. ξ. in manu ſiniſtra. Tab. 7. n. 5. 6. 7. 8. 9. 10. in manu ſiniſtra. Tab. 8. q. r. p. in manu ſiniſtra. Dein Tab. 9. ς. ϛ. τ. υ. Φ. χ. ψ. ω. in manu ſiniſtra; & in manu dextra.

(*l*) Euſtach. Tab. 29. n. 26. Albin. Tab. Muſcul. 5. W. — Z. in cubito; ubi in fine aliquantum ſubit Abductorem digiti auricularis β. in manu dextra. A latere Tab. 9. n. o. in brachio ſiniſtro, τ. in dextro.

(*m*) Euſtach. Tab. 37. G. Albin. Tab. Muſcul. 6. Y. &c. in brachio. Tab. 5. F. in cubito; ubi ex parte tectus tendine Tricipitis brachii χ., & Ulnari externo W.

pinator brevis (*n*), Abductor longus pollicis manus (*o*), Extenſor minor pollicis manus (*p*), Extenſor major pollicis

(*n*) Euſtach. Tab. 39. Fig. 1. W. dextr. w. w. ſin. & Tab. 38. I. Albin. Tab. Muſcul. a parte exteriore Tab. 8. Θ. &c. in brachio. Tab. 7. K. &c. in cubito; ex parte tectus Radiali externo breviore G. Tab. 6. Δ. in brachio; ex parte tectus eodem Radiali V., ex parte Anconeo Y., & quod nudum, id in Tab. 5. ſubjacet Ulnari externo W., Extenſori communi digitorum d., & auricularis proprio a. b., in cubito. — A parte interiore Tab. 4. b. — f. in cubito. Tab. 3. ω. — Θ. in cubito; ex parte tectus Brachiali interno ξ. ο., Radiali externo longiore π. (ν. in brachio ſiniſtro), breviore Φ., Pronatore terete Λ., Flexore longo pollicis Π. Σ., Profundo C. Tab. 2. τ. — φ. in cubito; cæterum tectus, ut in Tab. 3., Brachiali interno ι. κ., Radiali externo longiore λ. (ν. in brachio ſiniſtro), breviore σ., Pronatore terete ψ., Profundo χ.; & præterea tendine Bicipitis brachii γ., & Sublimi G. Dein Tab. 1. Ξ. in brachio, cæterum tectus tendine Bicipitis brachii Γ., Brachiali interno Λ., Supinatore longo Π., Pronatore terete Φ.

(*o*) Euſtach. Tab. 29. Π. 32. dextr. 33. 34. ſin. Tab. 33. n. 59. Albin. Tab. Muſcul. a parte exteriore Tab. 6. Λ. — Φ. in brachio, tectus Radiali externo breviore V., Supinatore brevi Δ., Extenſore majore pollicis a., minore Ψ. Ω. Dein Tab. 5. n. 21 — 23. in cubito; tectus radiali externo breviore H., Extenſore communi digitorum d., auricularis proprio a., Extenſore minore pollicis 24. 25. Præterea Tab. 2. Z. a. b. in cubito ſiniſtro. Tab. 1. φ. χ. ψ. ω. b. b. in brachio ſiniſtro. Tab. 9. x y. y. z. z. in brachio ſiniſtro, manuque. — A parte interiore Tab. 2. a. b. c. d. in cubito dextro, ubi in fine tectus Opponente q. in manu. Dein Tab. 1. χ. ω. ω. a. b. b. in brachio dextro; pariter in fine ſubjectus Opponenti X. in manu. Præterea Tab. 5. *n*. in manu ſiniſtra.

(*p*) Euſtach. Tab. 29. n. 35. utr. lat. Tab. 33. n. 60. Albin. Tab. Muſcul. 6. Ψ. Ω. d. in brachio; a principio ſubjectus Extenſori majori pollicis a. c. Dein Tab. 5. n. 24. 25. 26. ex parte tectus Extenſore com-

cis manus (*q*), Indicator (*r*), Ulnaris internus (*s*), Palmaris longus (*t*), Radialis internus (*u*), Pronator teres (*w*), Sub-

communi digitorum d., & Extenſore auricularis proprio a. Præterea Tab. 2. e. f. in cubitis. Tab. 1. c. d. in brachiis. Tab. 9. α. β. in brachio ſiniſtro, manuque.

(*q*) Euſtach. Tab. 29. n. 36. utr. lat. Albin. Tab. Muſcul. 6. a. b. c. d. e. in brachio; ubi ſubjectus Anconeo Y., & Indicatori f. g. h. Dein Tab. 5. n. 13. 26. in manu dextra, ubi in cubito ſubjectus Extenſori communi digitorum d., Auricularis proprio a., Ulnari externo. W. Præterea Tab. 2. g. g. h. in cubito ſiniſtro. Tab. 1. y. A. in manu ſinistra. Tab. 9. γ. γ. δ. in brachio ſiniſtro manuque.

(*r*) Euſtach. Tab. 29. n. 37. dextr. Albin. Tab. Muſcul. 6. f. g. h. in brachio. Dein Tab. 5. t. in manu dextra; ubi pars tecta Extenſoris communis digitorum tendine r., & in cubito ſubjacet Extenſori illi communi d. &c., & Extenſori auricularis proprio a., & Ulnari externo W. Præterea Tab. 2. Ψ. Ψ. in manu ſiniſtra. Tab. 1. u. u. in manu ſiniſtra. Tab. 9. u. in manu ſiniſtra.

(*s*) Euſtach. Tab. 32. n. 34. Tab. 29. n. 25. utr. lat. Albin. Tab. Muſcul. a parte interiore Tab. 2. A. A. B. in brachio; ubi ex parte tectus Sublimi C. D. H., ſub eoque etiam Profundo. Dein Tab. 1. ν. ξ. ο. in brachio; ubi pariter tectus Sublimi ζ. &c. — A parte exteriore Tab. 6. l. — q. in brachio. Tab. 5. R. — V. in cubito. — A latere Tab. 9. π. ρ. σ. in brachio dextro, Y. in ſiniſtro.

(*t*) Euſtach. Tab. 32. n. 33. Albin. Tab. Muſcul. 1. α. — ε. in brachio, ubi a principio ſubjectus Pronatori tereti Φ. Præterea Tab 5. L. in cubito, & ρ. in manu ſiniſtra. Tab. 9. ν. ξ. in brachio dextro.

(*u*) Euſtach. Tab. 32. n. 32. Albin. Tab. Muſcul. 1. Ψ. Ω. in brachio; ubi a principio ſubjacet Pronatori tereti Φ., & Palmari longo α., dein Supinatori longo Π. — A latere Tab. 9. μ. in brachio dextro, c. d. in ſiniſtro.

(*w*) Euſtach. Tab. 32. n. 29. ſin. Albin. Tab. Muſcul. a parte interiore Tab. 1. Φ. in brachio; ubi extremum ſubit Supinatorem longum Π. Poſt in Tab. 2. extremum illud ↓. in cubito ſubit Radialem ex-

Sublimis (x), Profundus (y), Flexor longus pollicis manus (z), Pronator quadratus (a).

In

externum breviorem σ. ς. Sic & in Tab. 3. extremum Λ. in cubito ſubit Radialem eundem Φ. χ. — A latere Tab. 9. λ. in brachio dextro, b. in ſiniſtro. — A parte exteriore in Tab. 6. ſubjacet Radiali externo breviori V., & Abductori longo pollicis Λ., in brachio.

(x) Euſtach. Tab. 32. n. 35. Tab. 33. n. 53. Albin. Tab. Muſcul. 2. C. — Q. in cubito, ubi partem tegit Pronator teres ⸸.; tendines I. & L. in manu, ex parte ſubjacent Flexori parvo digiti minimi τ., tendo P. Abductori brevi alteri pollicis u., omnes in fine tendinibus Profundi ι. ι. ι. ι. Dein Tab. 1. ζ. — μ. in brachio; ubi partim ſubjectus Palmari longo α. β., partim Radiali interno Ψ. Ω., partim Supinatori longo Π. Σ., & Pronatori tereti Φ.; porroque in manu dextra tendines ejus X. 2. 2. &c. ubi magnam partem tecti aponeuroſi Palmaris longi γ. & in fine ex parte ſubjecti tendinibus Profundi y. &c. —— Præterea Tab. 6. s. — α. in brachio; ubi in cubito Ulnari interno l. ex parte ſubjacet, & Profundo i. Et Tab. 5. M. — Q. in cubito, ſubjectus & iisdem; ac porro tendines Ξ. Π. &c. in manu ſiniſtra. Et Tab. 9. e. e. in brachio ſiniſtro, & tendines in manu: & in brachio dextro o. Tab. 2. tendines in digitis manus ſiniſtræ. Et Tab. 1. S. &c. in manu ſiniſtra.

(y) Euſtach. Tab. 32. n. 36. Tab. 33. n. 54. utr. lat. Tab. 38. L. Albin. Tab. Muſcul. a parte exteriore Tab. 7. R. S. S. in cubito dextro. Dein Tab. 6. i. k. k. in brachio dextro, ubi ex parte tectus Ulnari interno l. Dein Tab. 5. K. in cubito dextro; ubi pariter ex parte tectus Ulnari interno R., & præterea poſt externum W. delitescit. — A parte interiore Tab. 3. C. C. &c. in cubito; ubi pars ſubjacet Flexori longo pollicis Π. Φ., tendines K. L. ex parte ſubjecti Abductori oſſis metacarpi manus quarti U., omnes H. I. K. L. Lumbricalibus c. g. k. n. Dein Tab. 2. χ. χ. R. ι. ι. κ. &c. in cubito, & manu dextra (χ. in cubito ſiniſtro, & tendines in manu) ubi ſubjacet Sublimi C. &c. in cubito, & tendinibus ejus L. I. N. P.; tendo ad digitum minimum pertinens, etiam Adductori oſſis metacarpi quarti χ. in manu, & Flexori parvo digiti minimi τ. Dein Tab. 1. σ. in brachio

 &

In manu Lumbricales (*b*), Abductor brevis pollicis (*c*),

Ab-

& y. z. &c. in manu dextra (V. &c. in manu sinistra), ubi cæterum subjacet Sublimi ζ. ζ. &c. in brachio & Pronatori tereti Φ.; tendinibus suis aponeurosi Palmaris longi γ., & Sublimis tendinibus x. &c. in manu. —— Præterea Tab. 7. R. — W. in cubito sinistro, manuque. Et Tab. 6. i. in brachio sinistro & ο. ο. in manu. Et Tab. 5. K. in cubito sinistro, & Ξ. Π. Σ. &c. in manu. Et Tab. 9. in digitis manus sinistræ.

(*z*) Eustach. Tab. 33. n. 55. Tab. 38. K. fin. Albin. Tab. Muscul. 3. Π. — B. in cubito, manuque; ubi parva parte delitescit post Pronatorem teretem Λ., & Radialem externum breviorem χ.; portio autem accessoria a principio subjecta Brachiali interno ν. ο. Dein Tab. 2. S. T. V. W. in cubito. &c., ubi subjacet Sublimi C. O., Supinatori longo X., pollicis Abductori brevi alteri u. in manu dextra. Dein Tab. 1. π. ρ. in brachio, & Ξ. Ξ. Π. in manu dextra; ubi subjectus Sublimi ζ. λ., Supinatori longo Σ., Radiali interno Ω., in brachio; Abductori pollicis brevi alteri Λ. in manu dextra. — Præterea Tab. 7. X. X. Y. in cubito sinistro manuque. Et Tab. 6. Γ. Δ. in manu sinistra. Et Tab. 5. ν. ν. in manu sinistra. Et Tab. 9. f. f. in brachio sinistro, & f. f. in manu dextra.

(*a*) Eustach. Tab. 38. V. Albini Tab. Muscul. a parte interiore. Tab. 4. g. — k. in cubito. Dein Tab. 3. Ξ. Ξ. in cubito, majorem partem tectus Flexore longo pollicis Π. Σ., & Profundo E. F. G. Dein Tab. 2. Y. in cubito; eodem modo tectus Flexore longo pollicis S. B. T., praetereaque Abductore longo pollicis a. b. d., & Ulnari interno A. B. Dein eodem modo Tab. 1. τ. in brachio; tectus Flexore longo pollicis π., Abductore pollicis longo χ. ω b., & Ulnari interno v. — A parte posteriore Tab. 8. Φ. in brachio dextro. Dein Tab. 7. P. in cubito dextro. In Tab. 6. subjacet Indicatori f. h., Extensori majori pollicis a. c., minori Ψ., Abductori longo Λ. in brachio. Adde Tab. 8. Φ. in brachio sinistro. Dein Tab. 7. P. in cubito sinistro; ubi partem tegit Profundus S. T. &c. Dein Tab. 6. r. in brachio sinistro; ubi tectus Ulnari interno l. q. Sic & Tab. 5. ε. in extrema parte cubiti sinistri; eodem modo tectus Ulnari interno R. V.

Abductor brevis alter pollicis (*d*), Opponens pollicis (*e*), Flexor brevis pollicis (*f*), Adductor pollicis (*g*), Palma-ris

(*b*) Eustach. Tab. 32. n. 51. 52. 53. 54. Tab. 38. M. N. O. P. Albin. Tab. Muscul. 3. c. f. e., g. w., k. s., n. p., in manu dextra; ubi quartus ex parte subjacet Adductori ossis metacarpi manus quarti U: a principio autem delitescunt post ligamentum carpi annulare interius N. Dein Tab. 2. γ. ε., ζ. υ., η. π., θ. ς. in manu dextra; ubi ex parte tecti tendinibus Sublimis P. N. I. L.; primus Abductore pollicis brevi altero u; quartus Flexore brevi digiti minimi τ., pariterque delitescunt post ligamentum carpi annulare interius l. Dein Tab. 1. Ω. w., l. u., k. s., i. q. in manu dextra; ubi maximam partem tecti aponeurosi Palmaris longi γ.; primus etiam Abductore brevi altero pollicis Λ. Adde Tab. 4. α. β., η. θ., ξ. ο. in manu dextra. Præterea Tab. 3. o. p. q. in manu sinistra. Et Tab. 2. n. 11. 10. in manu sinistra. Et Tab. 1. I. H. in manu sinistra. Et Tab. 7. Φ. 1. in manu dextra. Et Tab. 6. v. 1. in manu dextra. Tab. 5. n. 7. 6. in manu dextra. Tab. 7. n. 1. 2. 3. 4. in manu sinistra. Tab. 6. β. γ. δ. ε. in manu sinistra. Tab. 5. ο. in manu sinistra. Tab. 9. ϱ. τ. σ. in manu sinistra.

(*c*) Eustach. Tab. 32. n. 43. utr. lat. Albin. Tab. Muscul. 1. Y. Z. Γ. in manu dextra. Tab. 2. k. in manu dextra. Præterea Tab. 5. θ. κ. in manu sinistra. Tab. 9. ι. κ. in manu sinistra, & a. b. in dextra.

(*d*) Albin. Tab. Muscul. 2. u. &c. in manu dextra; in fine tectus aponeurosi Abductoris brevis pollicis k. Dein Tab. 1. Λ. in manu dextra; ubi & tectus Abductore brevi Y. Γ., & aponeurosi Palmaris longi γ. Præterea Tab. 6. τ. in manu sinistra. Tab. 5. λ. in manu sinistra. Tab. 9. c. in manu dextra.

(*e*) Eustach. Tab. 32. n. 42. utr. lat. Tab. 33. n. 69. Albin. Tab. Muscul. 2. q. &c. in manu dextra; tectus ex parte Abductore brevi altero pollicis u, & tendine Extensoris pollicis minoris f. Dein Tab. 1. X. in manu dextra; magnam partem tectus Abductore pollicis brevi Y., parva autem, tendine Extensoris minoris pollicis d. Præterea Tab. 6. ϱ. in manu sinistra. Tab. 2. Γ. in manu sinistra. Tab. 1. z. in manu sinistra. Tab. 9. λ. in manu sinistra.

ris brevis (*h*), Abductor digiti minimi manus (*i*), Flexor par-

(*f*) Euſtach. Tab. 38. Π. Σ. Albin. Tab. Muſcul. 4. l. — q. in manu dextra; exigua parte tectus Adductore pollicis s. Dein Tab. 3. Z. Z. in manu dextra; ubi tectus Adductore pollicis b., tendine A. Flexoris longi pollicis, & Lumbricali primo c., & a principio delitescit poſt ligamentum carpi armillare interius N. Dein Tab. 2. x. in manu dextra; tectus Adductore pollicis y., tendine V. Flexoris longi pollicis, Lumbricali primo γ., Abductore pollicis brevi altero u., Opponente q. Sic & Tab. 1. Φ. in manu dextra, tectus iisdem. Praeterea Tab. 8. Ψ. — e. in manu ſiniſtra. Tab. 7. Φ. Ψ. in manu ſiniſtra. Tab. 6. χ. in manu ſiniſtra. Tab. 5. ξ. in manu ſiniſtra. Et Tab. 9. d. in manu dextra. — Ab exteriore parte Tab. 8. Ψ. f. in manu dextra. Tab. 7. n. 4. 5. in manu dextra. Tab. 6. n. 5. 6. in manu dextra. Tab. 5. inter 27. & 29. in manu dextra. Dein Tab. 4. l. r. in manu ſiniſtra. Tab. 3. a. b. in manu ſiniſtra. Tab. 2. Θ. Λ. in manu ſiniſtra. Tab. 1. D. in manu ſiniſtra. Tab. 9. μ. in manu ſiniſtra.

(*g*) Euſtach. Tab. 32. n. 45. Tab. 38. Ξ. Albin. Tab. Muſcul. 4. s. &c. in manu dextra; aliquantum tectus Flexore brevi pollicis l., & Interoſſeo poſteriore medii γ. Dein Tab. 3. b. b. in manu dextra; tectus Flexore brevi pollicis Z., Lumbricali primo c., ſecundo g., Profundi tendine H. I. Dein Tab. 2. y. in manu dextra; tectus caeterum Flexore pollicis brevi x., Lumbricali primo γ., ſecundo ζ., Profundi tendinibus ad indicem & medium digitum pertinentibus, Sublimis tendine P. ad indicem; & Tab. 1. Ψ. in manu dextra, tectus iisdem. Praeterea Tab. 8. g. h. in manu ſiniſtra Tab. 7. Ω. in manu ſiniſtra. Tab. 6. ω. in manu ſiniſtra. Tab 5. π. in manu ſiniſtra. Tab. 9. e. in manu dextra. —— Ab exteriore parte Tab. 8. g. g. h. in manu dextra. Tab. 7. n. 6. 7. in manu dextra. Tab. 6. n. 7. 8. in manu dextra. Tab. 5. n. 29. 30. in manu dextra. Dein Tab. 4. s. u. in manu ſiniſtra. Tab. 3. c. d. in manu ſiniſtra. Tab. 2. Ξ. Π. in manu ſiniſtra. Tab. 1. F. G. in manu ſiniſtra. Tab. 9. ν. ξ. in manu ſiniſtra.

(*h*) Euſtach. Tab. 32. n. 49. utr. lat. Albin. Tab. Muſcul. 1. g g. in manu dextra; ubi pars principii ſubjacet aponeuroſi Palmaris longi γ. Praeterea Tab. 5. σ. σ. in manu ſiniſtra. Tab. 9. h. in manu dextra.

parvus digiti minimi manus (k), Adductor metacarpi digiti minimi (l), Interoffei manus interni, prior indicis, pofterior indicis, prior annularis, prior auricularis (m), Inter-

(i) Euftach. Tab. 33. n. 72. Caffer Tab. apud Spigel. Lib. 4. Tab. 25. Fig. 2. B. inferior in manu. Albin. Tab. Mufcul. 2. ψ. ω. in manu dextra; ex parte tectus Flexore parvo τ. υ. φ. Dein Tab. 1. c. in manu dextra; ex parte tectus Flexore parvo h. p., ex parte Palmari brevi g g. Præterea Tab. 6. θ. in manu finiftra, & ζ. in dextra. Et Tab. 5. τ. in manu finiftra; β. in dextra, Tab. 9. k. in manu dextra.

(k) Caffer. Tab. ap. Spigel. Lib. 4. Tab. 25. Fig. 2. B. extra fitum. Cowper Myotom. ann. 1724. Tab. 51. M. fup. extra fitum. Albin. Tab. Mufcul. 2. τ. υ. φ. in manu dextra. Tab. 1. f. h. p. in manu dextra; partim tectus Palmari brevi g. g., partim aponeurofi Palmaris longi γ. Præterea Tab. 6. ζ. in manu finiftra. Tab. 5. χ. in manu finiftra. Tab. 9. i. in manu dextra.

(l) Caffer. Tab. ap. Spigel. Lib. 4. Tab. 25. Fig. 2. B. fup. in manu. Cowper Myotom. ann. 1724. Tab. 51. M. in manu. Albin. Tab. Mufcul. 3. U. &c. in manu dextra. Tab. 2. χ. χ. in manu dextra, tectus Abductore digiti minimi manus ψ., & Flexore parvo τ. Dein Tab. 1. f. in manu dextra, tectus Abductore digiti minimi c., Flexore parvo h., Palmare brevi g. g., aponeurofi Palmaris longi γ. Præterea Tab. 7. Ξ. Π. Σ. in manu finiftra, & a. in dextra. Tab. 9. l. in manu dextra.

(m) Prior indicis Euftach. Tab. 39. Fig. 1. x. Albin. Tab. Mufcul. ab exteriore parte Tab. 7. n. 2. 3. in manu dextra. Dein Tab. 6. n. 2. in manu dextra; ex parte tectus Abductore indicis. 3. z. Similiter Tab. 5. n. 11. in manu dextra. Præterea Tab. 3. e. f. in manu finiftra. Tab. 2. Φ. in manu finiftra. Tab. 1. w. in manu finiftra. Tab. 9. o. in manu finiftra. — Ab interiore parte Tab. 4. v. w. in manu dextra; majorem partem tectus Adductore pollicis s., & Flexore brevi l. Dein Tab. 3. z. in manu dextra; tectus pariter Adductore pollicis b., & Flexore brevi Z., & præterea Lumbricali primo c. Dein Tab. 2. z. in manu dextra; fimiliter fubjectus Adductori pollicis y., & Lumbri-

 cali

teroſſei manus externi, prior medii, poſterior medii, po-
ſte-

cali primo γ., & præterea Abductori indicis α. β. Similiter plane Tab. 1. a. in manu dextra.

Poſterior indicis. Euſtach. Tab. 39. Fig. 1. y. Albin. Tab. Muſcul. ab exteriore parte Tab. 7. σ. ς. ϛ. τ. υ. in manu dextra; ubi partem integit Interoſſeus prior digiti medii λ. Dein Tab. 6. q. r. in manu dextra; ubi cæterum ſubjectus priori medii i. k. Similiter Tab. 5. n. 1. 2. Ψ. in manu dextra. — Ab interiore parte Tab. 4. x. y. in manu dextra, majorem partem tectus Adductore pollicis s., & Flexore brevi l. Dein Tab. 3. x. y. in manu dextra; tectus Adductore pollicis b, & Profundi tendine ad indicem pertinente H. Dein Tab. 2. λ. in manu dextra; tectus etiam Sublimis tendine ad indicem pertinente P. Dein Tab. 1. v. in manu dextra; tectus etiam aponeuroſi Palmaris longi γ. ε. Præterea Tab. 8. i. in manu ſiniſtra.

Prior annularis. Euſtach. Tab. 39. Fig. 1. B. Alb. Tab. Muſcul. ab exteriore parte Tab. 7. y. z. α. β. δ. in manu dextra; ubi partem integit Interoſſeus poſterior digiti medii ε. Dein Tab. 6. υ. in manu dextra; ubi fere totus ſubjectus poſteriori medii a. b. Similiter Tab. 5. ϱ. π. in manu dextra. — Ab interiore parte Tab. 4. ε. ζ. in manu dextre, ex parte tectus Lumbricali tertio ν. Dein Tab. 3. r. in manu dextra; tectus cæterum Lumbricali tertio k., & Profundi tendine ad digitum medium pertinente I. Dein Tab. 2. ο. in manu dextra, ubi & Lumbricali tertio η. tectus, & Sublimis tendine N. ad indicem pertinente. Dein Tab. 1. n. in manu dextra; tectus Lumbricali tertio k., & aponeuroſi Palmaris longi γ. ε. Præterea Tab. 8. m. in manu ſiniſtra.

Prior auricularis. Euſtach. Tab. 39. Fig. 1. D. Albin. Tab. Muſcul. ab exteriore parte Tab. 7. m. n. o. p. r. in manu dextra; ubi partem integit Interoſſeus poſterior digiti annularis s. Dein Tab. 6. λ. in manu dextra; ubi fere totus ſubjacet poſteriori annularis π. ϱ. Similiter Tab. 5. η. ζ. in manu dextra. — Ab interiore parte Tab. 4. μ. ν. in manu dextra, ex parte tectus Lumbricali quarto ξ. Dein Tab. 3. ſupra p. in manu dextra; ubi cæterum tectus Lumbricali quarto n., & tendine Profundi ad digitum minimum pertinente L., & Adductore oſſis metacarpi quarti U. Dein eodem modo Tab. 2. σ. in manu dextra. Et Tab. 1. o. in manu dextra. Præterea Tab. 8. o. in manu ſiniſtra.

ſterior annularis (*n*), Abductor indicis manus (*o*).

In nate, Gluteus major (*p*), Gluteus medius (*q*), Gluteus

(*n*) Prior medii. Euſtach. Tab. 39. Fig. 1. z. Albin. Tab Muſcul. Ab exteriore parte, Tab. 6. i. i. k. k. l. m. n. p. in manu dextra; ubi ex parte ſubjacet Indicatoris tendini h. Dein Tab. 5. Θ. Θ. Θ. Λ. Ξ. Π. Σ. Δ. in manu dextra; ubi ex parte pariter Indicatoris tendini t. ſubjacet, & præterea Extenſoris communis digitorum tendini r., & aponeuroſi s. Præterea Tab. 7. λ. μ. &c. in manu dextra. Tab. 3. g. in manu dextra. Tab. 2. Ω. in manu ſiniſtra; — A parte interiore Tab. 4. z. in manu dextra; majorem partem ſubjacens Interoſſeo poſteriori indicis x., Adductori pollicis s, & Flexori brevi l., & Lumbricali ſecundo α. Dein Tab. 3. v. in manu dextra; pariter ſubjectus Interoſſeo poſteriori indicis x., Adductori pollicis b., & Lumbricali ſecundo g. Dein Tab. 2. μ. in manu dextra; ſubjectus interoſſeo poſteriori indicis λ., Lumbricali ſecundo ζ., & tendini Sublimis ad indicem pertinenti P. Dein Tab. 1. m. in manu dextra; ſubjectus Interoſſeo poſteriori indicis v., Lumbricali ſecundo l., & aponeuroſi Palmaris longi γ. ε. Præterea Tab. 8. juxta k. in manu ſiniſtra.

Poſterior medii. Euſtach. Tab. 39. Fig. 1. A. Albin. Tab. Muſcul. ab exteriore parte Tab. 6. a. b. c. f. g. h. in manu dextra. Tab. 5. χ. ψ. ω. Γ. Φ. in manu dextra; ubi cæterum ſubjacet Extenſoris digitorum manus tendinibus f. n. o. p. Præterea Tab. 7. ε. ζ. &c. in manu dextra. Tab. 3. h. in manu ſiniſtra. Tab. 2. n. 1. in manu ſiniſtra. — A parte interiore. Tab. 4. γ. δ. in manu dextra; magnam partem tectus Interoſſeo priore annularis ε. Dein Tab. 3. t. u. in manu dextra; tectus priore annularis r., & Profundi tendine ad digitum medium pertinente I. Dein Tab. 2. ξ. in manu dextra; tectus priore annularis o., & Sublimis tendine ad digitum medium pertinente N. Dein Tab. 1. t. in manu dextra; tectus priore annularis n., & aponeuroſi Palmaris longi ε. Præterea Tab. 8. l. l. in manu ſiniſtra.

Poſterior annularis. Euſtach. Tab. 39. Fig. 1. C. Albin. Tab. Muſcul. ab exteriore parte Tab. 6. π. ρ. σ. ς. ϛ. τ. in manu dextra. Tab. 5. μ. μ. ν. ξ. ο. λ. in manu dextra; ubi cæterum ſubjacet Extenſoris com-

 mu-

teus minor (*r*), Pyriformis (*s*), Gemini (*t*), Obturator internus (*u*), Quadratus femoris (*w*).

In

munis digitorum tendinibus f. f. &c. & Extenſoris proprii auricularis tendini c. Præterea Tab. 7. s. t. &c. in manu dextra. Tab. 3. i. in manu ſiniſtra. Tab. 2. n. 2. in manu ſiniſtra. — A parte interiore Tab. 4. ι. κ. in manu dextra; magnam partem tectus Interoſſeo auricularis μ. Dein Tab. 3. in manu dextra; tectus Lumbricali quarto n., & Profundi tendine K. Dein Tab. 2. ϱ. in manu dextra; ſimiliter tectus Lumbricali quarto θ., & Profundi tendine ad digitum annularem pertinente. Dein Tab. 1. r. in manu dextra, tectus pariter Lumbricali quarto i. Præterea Tab. 8. n. n. in manu ſiniſtra.

(*o*) Euſtach. Tab. 33. n. 64. Tab. 36. r. Albin. Tab. Muſcul. a parte exteriore Tab. 6. n. 3. z. in manu dextra; ex parte ſubjectus tendini c. Extenſoris majoris pollicis. Tab. 5. n. 12. 5. in manu dextra; eodem modo tectus tendine 13. Extenſoris majoris pollicis. Præterea Tab. 2. Σ. in manu ſiniſtra & Tab. 1. x. in manu ſiniſtra. Tab. 9. π. in manu ſiniſtra. — A parte interiore Tab. 2. α. β. in manu dextra; ubi majorem partem tectus Adductore pollicis y., & Flexore brevi x., & Lumbricali primo γ. Tab. 1. b. in manu dextra; eodem modo tectus Adductore pollicis Ψ., & Flexore brevi Φ., & Lumbricali primo Ω. w.

(*p*) Euſtach. Tab. 39. X. Albin. Tab. Muſcul. 5. γ. in nate. Tab. 9. w. x. y. in coxa. Tab. 1. A. in femore.

(*q*) Euſtach. Tab. 29. Y. Albin. Tab. Muſcul. a parte poſteriore Tab. 6. i. &c. in inferiore trunci parte. Tab. 5. Y. in nate; ubi cæterum tectus Gluteo magno γ. Tab. 9. t. in coxa; pari modo tectus Gluteo magno w. — a parte priore Tab. 2. s. in trunco; ubi cæterum poſt Gluteum minorem u. Dein Tab. 1. K. in femore, ubi ex parte poſt Tenſorem vaginæ femoris M.

(*r*) Euſtach. Tab. 36. u. Albin. Tab. Muſcul. a parte poſteriore Tab. 7. z. &c. in coxa. In Tab. 6. ſubjacet Gluteo medio i. in inferiore trunci parte, & Pyriformi n. — A parte priore Tab. 3. ξ. — σ. in trunco; ubi ſubjacet Iliaco interno ς. Dein Tab. 2. u. in trunco, ſubjacens Iliaco interno y. in femore, & Recto cruris x. In Tab. 1. ſubjacet Tenſori vaginæ femoris M. in femore.

In femore, Biceps cruris (x), Semitendinosus (y), Semimem-

(s) Eustach. Tab. 29. g. Tab. 36. m. Albin. Tab. Muscul. 6. n. in inferiore trunci parte, ubi partem Gluteus medius i. tegit, partem Geminorum superior q.; pars pone os sacrum. In Tab. 5. subjacet Gluteo magno γ. in nate.

(t) Eustach. Tab. 29. h. k. Tab. 37. r. t. Albin. Tab. Muscul. 6. q. s. in inferiore trunci parte; ubi pars tecta Obturatore interno w. y. Ipsa extrema delitescunt post trochanterem majorem. Cæterum in Tab. 5. subjecti Gluteo magno γ. in nate.

(u) Eustach. Tab. 29. i. Tab. 37. w. Albin. Tab. Muscul. 7. Θ. — Π. in coxa; ubi ipso extremo delitescit post trochanterem majorem. Dein Tab. 6. w. x. x. y. in inferiore trunci parte, ubi a principio delitescit post Levatorem ani e., & Coccygeum d.; extremo subjectus Geminis q. s. Et quod nudum, id in Tab. 5. tectum Gluteo magno γ. in nate.

(w) Eustach. Tab. 29. l. Albin. Tab. Muscul. 6. z. in inferiore trunci parte; ex parte subjectus Geminorum inferiori s., & delitescens post Bicipitem cruris ι. κ. in femore, cum Semimembranoso. Et quod ibi nudum, id in Tab. 5. subjacet Gluteo magno γ. in nate.

(x) Eustach. Tab. 29. r. utr. lat. Albin. Tab. Muscul. a parte priore Tab. 3. C. D. E. F. in femore; cæterum post os femoris & Adductorem magnum femoris Δ. Δ. Θ. Dein Tab. 2. ς. ς. τ. in femore & crure, ubi post Vastum externum ϑ. Dein Tab. 1. Ξ. Π. Σ. in femore & crure; eodem modo post Vastum externum P., postque caput externum Gemelli, principiumque Plantaris. —— A parte posteriore. Caput breve. Tab. 7. P. &c. in femore. Dein Tab. 6. λ. λ. &c. in femore, tectum capite longiore θ. μ. Sic & Tab. 5. τ. τ. &c. in femore; tectum longiore σ. υ. Caput longum Tab. 6. θ. — ξ. in femore. Tab. 5. σ. — χ. in femore, tectus Gluteo magno γ. in nate — A latere Tab. 9. α — ζ in pede sinistro.

(y) Eustach. Tab. 29. q. utr. lat. Albin. Tab. Muscul. a parte priore Tab. 2. ϱ. in crure, cæterum post Gracilem π. ο., & Adductorem magnum femoris. Dein Tab. 1. α. in crure; subjectus Sartorio Ψ. — A parte posteriore Tab. 6. ο. — ς. in femore, tectus Bicipitis cru-

membranosus (z), Tensor vaginæ femoris (a), Rectus cruris (b), Sartorius (c), Vastus externus (d), Vastus internus

cruris capite longiore θ., & in fine post Semimembranosum Γ. Dein Tab. 5. π. ρ. in femore, tectus pariter Bicipitis cruris capite longiore σ., & Semimembranoso ο, prætereaque Gluteo magno γ. in nate.

(z) Eustach. Tab. 29. p. p. utr. lat. Tab. 36. D. Albin. Tab. Muscul. a parte priore Tab. 3. Π. Σ. Φ. in femore, tectus Gracili Ψ. A. B., Adductore magno femoris Δ. Θ. Λ., & supra Quadrato. Cæterum quod in hac Tab. nudum, in 2.tectum Vasto interno Σ. in femore. In prima post caput interius Gemelli. — A parte posteriore Tab. 7. A. — G. in femore, tectus Gracili H. I. Dein Tab. 6. φ. — Γ. in femore, tectus eodem modo Gracili ς. τ., & præterea Semitendinoso ο. — ς., & Bicipite cruris θ. λ. Dein Tab. 5. ν. ν. ξ. ο. in femore, tectus iisdem, quibus in Tab. 6., & præterea Gemello Π. Σ. in crure. — A latere Tab. 9. P. Q. R. S. in pede dextro.

(a) Eustach. Tab. 32. X. Tab. 30. M. Albin. Tab. Muscul. 1. M. N. O. in femore, tectus Sartorio H. I. — A latere Tab. 9. q. r. s. in sinistra coxa, pedeque.

(b) Eustach. Tab. 32. Ψ. utr. lat. Albin. Tab. Muscul. a parte priore. Tab. 1. T. — X. in femore; tectus Sartorio H., & Tensore vaginæ femoris M. Tab. 2. x., & ι. κ. λ. in femore; tectus Iliaco interno y., & Gluteo minore u. in trunco. — A latere. Tab. 9. λ. — ο. in pede sinistro; tectus Sartorio p., & Tensore vaginæ femoris q. & A. B. C. in dextro.

(c) Eustach. Tab. 32. Σ. Albin. Tab. Muscul. 1. H. I. Φ. Ψ. Ω. in femore & crure; ex parte delitescens post Vastum internum Y. — A latere Tab. 9. K. L. M. in pede dextro; & p. in sinistro. — A parte posteriore Tab. 5. λ. in femore.

(d) Eustach. Tab. 32. Ω. utr. lat. Tab. 33. Ψ. Tab. 36. F. Albin. Tab. Muscul. a parte priore Tab. 2. δ. — θ. in femore, tectus Recto cruris ι. κ. Dein Tab. 1. P. — S. in femore, tectus Recto cruris T. V., & Tensore vaginæ femoris M. O. — A latere Tab. 9. π. θ. ι. κ. in pede sinistro. — A parte posteriore Tab. 6. β. — δ. in femore,

nus (*e*), Cruralis (*f*), Pectineus (*g*), Adductor longus femoris (*h*), Gracilis (*i*), Adductor brevis femoris (*k*), Ob-

re, tectus Bicipite cruris θ. λ. μ. ν. Dein Tab. 5. ψ. ω. in femore, tectus pariter Bicipite cruris σ. τ. υ. φ., & præterea poſt Gluteum magnum γ. in nate.

(*e*) Euſtach. Tab. 32. Φ. utr. lat. Tab. 33. Σ. Tab. 36. E. E. Albin. Tab. Muſcul. a parte priore. Tab. 2. Σ. — α. in femore; tectus Recto cruris ι. κ. Dein Tab. 1. Y. Z. Γ. in femore, tectus Recto cruris T. V., & Sartorio H. — A latere Tab. 9. H. I. in pede dextro, & π. ρ. in ſiniſtro. — A parte poſteriore Tab. 6. υ. in femore; tectus Gracili ς. τ., Semimembranoſo φ. Φ. χ., Adductore magno femoris ε. Dein Tab. 5. μ. in femore, tectus iisdem, & præterea Sartorio λ.

(*f*) Euſtach. Tab. 33. Φ. utr. lat. Tab. 36. x. Albin. Tab. Muſcul. 2. β. γ. in femore; tectus Vaſto externo ∂. -- θ., & interno Σ. -- α., prætereaque Recto cruris ι. κ. Et quod ibi nudum, id in Tab. 1. poſt Rectum cruris T. in femore.

(*g*) Euſtach. Tab. 32. Δ. utr. lat. Tab. 33. Λ. utr. lat. Albin. Tab. Muſcul. 2. Γ. in femore; tectus Adductore longo femoris Δ., Vaſto interno Φ. Σ., Pſoa magno z. cum Iliaco interno y., Obliquo interno abdominis O. in trunco; & delitescens etiam poſt Cremaſterem p. q. in trunco. Dein Tab. 1. E. in femore; pariter tectus Adductore longo femoris D., & præterea Sartorio H., & Obliquo externo abdominis v. in trunco; delitescens quoque poſt Cremaſterem z. in trunco. — A latere Tab. 9. n. in ſiniſtra coxa, pedeque.

(*h*) Euſtach. Tab. 32. Θ. utr. lat. Tab. 33. Ξ. utr. lat. Albin. Tab. Muſcul. a parte priore. Tab. 2. Δ. Θ. in femore; tectus Vaſto interno Φ. Σ., & Gracili Λ. Ξ, & delitescens etiam poſt teſtem cum Cremaſtere p. Dein Tab. 1. D. in femore, tectus Sartorio H., Gracili B., & pariter delitescens poſt teſtem cum Cremaſtere z. — A latere Tab. 9. m. in ſiniſtra coxa, pedeque.

(*i*) Euſtach. Tab. 32. Ξ. Tub. 29. o. Albin. Tab. Muſcul. Tab. 3. Ψ. — B. in femore. Dein Tab. 2. Λ. Ξ. ο. π. in femore & crure; in

Obturator externus (*l*), Adductor magnus femoris (*m*).

In

in fine aliquantum tectus Semitendinoſo ϱ.; ex parte delitescens poſt Vaſtum internum Σ., & teſtem cum Cremaſtere p. in trunco. Dein Tab. 1. B. in femore; cæterum tectus Sartorio H. Φ. Ψ., & delitescens poſt Vaſtum internum Y., & teſtem cum Cremaſtere z. in trunco. — A parte poſteriore Tab. 7. H. l. in femore; ſupra poſt os pubis, infra poſt ſemimembranoſum E. Dein Tab. 5. ς. τ. in femore; infra poſt Semitendinoſum ς., ſupra delitescens poſt Transverſos perinæi h. g. in inferiore trunci parte. Dein Tab. 5. ι. κ. in femore; infra poſt Semitendinoſum ϱ., & Sartorium λ., ſupra poſt Gluteum magnum γ. in nate. — A latere Tab. 9. N. O. in pede dextro.

(*k*) Euſtach. Tab. 38. y. Albin. Tab. Muſcul. 3. ψ. ω. Γ. in femore, tectus Gracili Ω., Iliaco interno cum Pſoa magno ς. υ., & extremo ſuo poſt os femoris delitescens. Et quod ibi nudum, id in Tab. 2. ſub Adductore longo Δ. Θ. in femore, & Pectineo Γ., & Vaſto interno Φ. Σ.

(*l*) Euſtach. Tab. 38. x. utr. lat. Albin. Tab. Muſcul. a parte priore Tab. 4. α. β. in trunco; tectus Adductore magno femoris κ. λ. in femore, & Pſoa magno cum Iliaco interno x. Dein Tab. 3. φ. χ. in trunco & femore; eodem modo tectus Adductore magno femoris Δ., & Pſoa magno cum Iliaco interno υ., & præterea Adductore brevi femoris ψ. ω. Et quod nudum in Tab. 3. id in 2. ſubjacet Pectineo Γ. in femore. — A parte poſteriore Tab. 8. ϱ. ϱ. σ. τ. in coxa; ex parte delitescens poſt Adductorem magnum femoris ω. Dein Tab. 7. Σ. Σ. Φ. in coxa. tectus Obturatore interno Θ. — Π., & ex parte delitescens poſt Adductorem magnum femoris O., & Semimembranoſum B. in femore. Dein Tab. 6. v. v. in inferiore trunci parte, tectus Obturatore interno w. y., Geminorum inferiore s., Quadrato femoris z.; delitescensque ex parte poſt Coccygeum d., & qua nudus poſt Gluteum magnum in Tab. 5. γ. in nate.

(*m*) Euſtach. Tab. 32. Λ. Tab. 33. Π. utr. lat. Tab. 28. z. A. utr. lat. Tab. 36. w. Albin. Tab. Muſcul. a parte priore Tab. 4. κ. λ. μ. ν. ξ. ο. in femore; ubi pars tecta extremo communi Pſoæ magni, &

Iliaci

In Crure, Gemellus (n), Plantaris (o), Soleus (p), Popli-

Iliaci interni x. Dein Tab. 3. Δ. Δ. Λ. Ξ. Θ. in femore; ubi cæterum tectus eodem communi extremo Psoæ magni & Iliaci interni υ. ς., & Adductore brevi femoris ψ., & Gracili Ψ. Dein Tab. 2. Π. in femore; cæterum tectus communi extremo Psoæ magni & Iliaci interni z. y., Pectineo Γ., Adductore longo femoris Δ., Gracili Λ., Vasto interno Σ. Dein Tab. 1. C. in femore; cæterum tectus Sartorio H., Adductore longo femoris D., Gracili B., cæterisque, quibus in Tab. 2. —— A parte posteriore Tab. 8. ς. — D. in femore. Dein Tab. 7. K. N. in femore, subjectus præterea Semimembranoso A. C., & Bicipitis cruris capiti breviori P. Dein Tab. 6. ε. ε. in femore; præterea subjectus Bicipiti cruris θ. λ., Semitendinoso ο. π., Semimembranoso φ., & a principio delitescens post Transversum perinæi h., & Transversum alterum g., in inferiore trunci parte. Dein Tab. 5. θ. in femore; subjectus Semimembranoso ν., & Semitendinoso Π., ut Tab. 6., prætereaque Gluteo magno γ. in nate.

(n) Eustach. Tab. 29. Λ. Θ. Ξ. Albin. Tab. Muscul. 5. Λ. — Φ. in crure, capite exteriore subjacens Bicipiti cruris τ. φ. in femore; interiore Semimembranoso ν. ξ. ο. & præterea Tab. 6. Λ. & Θ. in femore; & Tab. 7. T. & U. in femore. Præterea a priore parte Tab. 1. β. γ. δ. ν. ν. in crure. Et a latere. Tab. 9. φ. χ. ψ. Θ. in pede sinistro, & V. — Y. in dextro.

(o) Eustach. Tab. 29. Γ. Albin. Tab. Muscul. 6. Σ. Φ. in femore & crure; a principio subjectus Gemelli capiti exteriori Θ., & Bicipiti cruris λ.; in fine post tendinem Achillis D. Dein Tab. 5. Γ. c. in femore & crure; subjectus ibidem Gemello Λ. — Φ., & Bicipiti cruris τ., in fine post tendinem Achillis Ψ., & præterea Tab. 7. V. in femore. — A priore parte Tab. 2. T. in crure. Tab. 1. μ. in crure; & a latere Tab. 9. Λ. Ξ. in pede dextro, & Π. in sinistro.

(p) Eustach. Tab. 29. Π. Π. dextr. & Π. sin. Albin. Tab. Muscul. a parte priore Tab. 1. ξ. ε. π. in crure; ubi cæterum tectus Peroneo longo ο. π. ρ. & Flexore longo digitorum pedis θ. κ., & Tibiali postico λ.: adde ν. & Tab. 2. υ. N. P. in crure, eodem modo tectus Peroneo longo φ. ψ., & Flexore longo digitorum pedis Q. S., & Tibiali postico V.: adde Y. — A parte posteriore Tab. 6. Ω. — E. in crure,

 ubi

pliteus (q), Flexor longus digitorum pedis (r), Flexor longus pollicis pedis (s), Tibialis posticus (t), Peroneus lon-

ubi partem integit Plantaris φ. Dein Tab. 5. a. a. b. in crure, tectus Gemello Λ. — Φ. — A latere Tab. 9. ω. Δ. Θ. in pede sinistro, tectus Gemello φ. ψ, & Γ. Δ. in dextro, tectus Gemello W. X., & Plantari Λ.

(q) Eustach. Tab. 29. Δ. Tab. 36. y. Albin. Tab. Muscul. 7. W. X. Y. in crure; tectus Bicipite cruris R. S. in femore, Gemelli capite exteriore T. in crure, Semimembranoso G. Dein Tab. 6. Λ. Ξ. Π. in crure, tectus pariter Bicipite cruris ξ. in femore, Gemelli capite exteriore Θ. in crure, Semimembranoso Γ., & praeterea Plantari Σ., & Soleo A. Ψ. Dein Tab. 5. Δ. in crure; tectus Bicipite cruris φ. χ. in femore, & Gemello Λ. Π. in crure.

(r) Eustach. Tab. 29. s. Tab. 36. L. Tab. 32. n. 11. Albin. Tab. Muscul. a parte posteriore Tab. 7. f. g. in crure, tectus Flexore longo pollicis h., & Popliteo Y. Dein Tab. 6. F. in crure, tectus Soleo Ω. &c. Sic & Tab. 5. inter tendinem d. & ψ. in sinistro pede, & inter d. & tendinem Plantaris in dextro. — A parte priore. Tab. 3. X. — c. in crure, & pede extremo; tectus tendine Tibialis postici S. — U. Sic & Tab. 2. Q. R. R. S. Z. a. b. in crure, & pede extremo; eodem modo tectus Tibialis postici tendine V. V. & Tab. 1. θ. ι. ι. κ. z. in crure & pede extremo, similiter tectus Tibialis postici tendine λ. y. y., & Abductore pollicis brevi A. B. — A latere Tab. 9. Ψ. Ω. Ω. α. ω. in pede dextro. — In planta. Tab. 10. Fig. 20. A. — R., ubi tendinum partem Lumbricales S. W. X. Z. integunt. Dein Fig. 19. l. m., & ab illo Flexoris digitorum brevis latere, quo spectat pollicem; caeterum tectus Lumbricalibus c. d. e. f., Flexore brevi digitorum L. — V., Abductore minimi A. B., Abductore pollicis F. G. Dein Fig. 18. x. &c., & ab illo tendinum Flexoris brevis digitorum v. latere, quod pollicem respicit; & inter tendinum illorum cornua w. w.; caeterum tectus iisdem, quibus in Fig. 19., & praeterea media plantae aponeurosi D. E. F. G. Praeterea Tab. 7. δ. ζ. θ. in pede extremo. Et Tab. 9. y. z. in pede sinistro. Et Tab. 6. infra X., & δ. in pede extremo.

(s) Eustach. Tab. 29. n. 1. Tab. 36. K. Tab. 32. n. 13. Albin. Tab.

longus (u), Peroneus brevis (w), Extenſor longus digito-
rum

Tab. Muſcul. 7. h. i. k. in crure. Dein Tab. 6. H. in crure, tectus Soleo Ω. &c. Eodem modo Tab. 5. f. in crure. — A latere Tab. 9. Π. Σ. in pede dextro. Præterea Tab. 3. V. in crure. —— In planta Tab. 10. Fig. 20. b. c. d. e.; tectus Flexoris longi digitorum tendine A., & capite, quod ab eum in planta accedit C. Dein Fig. 19. n. o, tectus Flexore brevi digitorum N., & Abductore pollicis F. G. Dein Fig. 18. æ. æ. b., tectus media plantæ aponeuroſi A. C. Præterea Tab. 7. l. l. in pede extremo. Tab. 6. ε. ε. Tab. 5. γ. γ. Tab. 3. W. W. Tab. 2. f. f. g. Tab. 1. F. F. G. in pede extremo. Tab. 9. ϱ. in pede dextro.

(t) Euſtach Tab. 37. x. Tab. 32. n. 12. Albin. Tab. Muſcul. a parte priore Tab. 4. π. — ψ. in crure & pede extremo. Tab. 3. P. — R. S. — U. in crure & pede extremo. Dein Tab. 2. F. V. W. X. in crure & pede extremo; tectus Extenſore longo digitorum pedis A., & Extenſore proprio pollicis H. I. Dein Tab. 1. λ. y. in crure & pede extremo; ubi quod in crure Tab. 2. nudum, id ſubjectum Tibiali antico n. in crure; extremum tectum Abductore pollicis pedis A. in pede extremo. — A latere Tab. 9. β. β. γ. in pede dextro. — A parte poſteriore Tab. 8. E. — L. in crure. Tab. 7. Z. — d. e. in crure; ſubjectus Popliteo W. Y., Flexori longo pollicis pedis h., Flexori longo digitorum pedis f. Dein Tab. 6. G. in crure; cæterum tectus Soleo Ω. &c., ſic & Tab. 5. d. in crure. — In planta Tab. 10. Fig. 21. E. F. G. H. I., ubi pars tecta Flexore brevi pollicis pedis p., Adductore pollicis l. k., & tendinibus Peronei longi. Dein Fig. 20. f. g. h. tectus tendine Flexoris longi digitorum pedis A. B., capiteque ad eum in planta accedente C. D., & Flexoris longi pollicis tendine b. Poſt in Fig. 19. ſubjectus Abductori pollicis pedis F.

(u) Euſtach. Tab. 29. Σ. utr. lat. Tab. 32. n. 7. Albin. Tab. Muſcul. a parte priore Tab. 3. G. — L. in crure; ubi partim tectus Peroneo brevi M. Tab. 2. φ. χ. ψ. in crure; tectus Peroneo brevi ω., & Extenſore longo digitorum pedis A. Dein Tab. 1. ο. π. ϱ. in crure; eodem modo tectus Peroneo brevi σ., & Extenſore longo digitorum

G 2 pe-

rum pedis (x), Peroneus tertius (y), Tibialis anticus (z), Extenſor proprius pollicis pedis (a).

In

pedis τ. υ. — A latere Tab. 9. Σ. — Ω. in pede ſiniſtro, ſubjectus Soleo ω. — A parte poſteriore Tab. 7. m. — t. in crure, pedeque extremo. Dein Tab. 6. N. O. — T. in crure pedeque extremo, tectus Soleo Ω. Ψ. Dein Tab. 5. Θ. l. m. m. in crure pedeque extremo, tectus pariter Soleo a, b. — In planta Tab. 10. Fig. 22. b. — i. Fig. 21. B. C. D., & inter r. & l., ubi ſub ligamento, quo retinetur, ſub N. O., & tectus Adductore pollicis l. m., & Flexore brevi o. p. r. Dein Fig. 20. z. α. β., cæterum ſub iisdem, ac in Fig. 21., & ſub Flexore longo digitorum cum Lumbricalibus. Et qua nudus in Fig. 20., ea in 19. tectus Abductore digiti minimi pedis A. B.

(w) Euſtach. Tab. 29. Ω. Ω. utr. lat. Tab. 37. y. Tab. 32. n. 8. Albin. Tab. Muſcul. a parte priore Tab. 4. ω. Γ. Δ. in crure. Dein Tab. 3. M. O. in crure; tectus Peroneo longo G. L. Tab. 2. ω. in crure, tectus Peroneo longo φ. ψ., & Extenſore longo digitorum pedis cum Peroneo tertio A. — E. Dein Tab. 1. σ. in crure; eodem modo tectus Peroneo longo ο. ρ., & Extenſore longo digitorum pedis cum Peroneo tertio τ. φ. χ. ψ. — A latere Tab. 9. B. B. C. C. D. D. E. in pede ſiniſtro; ſubjectus Peroneo longo Σ. Ψ. Ω. Præterea Tab. 10. Fig. 20. y. & 21. A. & 22. a. — A parte poſteriore. Tab. 8. M. — R. in crure & pede extremo. Tab. 7. u. — x. in crure & pede extremo; tectus Peroneo longo m. p. q. &c. Dein Tab. 6. L. — M. in crure & pede extremo; tectus eodem modo Peroneo longo N. P. Q. &c. Dein eodem modo Tab. 5. g. — k. in crure & pede extremo; tectus Peroneo longo l. m.

(x) Euſtach. Tab. 29. Φ. Tab. 32. n. 5. dext.

(y) Euſtach. Tab. 29. Ψ. ſin. & Tab. 32. n. 9. De Extenſore longo & Peroneo tertio Vide Albin. Tab Muſcul. 9. G. R. & f. — m. in pede ſiniſtro; tecta parte Peroneo longo Σ., & brevi B. C. — A priore parte Tab. 2. A E. — E. & m. — q. in crure & pede extremo; tecta parte Extenſore proprio pollicis pedis H. I. Dein Tab. 1. ς. — h. in crure pedeque; ſubjecta parte Extenſori proprio pollicis

pe-

In pedis extremi digitorumque ejus dorso, Extensor brevis digitorum pedis (b).

In planta, & digitorum pedis parte inferiore, Flexor brevis

pedis i., & Tibiali antico n. Præterea Tab. 3. n. o. p. q. r. s. t. u. in pedibus extremis. Tab. 5. r. z. s. Tab. 6. U. V. Tab. 7. γ. γ. in pede extremo. Tab. 9. ο. in pede dextro.

(z) Eustach. Tab. 32. n. 4. Tab. 28. Ω. Ω. utr. lat. Albin. Tab. Muscul. 1. n. — p. in crure & pede extremo; ubi ex parte in imo tectus Abductore pollicis pedis A. — A latere Tab. 9. U. V. W. in pede sinistro, & η. θ. in dextro. — In planta. Tab. 10. Fig. 22. k. l. Fig. 21. ζ, η. ubi pars tecta Flexore brevi pollicis pedis y. Dein eodem modo Fig. 20. i. k. tecta parte Flexore brevi p. Et quod nudum, id in Fig. 19. tectum Abductore pollicis F.

(a) Eustach. Tab. 32. n. 10. dext. & Tab. 33. n. 12. Albin. Tab. Muscul. 9. S. S. S. T. in pede sinistro, tectus Extensore longo digitorum cum Peroneo tertio G. I. N. —— A priore parte Tab. 2. H. I. K. L. M. in crure & pede extremo; tectus Extensore longo digitorum cum Peroneo tertio A. E. C. Dein Tab. 1. i. i. i. k. l. l. l. in crure pedeque extremo; tectus Extensore longo digitorum cum Peroneo tertio τ. ψ. φ., & Tibiali antico n. Præterea Tab. 9. λ. λ. μ. ν. in pede dextro.

(b) Eustach. Tab. 33. n. 28. Albin. Tab. Muscul. 9. a. — e. in pede sinistro; tectus tendine Extensoris proprii pollicis S., tendinibus Extensoris longi digitorum R. Q. P. O., tendine Peronei tertii L. M., Peronei brevis D. E., & ligamento, quo tendines in confinio cruris & dorsi pedis obducti X. — Tab. 3. e. — I. in pede extremo, Tab. 2. i. k. l. in pede extremo; tectus tendine Extensoris proprii pollicis I. K., tendinibus Extensoris longi digitorum A. E., & Peronei tertii tendine D. Sic & Tab. 1. H. I. K. in pede extremo, tectus eodem modo tendine Extensoris proprii pollicis i., tendinibus Extensoris longi digitorum c. b. a. ω., & Peronei tertii tendine χ. — Tab. 7. y. z. α. β. in pede extremo; tectus Peronei brevis tendine w. Dein Tab. 6. W. in pede extremo; tectus tendinibus U. Extensoris longi

vis digitorum (c), Abductor pollicis (d), Abductor minimi (e), Lumbricales (f), Flexor brevis pollicis (g), Adductor

digitorum, tendine V. Peronei tertii, & Peronei brevis L. Dein Tab. 5. t. tectus eodem modo tendinibus r., Extensoris longi digitorum tendine s., Peronei tertii & Peronei brevis i.; præterea ligamento q., quo tendines in confinio cruris dorsique pedis obducti.

(c) Vesal. de h. c. f. Lib. 2. Tab. 14. Θ. Albin. Tab. Muscul. 10. Fig. 19. L. — V. ubi tendinum pars subjecta Flexoris longi digitorum tendinibus l. &c. Dein Fig. 18. v. w. w. &c. pariter subjectis tendinibus his Flexoris longi digitorum tendinibus x. &c., reliquo autem musculi tecto media plantæ aponeurosi A. B. C. D. E. F. G. Præterea Tab. 9. χ. ψ. in pede dextro & y. z. &c. in sinistro. Tab. 2. c. d. Tab. 1. E. Tab. 6. Y. & δ. Tab. 5. ε. in pede extremo.

(d) Vesal. de h. c. f. Lib. 2. Tab. 13. ρ. Eustach. Tab. 32. n. 15. Albin. Tab. Muscul. 10. Fig. 19. F. — K., tectus Flexore brevi digitorum L. M. N. Dein Fig. 18. Q. — S. tectus Aponeurosi O. Præterea Fig. 20. m. n. Fig. 21. β. γ. δ. Tab. 5. δ. in pede extremo. — A latere Tab. 9. σ. — τ. in pede dextro.

(e) Vesal. de h. c. f. Lib. 2. Tab. 13. ς. Eustach. Tab. 29. n. 3. utr. lat. Albin. Tab. Muscul. a parte inferiore Tab. 10. Fig. 19. A., B. C. D. E., tectus Flexore brevi digitorum M. L. Dein Fig. 18. q. r. tectus Aponeurosi I. K. L. — A latere Tab. 9. r — v. in pede sinistro, tectus aponeurosi s. Tab. 5. u — y. in pede extremo, tectus aponeurosi u.

(f) Vesal. de h. c. f. Lib. 2. Tab. 4. μ. &c. Primus Albin. Tab. Muscul. 10. Fig. 20. S. T. V. Fig. 19. f.; tectus Flexore brevi digitorum N. O. R. Fig. 18. e. tectus media plantæ aponeurosi A. D. — Secundus Id. Tab. 10. Fig. 20. W. tectus primo S., & tertio X. Fig. 19. e., tectus primo f., & Flexore brevi digitorum R. S. Fig. 18. f. tectus media plantæ aponeurosi A. D. E. — Tertius Id. Tab. 10. Fig. 20. X. Y. Fig. 19. d.; tectus Flexore brevi digitorum R. S. T. U. Fig. 18. g. tectus media plantæ aponeurosi A. E. F. — Quartus Id. Tab. 10. Fig. 20. Z. α. Fig. 19. c., tectus Flexore brevi digitorum R. T. U. V. Fig. 18. h. tectus media plantæ aponeurosi A. F. G.

ductor pollicis (*h*), Transversalis pedis (*i*), Flexor brevis minimi (*k*), Interossei interni, (*l*) primus digiti tertii, primus

(g) Casser. Tab. ap. Spigel. Lib. 4. Tab. 43. Fig. 1. D. E. Cowper Myotom. ann. 1724. Tab. 65. Fig. 2. n. 180. Albin. Tab. Muscul. ab inferiore parte Tab. 10. Fig. 21. o. — u. & y. z. α. tectus Abductore pollicis β. γ. Dein Fig. 20. s s. v. p. q. r. tectus Abductore pollicis m. n., Flexoris longi pollicis tendine c. d., Flexore longo digitorum C. D. &c., Lumbricali primo S. Dein Fig. 19 q. q. s w. x. y.; tectus Abductore pollicis F. H., Flexoris longi pollicis tendine n., Lumbricali primo f., Flexore brevi digitorum N. O. Dein Fig. 18. U. V. W. X. & inter Y. & C., tectus Abductore pollicis Q. R., & media plantæ aponeurosi A. C. — Præterea Tab. 8. W. X. in pede extremo. Tab. 7. ν. in pede extremo. — A latere Tab. 9. υ. υ. φ. in pede dextro, tectus Abductore pollicis σ. ς. Et Tab. 3. d. Tab. 2. e. Tab. 1. D. in pede extremo, tectus Abductore pollicis A. C.

(h) Casser. Tab. ap. Spigel. Lib. 4. Tab. 43. Fig. 1. C. Cowper Myotom. ann. 1724. Tab. 65. Fig. 2. n. 11. Tab. 66. Fig. 1. n. 10. in planta. Albin. Tab. Muscul. 10. Fig. 21. k. n. — v. tectus Flexore brevi pollicis o. s. Dein Fig. 20. t. t. u. w., tectus Flexore brevi pollicis s., Flexore longo digitorum D. M. L. K., Lumbricalibus Z. K. W. S. Dein Fig. 19. p. r. t., tectus Flexore brevi pollicis q., Lumbricali primo f., cæterisque, quibus in Fig. 20, & præterea Flexore brevi digitorum L. T. Dein Fig. 18. Y. Z., tectus Flexore brevi pollicis, Lumbricali primo e., cæterisque, quibus in Fig. 19. — Præterea Tab. 8. r. Tab. 4. Σ. in pede extremo.

(i) Casser. Tab. ap. Spigel. Lib. 4. Tab. 43. Fig. 1. I. K. L. Cowper Myotom. ann. 1724. Tab. 64. n. 189. Albin. Tab. Muscul. 10. Fig. 21. f. g. h. i. Dein Fig. 23. ϱ. ϱ. ϱ. σ., tectus Lumbricalibus S. V. W. X. Z., & Flexoris longi digitorum tendinibus N. O. P. Q. Dein Fig. 19. g. g. h., tectus Lumbricalibus f. e. d. c. cum tendinibus Flexoris longi digitorum, tendinibus Flexoris brevis digitorum O. S. U. V., Abductore minimi E. Dein Fig. 18. i. i. i., tectus Lumbricalibus e. f. g. h., tendinibus Flexoris digitorum longi & brevis v. &c., media plan-

mus digiti quarti, primus digiti minimi (*m*), Interossei ex-
ter-

plantæ aponeurosi D. E. F. G., Abductore minimi r. Præterea Tab. 8. Z. in pede extremo.

(*k*) Casser. Tab. ap. Spigel. Lib. 4. Tab. 42. Fig. 3. H. inf. Albin. Tab. Muscul. 10. a parte inferiore Tab. 10. Fig. 21. Q. R. tectus Transversali pedis h. Dein Fig. 20. ι. κ., tectus eodem modo Transversali pedis σ. Dein Fig. 19. a. b., tectus similiter Transversali pedis h., & præterea Abductore minimi B. E. Eodem modo Fig. 18. p. tectus Transversali pedis i., & Abductore minimi q. r. — A latere Tab. 9. w. x. in pede sinistro; tectus Abductore minimi r. v. Et Tab. 6. Z. — γ. in pede extremo. Tab. 5. α. β. in pede extremo, tectus Abductore minimi y.

(*l*) Casser. Tab. ap. Spigel. Lib. 4. Tab. 43. Fig. 1. H. H. H. Tab. 39. Fig. 3. I. I. I. I. pollici proxima. Cowper Myotom. ann. 1724. Tab. 66. Fig. 1. n. 191.

(*m*) Primus digiti tertii. Albin. Tab. Muscul. 10. Fig. 22. s. t. u., tectus Interosseo secundo digiti hujus tertii v. Dein Fig. 20. a. b., tectus Interosseo secundo Y., Transversali pedis f., Adductore pollicis k. Dein Fig. 20. inter Lumbricalem secundum W., & os metatarsi, osque primum digiti tertii; cæterum tectus iis, quibus in Fig. 21. & præterea Lumbricali secundo W. Sic & Fig. 19. inter Lumbricalem secundum e., & os metatarsi osque primi ordinis digiti tertii. Et Fig. 18. inter Lumbricalem secundum f., & os primi ordinis digiti tertii.

Primus digiti quarti. Albin. Tab. 10. Fig. 22. y. z. α.; tectus Interosseo secundo digiti ejusdem quarti β. Dein Fig. 21. W. X.; tectus Interosseo secundo U., Transversali pedis f. g., Adductore pollicis k. Dein Fig. 20. ξ.; tectus Interosseo secundo μ., Transversali pedis ρ, Adductore pollicis τ., Lumbricali quarto Z., & tertio X., Flexoris longi digitorum tendinibus M. Q. & P. Dein Fig. 19. inter Lumbricalem tertium d., & os metatarsi, osque primum digiti hujus quarti, & inter Lumbricalem quartum c., tendinem U., & Transversalem pedis g., cæterum tectus iisdem, quibus in Fig. 20. & præterea Flexore brevi digitorum T. R. Dein Fig. 18. inter Lumbricalem tertium g., & os metatarsi, osque primi ordinis digiti hujus quarti, & inter Lumbricalem quartum
h.,

terni, primus digiti ſecundi, ſecundus digiti ſecundi, ſecundus digiti tertii, ſecundus digiti quarti (n).

Re-

h., Transverſalem pedis i., & aponeuroſis plantæ portionem F., tectus iisdem, quibus in Fig. 19. & præterea Aponeuroſis plantæ portione F.

Primus digiti minimi. Albin. Tab. 10. Fig. 32. ε.ζ.η. Dein Fig. 21. S. T., tectus Flexore brevi digiti minimi Q., & Transverſali pedis f. h. Dein Fig. 20. λ., tectus Flexore brevi digiti minimi ι., Transverſali pedis ρ., tendine M. Q. Flexoris longi digitorum, Lumbricali quarto Z. Dein Fig. 19. Z. tectus Flexore brevi minimi digiti e., Transverſali pedis g h., tendine V. Flexoris brevis digitorum, tendineque Flexoris longi ad minimum pertinente, & Lumbricali quarto c. Sic & Fig. 18. o. tectus iisdem. Præterea Tab. 7. ε. in pede extremo.

(n) Primus digiti ſecundi. A ſuperiore parte Albin. Tab. 4. θ. in pede extremo. Dein Tab. 3. m. m. in pede extremo; tectus Extenſore brevi digitorum f. h. Dein Tab. 2. h. in pede extremo, tectus Extenſore brevi digitorum i. k., & tendine Extenſoris proprii pollicis pedis I. K. Sic & Tab. 1. L. in pede extremo. Dein Tab. 9. n. in pede ſiniſtro, tectus Extenſore brevi digitorum a. b., & tendine Extenſoris proprii pollicis S. — A parte inferiore Tab. 10. Fig. 22. m. n. o. Dein Fig. 21. e., tectus Transverſali pedis f., & Adductore pollicis k. l. Dein Fig. 20. inter Lumbricalem primum, & os metatarſi, osque primi ordinis digiti ſecundi; tectus iisdem, quibus in Fig. 21., & præterea Lumbricali primo V. Sic & Fig. 19. & 18.

Secundus digiti ſecundi. A ſuperiore parte Albin. Tab. 4. Λ. in pede extremo Dein Tab. 3. inter i. & k. in pede ſiniſtro; tectus Extenſore brevi digitorum i. In Tab. 2. tectus præterea tendine Extenſoris longi digitorum A. E. ad digitum tertium pertinente. Dein Tab. 8. V. in pede extremo. Dein Tab. 9. o. in pede ſiniſtro, tectus Extenſore brevi digitorum c., & Extenſoris longi tendine Q. — A parte inferiore Tab. 10. Fig. 22. p. q. r., ſubjectus Interoſſeo primo digiti tertii s. Dein Fig. 21. c. d. ſubjectus interoſſeo primo digiti tertii

 a.,

Regionum, quas una cum muſculis, in iisdem ſitis, hactenus enumeravi, aliæ (ut jam in principio hujus Sectionis dictum eſt) geminæ ſunt, discretæque, id eſt dextræ & ſiniſtræ; aliæ ſingulares ac mediæ, quæ tamen dextram ſui partem ſimilem habent ſiniſtræ.

Geminæ, utrique ſexui communes, ſunt, quæ circum Auriculas, Auriculæ, Aures internæ, cava Oculorum, Malæ cum lateribus Calvæ, quæ ſub Malis, latera Thoracis, Spatia intercoſtalia, Scapulæ cum ſuperiore parte Humerorum, Humeri, Cubiti, Manus, Nates, Femora, Crura, Dorſa pedum extremorum digitorumque pedum, Plantæ & digitorum pedum partes inferiores.

Viri propriæ, quæ circa Funes ſpermaticos ac Teſtes.

Singulares communes ſunt; Calva, Facies, Collum, Colli ſceleti latera parsque prior, Pectus, quæ ſub Pecto-

a., Transverſali pedis f., Adductori pollicis k. Dein Fig. 20. π., tectus Transverſali pedis ϱ., Lumbricali ſecundo W., tendine N. Flexoris longi digitorum. Fig. 19. k. Fig. 18. k. tectus iisdem.

Secundus digiti tertii. A ſuperiore parte Albin. Tab. 4. Ξ. in pede extremo. Dein Tab. 3. inter k. & l. pedis extremi ſiniſtri; tectus Extenſore brevi digitorum k. In Tab. 2. tectus præterea tendine Extenſoris longi digitorum A. E. ad digitum quartum pertinente. Dein Tab. 8. T. in pede extremo. Dein Tab. 9. p. in pede ſiniſtro, tectus Extenſore brevi digitorum d., & Extenſoris longi tendine P. — A parte inferiore Tab. 10. Fig. 22. v. w. x., tectus Interoſſeo primo digiti quarti y. Dein Fig. 21. Y. Z. tectus Interoſſeo primo digiti quarti W.,

Pectore est, Abdomen, media inter Thoracem Abdomenque, Lumborum & Coxarum pars prior. Dorsum cum lumborum posteriore parte & Cervice; quæ circum Anum.

Viri propria singularis una est, quæ circa Perinæum viri. Fœminæ, Genitalis ambitus.

In geminis musculi iidem, iique in utraque earum singuli, situque similes. In singularibus plerisque musculi gemini, in aliis partim gemini, partim singulares, in aliis tantum singulares. Geminorum alter in dextra singularium regionum parte, alter in sinistra, utrique eodem modo siti; singulares in medio, suique altero dimidio in dextra parte, altero in sinistra. In iisdem viri fœminæque regionibus iidem musculi, eademque ratione collocati, præterquam circum anum, & genitalia.

Quoniam geminarum regionum altera alteri similis est, earum

ti W., Transversali pedis f., Adductore pollicis k. Dein Fig. 20. ο., tectus Transversali pedis ϱ., Lumbricali tertio X., tendine O. P. Flexoris longi digitorum, Adductore pollicis t. Dein Fig. 19. i. subjectus iisdem. Fig. 18. l. iisdem subjectus, & portioni E. mediæ aponeurosis plantæ.

Secundus digiti quarti. A superiore parte Albin. Tab. 4. π. in pede extremo. Dein Tab. 8. S. in pede extremo. Dein Tab. 9. q. in pede sinistro; tectus Extensoris longi digitorum tendine O. — A parte inferiore Tab. 10. Fig. 22. β. γ. δ., tectus Interosseo minimi ε. Dein Fig. 21. U. V. tectus Interosseo minimi S., & Transversali pedis f. g. Dein Fig. 20. μ. ν., tectus Interosseo minimi λ., Transversali pedis ϱ., Lumbricali quarto Z., & Flexoris longi digitorum

earum tantummodo una nominata eſt, & poſtea nominabitur, quemadmodum geminorum muſculorum tantummodo alteri, ideſt, qui vel in altera regionum geminarum, vel in ſingularium altero latere ſiti ſunt, conſiderabuntur.

torum pedis tendine M. Q. Dein 19. X. Y. tectus Interoſſeo minimi Z., Transverſali pedis g., Lumbricali quarto c., tendine Flexoris digitorum pedis longi & brevis V., Flexore brevi digitorum T. Dein Fig. 18. m. n. tectus Interoſſeo minimi o., Transverſali pedis i., Lumbricali quarto h., tendine Flexoris brevis digitorum, ad digitum minimum pertinente, portione mediæ aponeuroſis plantæ, ad digitum minimum pertinente G. Præterea Tab. 8. Y. in pede extremo.

D E-

DESCRIPTIO MUSCULORUM HOMINIS.

SECTIO SECUNDA.

Singulorum Musculorum descriptio.

REGIO I. CALVA.

In hac regione unicus datur musculus, quem in Occipitalem (*a*) ac Frontalem (*b*) distinguunt alii, quique Epicranius dici potest.

EPICRANIUS.

Tectum caput tenui involucro est, cui musculosa natura inest, carnea ab utroque latere occipitis, carnea in fronte, superciliis, angulis majoribus, naso. Partes carneas post-

(*a*) Eustach. Tab. 29. A. A. Tab. 34. B. Tab. 31. A. A.

(*b*) Eustach. Tab. 41. Fig. 1. E. E. Tab. 35. a. a.

posteriores, quas Occipitales musculos vocant, & priores, Frontales dictas, media tendinea nectit.

Occipitales (*a*) oriuntur ab ossibus temporum & occipitis, ductu continuo & transverso a radice processus mammillaris, & quidem ab ejus posteriore parte (*b*), supra principia Retrahentium auriculas (*c*), extremaque Sternomastoïdeorum (*d*). Musculi hi, ab initio tendinei, mox fiunt carnei, & tenues, lati, notabili intervallo disjuncti, oblique per occipitis latera in priora adscendunt, donec quisque rotundo ambitu extremæ carnis in aponeurosem abeat (*e*); hæ, tenues, latæ, pergunt, convergunt, desinunt circa frontem in Frontales musculos (*f*). Horum uterque ovato mucrone incipit (*g*), ad frontem descendit, &, circa superiorem ac mediam partem ejus, mucrones se conjungunt in unum (*h*). Nata caro per frontem se demittit, ejus latitudinem usque in

(*a*) Albin. Tab. Muscul. 11. Fig. 6. a. b. b. c. d. e. e. Fig. 7. a. a. b. b. c. d. e. f. g. h. i. k. Eustach. Tab. 29. A. A. Tab. 34. B. Tab. 31. A. A.

(*b*) Albin. Tab. 11. Fig. 6. a. b. b.

(*c*) Id. Tab. 11. Fig. 6. i. k. l.

(*d*) Id. Tab. 16. Fig. 26. f. g. h.

(*e*) Id. Tab. 11. Fig. 6. d. e. e.

(*f*) Id. Tab. 11. Fig. 7. a. a. b. b. c. d. e. f. g. h. i. k. Eustach. Tab. 41. Fig. 1. E. E. Tab. 35. a. a.

(*g*) Albin. Tab. 11. Fig. 7. b. b.

(*h*) Id. Tab. 11. Fig. 7. c. Eustach. Tab. 41. Fig. 1. E. E. — β.

in tempora tenet, mediaque parte fui recta defcendit (*i*). A fronte per glabellam pergit (*k*), quam integit, porroque per dorfum nafi excurrit, per quod fe paulatim extenuans abit in tenuem aponeurofem, quæ ab utroque latere confluit cum fimili tenuitate Compresforum narium (*l*). Accedit portio ad exteriorem partem principii Levatoris labii fuperioris, alæque nafi (*m*). Mucrone osfi frontis in angulo majore oculi fe inferit (*n*), mox fupra ligamentum, quo angulus major oculi alligatus osfi maxillari fuperiori (*o*); flectunt fe fibræ ex latere fecundum fupercilium ad angulum majorem (*p*). In decurfu ad canthum illum fafciculi quidam Orbicularibus palpebrarum (*q*); aliquando & Corrugatoribus fuperciliorum, continuantur. Cæterum omni amplitudine fua cuti, interveniente panniculo adipofo, pertinaciter Frontales adnexi funt.

Frontales furfum & fimul aliquantum in diverfum trahunt, tenduntque & explicant, fupercilia, quod infra fuper-

(*i*) Albin. Tab. 11. Fig. 7. c. d.
(*k*) Id. Tab. 11. Fig. 7. d. Euftach. loc. cit.
(*l*) Albin. Tab. 11. Fig. 7. e. f.
(*m*) Id. Tab. 11. Fig. 7. g.
(*n*) Id. Tab. 11. Fig. 7. h.
(*o*) Id. Tab. 11. Fig. 1. n.
(*p*) Tab. 11. Fig. 7. i.
(*q*) Id. Tab. 11. Fig. 7. k.

percilia usque ad palpebras eſt, angulos majores oculorum, glabellam; cutem quoque naſi ſurſum trahunt, & tendunt; ſimulque cutem reliquam capitis, quæ retro frontem eſt, attrahunt ad eam, quo & corrugant frontem, rugis transverſis; juvant etiam Levatores labii ſuperioris, alarumque naſi. Cutem capitis retrahunt Occipitales.

REGIO II. CIRCA AURICULAM.

Attollens auriculam (*a*), Anterior auriculæ (*b*), Retrahentes tres, ſuperior, medius, inferior (*c*), regionem circa auriculam occupant.

ATTOLLENS AURICULAM (*a*).

Principio tendineo (*b*), tenuibus ſpasſisque filis, ſenſim abſcedit ab Epicranio, rotundi ambitus initio (*c*), poſt paulatim anguſtior, craſſior, carneus (*d*), extremo demum exte-

(*a*) Euſtach. Tab. 28. c. Tab. 32. m. Tab. 34. A. Tab. 41. Fig. 1. A.
(*b*) Albin. Tab. Muſcul. 11. Fig. 3. e. f. g. Fig. 7. r. r. s.
(*c*) Id. Tab. 11. Fig. 3. h. i. k. l. m. Fig. 6. i. k. l.
(*a*) Id. Tab. 11. Fig. 3 a. b. c. c. Fig. 6. g. h. Fig. 7. o. p. p. q. Euſtach. Tab. 41. Fig. 1. A. Tab. 28. c. Tab. 34. A.
(*b*) Albin. Tab. 11. Fig. 3. a. Fig. 7. o.
(*c*) Id. Tab. 11. Fig. 6. g. Fig. 7. p. p. Euſtach. Tab. 41. Fig. 1. A. — α. α. Tab. 34. A. — α.
(*d*) Albin. Tab. 11. Fig. 3. b. Fig. 6. h. Fig. 7. q.

extenuatus, tendineus, fefe inferit fuperiori & eidem priori parti eminentiæ, quæ in dorfo cartilaginis auriculæ eft, qua extrinfecus cavum illud, quod medium inter crura anthelicis (*e*). Surfum trahit Auriculam, tenditque illam ejus partem, cui infertus, maxime fi eodem tempore agunt Frontales & Occipitales.

ANTERIOR AURICULÆ (*a*).

Et hic, tendineo principio, tenuibus fparfisque tendineis filis, nascitur ex Epicranio, fupra zygoma fere medium (*b*); retrorfum, deorfum, procedit, paulatim fefe anguftat, auriculam fubit (*c*), & in extremum tendineum abit, quod inferitur dorfo (*d*) helicis eminentiæ illius, quæ concham diftinguit, excurrens per eam. Dictam eminentiam trahit in priora furfum ac tendit.

RETRAHENTES AURICULÆ (*a*).

Tres plerumque dantur Retrahentes auriculæ, fuperior (*b*), me-

(*e*) Albin. Tab. 11. Fig. 3. c. c.
(*a*) Albin. Tab. Mufcul. 11. Fig. 3. e. f. g. Fig. 7. r. r. s.
(*b*) Id. Tab. 11. Fig. 3. e. Fig. 7. r. r.
(*c*) Id. Tab. 11. Fig. 3. f. Fig. 7. s.
(*d*) Id. Tab. 11. Fig. 3. g.
(*a*) Albin. Tab. Mufcul. 11. Fig. 3. h. i. k. l. m. Fig. 6. i. k. l.
(*b*) Id. Tab. 11. Fig. 3. h. Fig. 6. i.

medius (*c*), inferior (*d*). Oriuntur omnes principio tendineo ab osse occipitis (*e*), vel ab exteriore, & eadem posteriore parte radicis processus mammillaris, statim supra finem sternomastoïdei, inde ex transverso procedunt ad medium dorsum superioris illorum auriculæ cavorum, in quæ concham helicis eminentia distinguit (*f*). Tendunt concham, trahunt auriculam retrorsum.

REGIO III. FACIES.

Occurrunt in Facie Orbiculares (*a*), Corrugatores Superciliorum (*b*), Ciliares (*c*), Compressores narium (*d*), Levatores labii superioris alarumque nasi (*e*), Levatores labii superioris (*f*), Zygomatici minores (*g*), Levatores angu-

(*c*) Albin. Tab. 11. Fig. 3. i. Fig. 6. k.
(*d*) Id. Tab. 11. Fig. 3. m. Fig. 6. l.
(*e*) Id. Tab. 11. Fig. 6. i. k. l.
(*f*) Id. Tab. 11. Fig. 3. l. n.
(*a*) Eustach. Tab. 28. e. e. Tab. 32. b. b. Tab. 35. b. b. Tab. 41. Fig. 1. F. F.
(*b*) Albin. Tab. Muscul. 11. Fig. 1. a. b.
(*c*) Id. Tab. 11. Fig. 2. a. b. c. d. e.
(*d*) Id. Tab. 11. Fig. 7. l. m. n. n.
(*e*) Eustach. Tab. 28. g. Tab. 32. d. Tab. 41. Fig. 1. H.
(*f*) Id. Tab. 28. h. Tab. 32. e. utr. lat. Tab. 41. Fig. 1. I. K. dextr.
(*g*) Id. Tab. 41. Fig. 1. L.

gulorum oris (*h*); Zygomatici majores (*i*), Depreſſores angulorum oris (*k*), Depreſſores labii inferioris (*l*), Naſales labii ſuperioris (*m*), Buccinatores (*n*), Orbicularis oris (*o*), Depresſores alarum naſi (*p*), Levatores menti (*q*).

ORBICULARIS PALPEBRARUM (*a*).

A cantho majori orſus, circumeuns oram cavi oſſei oculi ſimul cum utraque palpebra, rurſus ad eundem canthum redit. Principii ſuperioris pars crasſior oritur ab oſſe frontis, ſtatim ſupra priorem partem osſis unguis, tum a vicina parte osſis maxillaris ſuperioris (*b*), pars tenuior a ſuperiore parte ligamenti, quod ab oſſe maxillari ſuperiori, e regione commiſſuræ palpebrarum in cantho majore, ex trans- ver-

(*h*) Euſtach. Tab. 32. f. utr. lat. & Tab. 41. Fig. 1. M. Fig. 3. E.

(*i*) Id. Tab. 28. k. Tab. 32. g. utr. lat. Tab. 35. f. i. Tab. 41. Fig. 1. N. dextr.

(*k*) Id. Tab. 32. k. utr. lat. Tab. 35. i. utr. lat. Tab. 41. Fig. 1. P. utr. lat.

(*l*) Id. Tab. 41. Fig. 1. Q. utr. lat.

(*m*) Albin. Tab. Muſcul. 11. Fig. 10. q. r. Fig. 11. f.

(*n*) Euſtach. Tab. 33. D. Tab. 41. Fig. 1. O. Fig. 3. D.

(*o*) Id. Tab. 41. Fig. 1. R. R. Fig. 3. G. G.

(*p*) Albin. Tab. Muſcul. 11. Fig. 8. a. a. b. c. c. d.

(*q*) Id. Tab. 11. Fig. 15. a. b. c.

(*a*) Albin. Tab. Muſcul. 11. Fig. 1. c. d. e. f. g. h. i. k. l. m. Euſtach. Tab. 41. Fig. 1. F. F. Tab. 28. e. e. Tab. 35. b. b.

(*b*) Albin. Tab. 11. Fig. 1. c.

verſo ad commisſuram illam deducitur (*c*). Inferioris principii pars crasſior in cantho majore oritur ab inferiore parte dicti ligamenti, & inprimis ſubtus ab ora foraminis oculi, facta a proceſſu naſali osſis maxillaris ſuperioris (*d*); tenuior pars ab inferiore parte dicti ligamenti (*e*). Ambitum oculi tenet pars crasſior, hoc eſt ſupercilium, magnam genæ partem, & quod ab angulo minore usque in tempus eſt, circum quem angulum fibræ continuæ ſunt (*f*). Partes tenuiores obducunt palpebras (*g*), & hæ oriuntur a ligamento (*h*), principiis duobus (*i*), ſuis fibris ultra canthum minorem conveniunt in angulos acutos (*k*), ſeſeque ibi decuſſant, implicantque: cum harum partium cute interventu panniculi adipoſi omni exteriore amplitudine ſua conglutinatus eſt hicce muſculus. Juxta caudam ſupercilii accipit inſignem Corrugatoris ſupercilii partem, eaque extimus ejus margo per canthum minorem genamque fit (*l*).

De-

(*c*) Albin. Tab. 11. Fig. 1. h. n.
(*d*) Id. Tab. 11. Fig. 1. d. p.
(*e*) Id. Tab. 11. Fig. 1. i. n.
(*f*) Id. Tab. 11. Fig. 1. e. f. g.
(*g*) Id. Tab. 11. Fig. 1. k. l.
(*h*) Id. Tab. 11. Fig. 1. n. Tab. 1. s. in capite, & Tab. 2. g. in capite.
(*i*) Id. Tab. 11. Fig. 1. h. i.
(*k*) Id. Tab. 11. Fig. 1. m.
(*l*) Id. Tab. 11. Fig. 1. a.

Demittit portionem ad labium ſuperius (*m*), quæ ſe mox ab altera parte adjungit ad Levatorem labii ſuperioris, poſt ab altera ad Zygomaticum minorem, & cum iis ſe per labium ſuperius extenuat, definitque (*n*). Cum incipit Orbicularis agere, palpebras adducit ad ſe invicem; cum pergit fortius, easdem comprimit, corrugatque; ſupercilium præterea & angulum minorem, genamque cum palpebris & contrahit, & aliquantum adducit ad canthum majorem; premit denique globum oculi.

CORRUGATOR SUPERCILII (*a*).

Corrugator ſupercilii cum Orbiculari palpebrarum ita conjunctus eſt, ut pro parte ejus haberi poſſit. Oritur ab oſſe frontis in glabella & capite ſupercilii, principio uno, latiore (*b*), quandoque duobus vel & tribus, inflectit ſe per dorſum ſupercilii oſſei, cumque ultra mediam ejus longitudinem proceſſit, valde extenuatus accedit ad interiorem & ſuperiorem Orbicularis palpebrarum partem, & extimum orbicularis marginem per canthum minorem, genamque format (*c*), cuti annexus, partim extremo Frontali continuatus.

Gla-

(*m*) Albin. Tab. 11. Fig. 10. g.
(*n*) Id. Tab. 11. Fig. 10. h.
(*a*) Albin. Tab. Muſcul. 11. Fig. 1. a. b.
(*b*) Id. Tab. 11. Fig. 1. b.
(*c*) Id. Tab. 11. Fig. 1. a.

Glabellam & ſupercilium deprimit, adducitque ſimul ad naſum, glabellam & caput ſupercilii corrugat, & in priora magis eminere facit, piloſque earum partium agit in priora, caudam ſupercilii, & quod mox infra eam eſt, non corrugat, ſed prætendit palpebræ ſuperiori, ac cum Orbiculari contrahit ambitum oculi.

CILIARIS (a).

Hic, margines palpebrarum tenens, altero principio oritur a parte ſuperiore ligamenti, quod ab oſſe maxillari ſuperiore, e regione commiſſuræ palpebrarum in cantho majore, ex transverſo ad commiſſuram illam deducitur (b), altero ab ejusdem ligamenti parte inferiore (c), ſic enatæ partes duæ canthum minorem circumeunt continuæ (d). Margines palpebrarum contrahens, adducens, Orbicularem juvat.

COMPRESSOR NARIS (a).

Principio ſuo ortus ab exteriore parte radicis alæ naſi (b), ſe

(a) Albin. Tab. Muſcul. 11. Fig. 2. a. b. c. d. e.
(b) Id. Tab. 11. Fig. 2. a. b. f.
(c) Id. Tab. 11. Fig. 2. c. d. f.
(d) Id. Tab. 11. Fig. 2. e.
(a) Albin. Tab. Muſcul. 11. Fig. 7. l. m. n. n.
(b) Id. Tab. 11. Fig. 7. l.

ſe in membranæ ſpeciem extenuat (c), quæ ſe cum ſimili membranaceo Frontalium extremo conjungit, implicatque (d), ac fasciculis ſubtilibus dorſum naſi conſcendit, donec eos dexter ſiniſterque commisceant (e). Latus mobile naſi premit ſeptum verſus, eoque narem aliquantum comprimit, & cutem lateris modo dicti corrugat ex transverſo, modo radix alæ eodem tempore retineatur a depresſore ſuo, cæteroquin eam attollit in priora, imprimis ſi dexter ſiniſterque conſpirent.

LEVATOR LABII SUPERIORIS ALÆQUE NASI (a).

Oritur a proceſſu naſali osſis maxillaris ſuperioris, juxta canthum majorem oculi, principio tendinoſo (b), decurrit per labium ſuperius juxta naſi latus, per priora Naſalis labii ſuperioris, ſenſim extenuatus, & per labium evaneſcens (c); pertinaciter panniculo adipoſo, Naſali labii ſuperioris, Orbiculari oris, adnexus. Ubi juxta alam naſi procedit,

(c) Albin. Tab. 11. Fig. 7. m.
(d) Id. Tab. 11. Fig. 7. f. e.
(e) Id. Tab. 11. Fig. 7. n. n.
(a) Albin. Tab. Muscul. 11. Fig. 10. a. b. c. Euſtach. Tab. 41. Fig. 1. H. Tab. 28. g.
(b) Albin. Tab. 11. Fig. 10. a.
(c) Id. Tab. 11. Fig. 10. b.

dit, fasciculos inferere folet fuperiori ejus parti juxta genam. Demittit portionem tenuem, per pingue lateris nafi, ad alam, eam verfus paulatim evanescentem (*d*). Accedit autem ad exteriorem ejus partem portio a Frontali (*e*).

Attollit partem labii fuperioris, quæ a latere alæ nafi eft, & finitimam ejus alæ verfus canthum majorem, cutem, quæ inter hoc labium alamque eft, laxat, & in priora aliquantum furgere facit, augetque lacunam illam, qua gena ab ala nafi labioque fuperiore difterminatur.

LEVATOR LABII SUPERIORIS (*a*).

Simplici (*b*), aliquando duplici (*c*), aut & triplici, principio oritur in gena fupra foramen, quod infra orbem offeum oculi eft; fecundum inferiorem partem orbis illius (*d*); per genam fe ad labium fuperius demittit, per illud excurrit fuper Orbicularis oris partem, quæ a Nafali labii fuperioris efficitur, atque infigniter extenuatus, cum Depreffore alæ nafi pertinaciter connexus, fenfim evanes-

(*d*) Albin. Tab. 11. Fig. 10. c.
(*e*) Ibid. Tab. 11. Fig. 10. d. Fig. 7. g.
(*a*) Albin. Tab. Mufcul. 11. Fig. 10. e. e. f. Euftach. Tab. 41. Fig. 1. I. K. & Tab. 28. h.
(*b*) Euftach. Tab. 28. h.
(*c*) Id. Tab. 41. Fig. 1. I. K.
(*d*) Albin. Tab. 11. Fig. 10. e. e.

nescit (*e*). In fine ſe conjungit cum Levatore labii ſuperioris alæque naſi. Labium trahit oculum verſus, & ſimul modice in latus; in priora ſurgere facit, quod genæ inter oculum labiumque eſt.

ZYGOMATICUS MINOR (*a*).

Oritur a priore parte lateris externi osſis jugalis, paulo infra quam a media lateris illius altitudine (*b*); deſcendit ad labium ſuperius, per quod ſupra Orbicularem oris excurrit, extremo extenuato (*c*). Jungit ſe exteriori margini Levatoris labii ſuperioris.

Labium ſuperius in latus oblique ſurſum trahit.

LEVATOR ANGULI ORIS (*a*).

Hic, a principio quodammodo biceps (*b*), originem trahit e fosſula, quæ in priore parte osſis maxillaris ſuperioris,

(*e*) Id. Tab. 11. Fig. 10. f. Euſtach. Tab. 41. Fig. 1. I. K. — α.

(*a*) Albin. Tab. Muſcul. 11. Fig. 10. i. k. Euſtach. Tab. 41. Fig. 1. L.

(*b*) Albin. Tab. 11. Fig. 10. i. Euſtach. Tab. 41. Fig. 1. L. — α.

(*c*) Albin. Tab. 11. Fig. 10. k.

(*a*) Albin. Tab. Muſcul. 11. FIg. 11. d. d. e. Fig. 12. a. b. c. d. Euſtach. Tab. 41. Fig. 3. E.

(*b*) Albin. Tab. 11. Fig. 12. a. b.

ris, inter dentes molares primos & foramen, quod infra orbem osfeum oculi eft (c), defcendit ad latus anguli oris, continuat fe Depresfori anguli (d), & partim accedit ad exteriorem partem Orbicularis oris, qua is fe per labium inferius flectit (e).

Attollit angulum oris, malæque partem, quæ a latere menti eft, quo & gena, qua fub oculo prominet, collecta furgit in priora, ut in fubridente.

ZYGOMATICUS MAJOR (a).

Oritur a priore parte lateris externi osfis jugalis, paulo fupra ejus marginem inferiorem, ibi, ubi procesfum pofteriorem inchoat (b); ab externo latere minoris, & rectius defcendit ad oris angulum, abitque in Depreflorem anguli oris (c). Subtiles fafciculi per exteriora primum Depresforis anguli, dein Depreflloris labii inferioris, excurrunt, a latere anguli per proximam labii inferioris partem in latus oppo-

(c) Albin. Tab. 11. Fig. 11. d. d.
(d) Id. Tab. 11. Fig. 11. e. Fig. 12. c.
(e) Id. Tab. 11. Fig. 12. d.
(a) Albin. Tab. Mufcul. 11. Fig. 10. l. m. n. Fig. 11. k. l. m. Fig. 13. a. b. c. d. e. Euftach. Tab. 41. Fig. 1. N. Tab. 28. k. Tab. 35. f.
(b) Albin. Tab. 11. Fig. 10. l.
(c) Id. Tab. 11. Fig. 10. m. Euftach. Tab. 41. Fig. 1. N.—β.

oppoſitum (*d*). Juxta oris angulum non modo abit in Depreſſorem ejus, ſed parte tenui decurrit pone continuationem Depreſſoris Levatorisque anguli oris (*e*), eaque deinde ſe potisſimum adjungit exteriori parti Buccinatoris, cum eoque pergit ad Orbicularem oris, ejus deinde partem in labio ſuperiori efficiens (*f*); prætereaque aliqua parte ſe deorſum curvat, continuatque interiori parti Depreſſoris anguli oris (*g*).

Angulum oris cum ſubjecta ei malæ parte attrahit eum locum verſus, qui medius inter tempus & aurem; atque ſimul genam, in tumorem ſub oculo collectam, ſurgere in priora facit, eamdemque cogit verſus tempus, ut in ridente.

DEPRESSOR ANGULI ORIS (*a*).

Ab exteriore parte imi marginis maxillæ inferioris, a latere menti, oritur (*b*), cum panniculo adipoſo pertinaciter conjunctus ab exteriore, cum Depreſſore labii inferioris ab

(*d*) Albin. Tab. 11. Fig. 10. n.
(*e*) Id. Tab. 11. Fig. 13. c.
(*f*) Id. Tab. 11. Fig. 13. d.
(*g*) Id. Tab. 11. Fig. 13. e.
(*a*) Albin. Tab. Muſcul. 11. Fig. 10. o. o. m. Fig. 11. a. b. Fig. 12. e. Fig. 13. f. g. h. i. Euſtach. Tab. 41. Fig. 1. P. dextr. Tab. 35. i. utr. lat.
(*b*) Albin. Tab. 11. Fig. 10. o. o. Euſtach. Tab. 41. Fig. 1. P. — α. α.

ab interiore. Ab origine adſcendens, ſeſeque anguſtans, & in priora recurvans, ad angulum oris pertingit, juxta quem ſe exteriore ſui parte continuat Zygomatico majori (c), inferiore Levatori anguli (d). Qua ſpectat angulum oris, ſe flectit ſecundum eum ad labium ſuperius, abitque in Naſalem labii ſuperioris (e), & in exteriorem partem Orbicularis oris, qua is labium ſuperius ab oris angulo juxta os ambit (f). Jacet hæc pars Depreſſoris ſub fibris Zygomatici majoris (g).

Angulum oris deprimit.

DEPRESSOR LABII INFERIORIS (a).

Origo huic ab exteriore parte maxillæ inferioris, paulo ſupra imum ejus marginem a latere menti (b). Adſcendit ad os a latere menti, per menti latus, & per labium inferius, pertinentque extrema ad totam prope longitudinem labii

(c) Albin. Tab. 11. Fig. 10. m. Fig. 11. b. Fig. 12. f. Fig. 13. g. Euſtach. Tab. 41. Fig. 1. P. —β.
(d) Albin. Tab. 11. Fig. 12. g. Fig. 13. h.
(e) Id. Tab. 11. Fig. 11. c.
(f) Id. Tab. 11. Fig. 11. c. Fig. 12. f. Fig. 13. g.
(g) Id. Tab. 11. Fig. 10. n.
(a) Albin. Tab. Muſcul. 11. Fig. 9. a. a. a. b. b. c. Fig. 16. m. f. Euſtach. Tab. 41. Fig. 1. Q.
(b) Albin. Tab. 11. Fig 9. a. a. a.
(c) Id. Tab. 11. Fig. 9. b. b.

labii inferioris, hoc ubi rubrum esse incipit (c), ad partem Orbicularis oris, quæ est in rubro margine labiorum, desinentia (d). Dexter cum sinistro sua amplitudine quasi conglutinatus est (e).

Labium inferius, & quod infra id a latere menti est, ipsumque mentum, oblique in latus, in quo situs, detrahit.

NASALIS LABII SUPERIORIS (a).

Pro capite, ad Orbicularem oris accedente, haberi potest Nasalis labii superioris. Principium ipsius producitur in globo nasi ab apice cartilaginis, e qua cum pare ejus globus ille majorem partem fit, indeque continuo secundum marginem septi, ex ejus involucris, usque qua labium septo continuatum (b). Retrorsum incedit secundum ima septi ad labium, flectit tum se, & per labium pergit, angulum oris versus, seque ad Orbicularem oris adjungit (c), continuatque Depressori anguli oris (d). Juvat Orbicularem, adducendo angulos oris ad se mutuo, & ex transverso contrahendo & corrugando labium superius.

BUC-

(d) Albin. Tab. 11. Fig. 9. d. e.
(e) Id. Tab. 11. Fig. 9. c.
(a) Albin. Tab. Muscul. 11. Fig. 10. q. r. Fig. 11. f.
(b) Id. Tab. 11. Fig. 10. q.
(c) Id. Tab. 11. Fig. 10. r. Fig. 11. f.
(d) Id. Tab. 11. Fig. 11. c.

BUCCINATOR (*a*).

Eſt Buccinatori origo ab exteriore parte extremi hamuli proceſſus pterygoïdei osſis multiformis (*b*), a fundo intercapedinis, quæ eſt inter hamulum & lamellam externam proceſſus modo dicti (*c*), a maxilla ſuperiore extrinſecus pone molarem intimum ſtatim ſupra gingivam (*d*), a maxilla inferiore, ab eminentia oblonga, quam illa ejus cauſa habet inter intimi molaris exteriorem partem, & radicem proceſſus coronoïdei (*e*); intermedio loco continuatur conſtrictori ſuperiori pharyngis (*f*). Per buccam ad os procedit, abitque in interiorem partem Orbicularis oris (*g*), ſic ut aliqui ex ſuperioribus faſciculis in illam Orbicularis abeant, quæ in labio ſuperiore (*h*), aliqui ex inferioribus in eam, quæ in inferiore (*i*). Adhæret totus firmiter ad membranam, os veſtientem.

An-

(*a*) Albin. Tab. Muſcul. 11. Fig. 13. k. k. Fig. 14. a. b. c. d. e. Tab. 12. Fig. 23. q. r. s. t. u. m. Euſtach. Tab. 41. Fig. 3. D. Tab. 33. D.

(*b*) Albin. Tab. 12. Fig. 23. r.

(*c*) Id. Tab. 12. Fig. 23. s.

(*d*) Id. Tab. 12. Fig. 23. t.

(*e*) Id. Tab. 12. Fig. 23 u.

(*f*) Id. Tab 12. Fig. 23 m.

(*g*) Id. Tab. 11. Fig. 14. b. c. d.

(*h*) Id. Tab 11. Fig. 14. b.

(*i*) Id. Tab. 11. Fig. 14. c.

Angulum oris cum utroque labio in latus retrorfum trahit, ac contrahit angulum; quo ea fimul buccæ pars, quæ a latere oris eft, contrahitur in rugas. Buccam firmat, movet.

ORBICULARIS ORIS (*a*).

Aliorum propago eft, ferme totus, nempe Buccinatorum (*b*), Depresforum angulorum oris (*c*), Levatorum (*d*), & Zygomaticorum majorum (*e*), qui in Orbicularem procurrentes, partem ipfius conftituunt. Accedunt quatuor portiones, ab utraque parte utriusque maxillæ una. Duæ parvæ ab exteriore parte maxillæ inferioris, utrimque infra eminentem alveolum dentis canini, incipiunt, indeque fe fecundum inferiorem partem Orbicularis incurvo ductu, & latescentes, ferunt ad fui quisque lateris angulum oris, commiscent fe cum Orbiculari, continuantque inferiori & eidem interiori parti Buccinatorum (*f*). Ejusmodi duæ, ab utraque parte una, mox fupra gingivam fuperiorem, qua ea fu-

pra

(*a*) Albin. Tab. Mufcul. 11. Fig. 10. s. t. Fig. 11. g. h. i. i. Fig. 12. h. i. Fig. 13. m. n. o. p. Fig. 14. f. g. h. i. Euftach. Tab. 41. Fig. 1. R. R. Fig. 3. G. G.

(*b*) Albin. Tab. 11. Fig. 14. i. b. c. d. e. l.

(*c*) Id. Tab. 11. Fig. 14. g. Fig. 11. g. c.

(*d*) Id. Tab. 11. Fig. 12. h. d. Fig. 13. o. p.

(*e*) Id. Tab. 11. Fig. 13. d.

(*f*) Id. Tab. 11. Fig. 14. k. l. e.

pra dentes inciſores eſt, ortæ, ſimiliter eunt ad oris angulos, commiscentque ſe cum Orbiculari, & continuant Buccinatorum parti ſuperiori (g). Muſculus ſic natus ambit os, eique adnectuntur Naſales labii ſuperioris (h), Levatores labii ſuperioris alarumque naſi (i), Levatores labii ſuperioris (k), Zygomatici minores (l), Depreſſores labii inferioris (m), & a parte poſteriore membrana oris.

Os contrahit, corrugat labia.

DEPRESSOR ALÆ NASI (a).

Eſt huic tendinoſum principium, quo oritur ab oſſe maxillari ſuperiore, extrinſecus ubi gingiva, ab alveolis dentium inciſorum & canini (b), indeque latescens adſcendit, ſeſeque tegumentis naſi inſerit circum alæ radicem (c), & ſubtus a ſepto naſi ſecundum foramen naſi, qua is cum labio cohæret, usque ad alam (d).

Hanc

(g) Albin. Tab. 11. Fig. 14. d.
(h) Id. Tab. 11. Fig. 10. r.
(i) Id. Tab. 11. Fig. 10. b.
(k) Id. Tab. 11. Fig. 10. f.
(l) Id. Tab. 11. Fig. 10. k.
(m) Id. Tab. 11. Fig. 9. d. e.
(a) Albin. Tab. Muſcul. 11. Fig. 8. a. a. b. c. c. d.
(b) Id. Tab. 11. Fig. 8. a. a. b.
(c) Id. Tab. 11. Fig. 8. c. c.
(d) Id. Tab. 11. Fig. 8. d.

Hanc nafi partem deorfum trahit; eoque fimul labium fuperius modice deprimit, quin & narem aliquantum comprimit, alam cogens feptum verfus.

LEVATOR MENTI (a).

Oritur a priore parte maxillæ inferioris, mox infra marginem ejus fuperiorem, ab alveolo incifsoris lateralis, ab eoque ab altera parte usque ad alveolum incifsoris medii, ab altera usque ad canini alveolum (b). Ad fe mutuo curvati, fe in mento commiscent, partimque continuant (c), fasciculosque pingui menti immiscent (d).

Mentum attollit, eodemque tempore labium inferius furfum cogitur.

REGIO IV. MALA CUM LATERE CALVÆ.

Malam cum latere Calvæ occupant Masfeter (a) atque Temporalis (b).

MAS-

(a) Albin. Tab. Mufcul. 11. Fig. 15. a. b. c.
(b) Id. Tab. 11. Fig. 15. a.
(c) Id. Tab. 11. Fig. 15. b.
(d) Id. Tab. 11. Fig. 15. c.
(a) Euftach. Tab. 32. q. Tab. 33. C. Tab. 41. Fig. 1. D.
(b) Euftach. Tab. 32. l. l. Tab. 33. A. Tab. 36. a. Tab. 41. Fig. 1. B. Fig. 3. A.

MASSETER (*a*).

Valens, crasſusque, Maſſeter parte exteriore (*b*), & interiore (*c*), componitur. Exterior oritur, principio tendineo (*d*), ab inferiore & eadem prioré parte extremi proceſſus oſſis maxillaris ſuperioris, cui os jugale innixum (*e*), continuoque ab exteriore parte marginis inferioris osſis jugalis, qua illud zygomatis pertem efficit, aliquanto ante inferiorem partem futuræ zygomatis oriri deſinens (*f*). Interior pars, eademque minor, procedit a tota longitudine zygomatis; ab inferiore parte marginis inferioris osſis jugalis, qua illud ad zygoma partinet (*g*); porro ab inferiore margine proceſſus zygomatici osſis temporis, usque ad tuberculum maxillæ inferioris committendæ cauſſa eminens (*h*). Supra zygoma abſcedit portio ab interiore parte membranæ tendineæ, qua Temporalis extrinſecus obductus, affixæ zygomati (*i*). Deſcen-

(*a*) Albin. Tab. Muſcul. 12. Fig. 20. a.—l. Fig. 21. a—f. Fig. 22. a.—e. Euſtach. Tab. 41. Fig. 1. D. Tab. 33. C.
(*b*) Albin. Tab. 12. Fig. 20. a. b. c. d. d. e. f. Fig. 22. a. b. b.
(*c*) Id. Tab. 12. Fig. 20. h. i. Fig. 21. a. a. b. c. d. e. e. e. Fig. 22. c. d.
(*d*) Id. Tab. 12. Fig. 20. b.
(*e*) Id. Tab. 12. Fig. 20. c.
(*f*) Id. Tab. 12. Fig. 20. d. d.
(*g*) Id. Tab. 12. Fig. 20. i. Fig. 21. a. a.
(*h*) Id. Tab. 12. Fig. 20. k. Fig. 21. b. c.
(*i*) Id. Tab. 12. Fig. 20. l. Fig. 21. f.

fcendit Maffeter per exteriorem partem lateris maxillæ inferioris, fenfim fit crasfior, poft tenuior, eftque valde tendinofus. Pars exterior extremo tendineo inferitur amplitudini exterioris partis lateris maxillæ inferioris, usque ad angulum maxillæ (*k*); pars interior fimili extremo definit ad exteriorem partem proceffus coronoïdei, a fummo ejus ad imum, porroque proximæ infra radicem ejus maxillæ parti (*l*).

Maxillam inferiorem recte adducit ad fuperiorem, ad eamque apprimit; illa autem ab hac deducta, ac firmata, capitis priorem partem deprimit. Cum pars ejus rectior fola agit, productam maxillam reftituit.

TEMPORALIS (*a*).

Primum originis initium, quafi femicirculare (*), procedit a proceffu fuperiore offis jugalis (*b*); ab eminentia, quæ eft in latere osfis frontis (*c*), in offe verticis (*d*); ab offe

(*k*) Albin. Tab. 12. Fig. 20. e. f. g. g. Fig. 22. b. b.
(*l*) Id. Tab. 12. Fig. 21. d. e. e. e. Fig. 22. c. d.
(*a*) Id. Tab. Mufculor. 12. Fig. 12. a. — n. Fig. 13. a. a. a. b. c. Fig. 14. a. b. b. c. d. e. Euftach. Tab. 41. Fig. 3. A. Tab. 33. A. Tab. 36. a.
(*) Euftach. Tab. 41. Fig. 3. A. — α. α. Tab. 36. a. — α. α. α.
(*b*) Albin. Tab. 12. Fig. 12. a.
(*c*) Id. Tab. 12. Fig. 12. b b.
(*d*) Id. Tab. 12. Fig. 12. c. Fig. 13. a. a. a.

oſſe temporis (*e*). Pergit ſubtus oriri ab amplitudine lateris calvariæ, quæ fit a proceſſu ſuperiore oſſis jugalis, a finitimo latere osſis frontis, ab oſſe verticis & ſquammoſo, a proceſſu maximo osſis multiformis, ejusque eminentiis, quæ in inferiore parte lateris ejus ſunt. Extrinſecus pars ſe demittit a membrana tendinea, qua ibi veſtitus. Fibras in anguſtum colligit, ſenſim craſſior fit, poſt paulatim decrescit. Ante ſui medium ex minimis initiis in tendineam naturam vertitur, & jam circa medium extrinſecus tendineus eſt (*f*); tendinis principium occultat caro tenuis, quæ radiata forma ad exteriorem ejus partem ſenſim accedit, eumque auget. Affigit ſe vertici proceſſus coronoïdei maxillæ inferioris (*g*), marginique poſteriori (*h*), & priori (*i*), ibi in mucronem exeuns; alteroque mucrone (*k*), & eo longiore, crasſioreque, adhæret eminentiæ (*l*), quam proceſſus coronoïdeus juxta priorem partem radicis ſuæ ex interiore parte habet. Pars poſterior & inferior, ſub zygomate, ad maxillam

(*e*) Albin. Tab. 12. Fig. 12. d. d. Fig. 13. b.

(*f*) Id. Tab. 12. Fig. 12. e. Fig. 13. c. Euſtach. Tab. 33. A. — α. Tab. 36. α. — β.

(*g*) Albin. Tab. 12. Fig. 12. f.

(*h*) Id. Tab. 12. Fig. 12. g. Fig. 14. a.

(*i*) Id. Tab. 12. Fig. 12. h. Fig. 14. b. b.

(*k*) Id. Tab. 12. Fig. 12. i. Fig. 14. c.

(*l*) Id. Tab. 12. Fig. 12. k. Fig. 14. d.

xillam defcenfura, fe circum finuatam radicem proceffus zygomatici inflectit (*m*).

Maxillam inferiorem attollit, & ad fuperiorem apprimit, eandemque fimul trahit retrorfum. Parte media & pofteriore caput maxillæ, cum id fub tuberculo osfis fquammofi hæret, retrahit in finum ejusdem. Contrariis modis caput movet, ubi maxilla inferior a fuperiore deducta, firmataque.

REGIO V. CAVUM OCULI.

Cavum oculi, præter partes alias, occupant Levator palpebræ fuperioris (*a*), Obliquus fuperior oculi (*b*), Rectus attollens (*c*), Rectus abductor (*d*), Rectus adductor (*e*), Rectus depreffor (*f*), Obliquus inferior (*g*).

LEVATOR PALPEBRÆ SUPERIORIS (*a*).

Principium hujus tendineum cum Recto attollente oculi co-

(*m*) Albin. Tab. 12. Fig. 12. m. m.
(*a*) Euftach. Tab. 39. Fig. 2. G.
(*b*) Id. Tab. 39. Fig. 2. E. Fig. 4. D.
(*c*) Id. Tab. 39. Fig. 2. H. Fig. 3. F.
(*d*) Id. Tab. 39. Fig. 2. I. Fig. 3. G. Fig. 5. C.
(*e*) Id. Tab. 39. Fig. 2. D. Fig. 3. C. Fig. 5. F.
(*f*) Id. Tab. 39. Fig. 5. E. E.
(*g*) Id. Tab. 39. Fig. 5. D.
(*a*) Albin. Tab. Mufcul. 11. Fig. 21. a. a. b. c. Euftach. Tab. 39. Fig. 2. G.

cohæret, unaque cum eo oritur a ſuperiore, & a proxima interiore parte foraminis oſſis multiformis, quo nervus opticus cavum oſſeum oculi intrat; & ſubtus etiam cohæret cum vagina, nervum opticum continente, portionibus tendineis exiguis, tanquam excurſu quodam tendineo (*b*). Sub lacunari foraminis oculi ad palpebram incedit. Anguſtus in principio ſenſim magis dilatatur, totus prætenuis; primo tendineus, dein carneus (*c*), demum in aponeuroſem (*d*) abit, quæ pertinet ad palpebræ ſuperioris cartilaginem, quæ tarſus dicitur (*e*).

Cum agit, ſuſtinetur a globo, vertitque tarſum circum eum ſurſum in poſteriora. Aperit oculum, palpebram æqualiter complicatam retrorſum trahens, ſimulque tarſum ſubjiciens ei parti ambitus oculi, quæ infra ſupercilium eſt.

OBLIQUUS SUPERIOR OCULI (*a*).

Principio tendineo oritur a ſuperiore & eadem laterali exteriore parte ambitus foraminis, quo nervus opticus intrat;

(*b*) Albin. Tab. 11. Fig. 21. a. a.
(*c*) Id. Tab. 11. Fig. 21. b.
(*d*) Id. Tab. 11. Fig. 21. c. Euſtach. Tab. 39. Fig. 2. C.—β.
(*e*) Albin. Tab. 11. Fig. 21. d. Euſtach. Tab. 39. Fig. 2. G. γ. γ.
(*a*) Albin. Tab. Muſcul. 11. Fig. 22. a. b. c. d. e. f. Euſtach. Tab. 39. Fig. 4. D.

trat; & ſubtus etiam quodam veluti excurſu tendineo cum vagina nervi optici cohæret (*b*); gracili ventre carneo (*c*) procedit ad canthum majorem, abitque in gracilem tendinem (*d*), qui curvat ſe (*e*) circum cartilaginem orbiculi (*f*), oſſi frontis juxta canthum majorem ſub ſupercilio affixi, quem tendo tranſit, ſic ut libere per eum mobilis ſit: poſt recurrit hic ad ſuperiorem partem globi, ad quem appropinquans latescit & extenuatur, ad poſtremum ſe ſcleroticæ oblique inſerit (*g*); & quidem, ſi globum a priore parte in poſteriorem metiaris, paulo poſt mediam ſummam partem ejus; ſi per transverſum, aliquanto ultra medium, in latus externum.

Globum oculi vertit, ſic ut pupillam dirigat deorſum ad prominentem ſub cantho minore genam; rotat eundem eodem tempore a ſuperiore parte per latus internum, perque partem inferiorem in latus externum; totum globum in priora protrahit, verſus canthum majorem.

(*b*) Albin. Tab. 11. Fig. 22. a.
(*c*) Id. Tab. 11. Fig. 22. b.
(*d*) Id. Tab. 11. Fig. 22. c. Euſtach. Tab. 39. Fig. 4. D. — β. γ. δ. ε.
(*e*) Albin. Tab. 11. Fig. 22. d.
(*f*) Id. Tab. 11. Fig. 22. f. Euſtach. Tab. 39. Fig. 4. E. D. — γ.
(*g*) Albin. Tab. 11. Fig. 22. e. Euſtach. Tab. 39. Fig. 4 D. — δ. ε.

QUA-

QUATUOR RECTI OCULI.

Attollens (*a*) principio tendineo, quod ab initio cohæret cum Levatore palpebræ ſuperioris, una cum eo oritur ab interno latere partis ſuperioris foraminis optici; præterea a margine oſſis multiformis, qui medius eſt inter foramen optici, & quod mox infra illud ſequitur; & ſubtus etiam exiguis portionibus tendineis, tanquam tendineo quodam excurſu, cohæret cum vagina nervi optici (*b*); primo tendineus, mox carneus (*c*), dein in tendinem tenuem, ſatis latum, abit, qui circa globum ſe inflectit, donec pervenerit ad locum, qui eſt multum ultra mediam rotunditatem globi, inter opticum & corneam intercedentem, ubi ſe inſerit ſcleroticæ & cum ea prorſus conjungitur (*d*).

Abductor (*e*) oritur capite craſſiore (*f*), a principio tendineo, una cum Depreſſore, ab inferiore parte foraminis optici, juxta latus externum; continuoque inde inferiore

(*a*) Euſtach. Tab. 39. Fig. 3. F. Albin. Tab. Muſcul. 11. Fig. 23. a. a. b. c. d.

(*b*) Albin. Tab. 11. Fig. 23. a. a.

(*c*) Id. Tab. 11. Fig. 23. b.

(*d*) Id. Tab. 11. Fig. 23. c. d. Euſtach. Tab. 39. Fig. 3. F. β. γ. γ.

(*e*) Albin. Tab. 11. Fig. 26. a. b. c. d. e. f. Euſtach. Tab. 39. Fig. 3. G. Fig. 5. C.

(*f*) Albin. Tab. 11. Fig. 26. a.

(*g*) Id. Tab. 11. Fig. 26. i.

re parte fui a ligamento, quod a latere inferioris partis foraminis, quo nervus opticus intrat, qua parte foramen illud refpicit foramen, quod mox infra fequitur, incipit, indeque pertinet ad oppofitum fibi marginem foraminis illius, qua id rotundum eft, juxta inferiorem marginem principii rimæ, in quam abit (g); & ubi ligamentum illud definit, continuo inferiore pariter parte fui oritur a proxima parte marginis foraminis, quod mox infra opticum fequitur; atque hoc caput nihil quicquam cum optici vagina cohæret: capite graciliore, tendineo, quod ab initio cohæret cum Recto attollente, una cum eo incipit a foramine optici, & cum vagina nervi illius cohæret (h). Procedit & inferitur eodem modo, ac præcedens (i).

Depressor (k) principio tendineo, nihil quicquam cum optici nervi vagina cohærente, oritur ab inferiore, & eadem cavum offeum oculi refpiciente, parte portionis osfeæ, quæ foramen optici, & quod mox infra illud fequitur, discriminat (l). Incedit, definitque, ut præcedentes (m).

Ad-

(h) Albin. Tab. 11. Fig. 26. c.

(i) Id. Tab. 11. Fig. 26. d. e. f. Euftach. Tab. 30. Fig. 3. G. β. γ. Fig. 5. C. β. γ.

(k) Albin. Tab. 11. Fig. 24. a. b. c. Euftach. Tab. 39. Fig. 5. E. E.

(l) Albin. Tab. 11. Fig. 24. a.

(m) Id. Tab. 11. Fig. 24. b. c. Euftach. Tab. 39. Fig. 5. E. β. γ. γ.

Adductor (n) capite crassiore, eoque tendineo, originem trahit ab inferiore parte foraminis optici, & a proxima lateris ejus illius, quo respicit nasum (o); capite graciliore, pariter tendineo, ab initio cohærente cum Levatore palpebræ superioris & Recto attollente, unaque cum iis cum Obliquo superiore, a foramine optici oritur, & cum nervi illius vagina cohæret (p). Hujus etiam decursus atque insertio talis est, qualis reliquorum (q).

Vertunt globum oculi in partem omnem quam facillime; Attollens sursum, Depressor deorsum; laterales in suum quisque latus.

OBLIQUUS INFERIOR OCULI (a).

Oritur principio tendineo in fundo foraminis oculi, juxta oram ejus, ab osse maxillari superiore, inter suturam ibi loci ossis illius propriam & os unguis (b). Carneus, latior, crassior fit, dein tenuior sub globo oculi procedit, ad exter-

(n) Albin. Tab. 11. Fig. 25. a. b. c. d. Eustach. Tab. 39. Fig. 3. C. Fig. 5. F.

(o) Albin. Tab. 11. Fig. 25. a.

(p) Id. Tab. 11. Fig. 25. b.

(q) Eustach. Tab. 39. Fig. 5. F. β.

(a) Albin. Tab. Muscul. 11. Fig. 18. e. f. Fig. 19. l. l. Fig. 20. h. i. Fig. 27. m. n. o. p. Eustach. Tab. 39. Fig. 5. D.

(b) Albin. Tab. 11. Fig. 27. o. Fig. 19. m. Fig. 20. i.

ternum latus, extremo suo subit Rectum abducentem (*c*), eoque, tenui, & lato scleroticæ innectitur, in externo globi latere, inter nervum opticum, & mediam rotunditatem, quæ inter eam & corneam intercedit (*d*).

Pupillam dirigit sursum ad caudam supercilii, & simul rotat globum ab externo latere per partem inferiorem, latusque porro internum, nonnihil in superiora. Globum protrahit nasum versus, sed deorsum.

REGIO VI. AURICULA.

Tragicus (*a*), Antitragicus (*b*), Major helicis (*c*), Minor helicis (*d*), Transversus auriculæ (*e*), partem hanc occupant.

TRAGICUS (*a*).

Oritur a media exteriore parte cartilaginis conchæ (*b*), juxta

(*c*) Albin. Tab. 11. Fig. 20. d.
(*d*) Id. Tab. 11. Fig. 18. e.
(*a*) Valsalva de aure humana Tab. 1. Fig. 4. B. Santorin. Observ. Anatom. Tab. 3. Fig. 4. F.
(*b*) Valsalva Tab. 1. Fig. 4. D. Santorin. Tab. 3. Fig. 4. g.
(*c*) Santorin. Tab. 3. Fig. 4. b.
(*d*) Santorin. Tab. 3. Fig. 4. c.
(*e*) Valsalva Tab. 1. Fig. 3. d. d.
(*a*) Albin. Tab. Muscul. 11. Fig. 4. f.
(*b*) Id. Tab. 11. Fig. 4. g.

juxta tragum, & ad ſuperiorem partem tragi, vicinamque conchæ deſinit. Deprimit partem conchæ, cui incumbit, facit planiorem; ſuperiorem tragi marginem vertit in priora extrorſum.

ANTITRAGICUS (a).

Oritur ab exteriore parte cartilaginis antitragi (b), qua ille maxime eminet, adſcendit ſecundum exteriora illius partis marginis conchæ, quæ ſupra antitragum eſt, & extremo tendineo inſeritur illi margini, in ipſo angulo inciſuræ, quam cartilago auriculæ pone antitragum ad imum marginem helicis habet (c).

Deprimit extremum anthelicem verſus antitragum, vertit hujus eminentem marginem extrorſum in poſteriora, premit marginem conchæ, medium inter ortum inſertionemque, incurvat, ut in concham adſurgat, magisque tendatur.

MAJOR HELICIS (a).

Principio tendineo oritur a ſuperiore parte partis exterioris

(a) Albin. Tab. Muſcul. 11. Fig. 4. h. i. k. k. l.
(b) Id. Tab. 11. Fig. 4. h. i.
(c) Id. Tab. 11. Fig. 4. k. k. l.
(a) Albin. Tab. Muſcul. 11. Fig. 4. a. b.

ris acuti helicis proceſſus (*b*), inſeritur extremo in aliis extrinſecus helici, in aliis per exteriora Attollentis auriculæ excurrit (*c*).

Premit, deprimit, percutit partem eam helicis, cui incumbit, trahit illam, cui inſertus, modice deorſum.

MINOR HELICIS (*a*).

Adjacet extrinſecus helici, ubi illa, e concha per priora auriculæ adſcenſura, inciſuram habet; altero extremo infra inciſuram illam affixus eſt, altero ſupra eam (*b*).

Contrahit dictam inciſuram, partemque, quam occupat, premit, concutit.

TRANSVERSUS AURICULÆ (*a*).

Pars altera ad anthelicem pertinet (*b*); altera ad ſcapham (*c*). Fibræ prioris partis longiores ſunt. Hæc principio tendineo oritur a poſteriore parte dorſi cavi ſuperioris conchæ

(*b*) Albin. Tab. 11. Fig. 4. a. æ.
(*c*) Id. Tab. 11. Fig. 4. b.
(*a*) Albin. Tab. Muſcul. 11. Fig. 4. c. d. e.
(*b*) Id. Tab. 11. Fig. 4. d. e.
(*a*) Albin. Tab. Muſcul. 11. Fig. 5. a. b. c. c. d. e. e. f.
(*b*) Id. Tab. 11. Fig. 5. a. b. c. c. d.
(*c*) Id. Tab. 11. Fig. 5. a. e. e. f.

chæ (*d*), extremo tendineo inſeritur cavo anthelicis dorſo (*e*), & parva etiam parte eminenti dorſo ſcaphæ (*f*). Poſterior pars e faſciculis conſtat brevioribus, laxiusque conjunctis, & magnam partem tanquam in plures muſculos minores diſtinctis, ac fere tendineis. Oritur a ſuperiore parte dorſi (*g*) cavi ſuperioris conchæ, inſeritur inferiori parti eminentis dorſi ſcaphæ (*h*). Contrahit, quod auriculæ inter concham & anthelicem, cum ſcapha intercedit; idem una cum concha & ſcapha tendit.

REGIO VII. AURIS INTERNA.

In aure interna deteguntur Externus mallei (*a*), Laxator tympani (*b*), Tenſor tympani (*c*), Stapedius (*d*).

EXTERNUS MALLEI (*a*).

Huic origo eſt ab exteriore parte acuti proceſſus, quem ul-

(*d*) Albin. Tab. 11. Fig. 5. a. b.
(*e*) Id. Tab. 11. Fig. 5. c. c.
(*f*) Id. Tab. 11. Fig. 5. d.
(*g*) Id. Tab. 11. Fig. 5. a. f.
(*h*) Id. Tab. 11. Fig. 5. e. e.
(*a*) Duverney traité de l'organe de l'ouïe. Pl. 6. Fig. 5. C. D.
(*b*) Valſalva Tab. 3. Fig. 5. H.
(*c*) Duverney Pl. 6. Fig. 5. E. F. Euſtach. Tab. 41. Fig. 9. 10.
(*d*) Duverney Pl. 5. Fig. 8. B. Pl. 8. Fig. 1. e.
(*a*) Albin. Tab. Muſcul. 11. Fig. 28. b. c. d. Fig. 31. a. b.

ultimus ossis multiformis angulus; inter os squammosum & petrosum interfertus, exigit (*b*); procedit secundum finitimam commissuram ossis squammosi & petrosi, oblique in latus retrorsum, modiceque sursum. Tendo ex tumidulo ventre (*c*) enatus intrat rimam (*d*), quæ ad finem commissuræ ossis squammosi & petrosi relicta; posteaque pergit per eum extremæ osseæ partis illius, quæ porum acusticum continet, sinum, per quem malleus processum suum longissimum, eundemque gracillimum, porrigit, totique se processus illius longitudini affigit (*e*).

Malleum in priora trahit, & modice versus porum acusticum; membrana tympani, malleum sequens, planior fit, & laxior, sed inæqualiter, maxime laxata illa parte, quæ a priore parte mallei.

LAXATOR TYMPANI (*a*).

Oritur a superiore parte marginis tympani, juxta finem pori acustici, ibi ubi membrana tympani adhæret, & inseritur manubrio mallei juxta radicem processus brevioris (*b*).

Mal-

(*b*) Albin. Tab. 11. Fig. 28. b.
(*c*) Id. Tab. 11. Fig. 28. c.
(*d*) Id. Tab. 11. Fig. 28. s.
(*e*) Id. Tab. 11. Fig. 28. d. Fig. 31. b.
(*a*) Albin. Tab. Muscul. 11. Fig. 28. a. Fig. 30. a.
(*b*) Id. Ibid.

Mallei manubrium trahit retrorfum fimul & furfum, & verfus porum acufticum; membranam tympani eodem verfus trahit, laxat, planiorem facit.

TENSOR TYMPANI (a)

Principio tendineo, tenuisfimo, oritur a fuperiore parte tubæ Euftachianæ, qua tuba illa calvariæ bafem fpectat, affimilisque eft naturæ cartilagineæ, circa osfis multiformis foramen vafa admittens ad duram matrem, fub fquamma osfis multiformis, quæ ad internum latus foraminis illius cum offe petrofo connexa (b). Pars carnea procedit per canalis osfei principium, quod femicanalis eft, unde porro per canalem illum pergit (c), poft tendine fuo ex oftio canalis illius exit (d), flectitque fe circum illud, ac deinde procedit, pertinetque ad mallei manubrium, infra proceffum ejus gracillimum, qua manubrium illud fpectat fundum tympani, oppofitum membranæ (e).

Mallei manubrium a poro acuftico retrahit ad oppofitam tympani partem, & modice in priora, quo fit, ut, cum malleum

(a) Albin. Tab. Mufcul. 11. Fig. 29. a. b. c. d. Fig. 32. a. b. c. Fig. 33. a. b. c. Euftach. Tab. 41. Fig. 9. 10.

(b) Albin. Tab. 11. Fig. 29. a. b. Fig. 32. a. Fig. 33. a.

(c) Id. Tab. 11. Fig. 29. c. Fig. 32. b. Fig. 33. b.

(d) Id. Tab. 11. Fig. 29. d.

(e) Id. Tab. 11. Fig. 33. c. d.

leum sequatur membrana tympani, eam intro trahere possit, ac tendere, cavamque efficere a parte pori acustici

STAPEDIUS (a).

Hæret venter hujus in cavernula ossis petrosi, quæ in tympano ante inferiorem partem aquæductus Fallopii est (b), & ab ea à principio oritur (c): Tendo, in cavernula ortus, exit deinde ex ejus rotundo ore, & quam primum exiit, flectit se (d), rectaque deinde petit posteriorem partem capituli stapedis, cui se inserit (e). Dictum capitulum ad os cavernulæ attrahit, quo ita movet stapedem, ut pars posterior basis ejus in vestibulum auris introeat, prior ab eodem recedat.

REGIO VIII. COLLUM.

Collum occupant Latissimus colli (a), Sternomastoïdeus (b), Cleidomastoïdeus (c), Coracohyoïdeus (d), Ster-

(a) Albin. Tab. Muscul. 11. Fig. 29. e. f. Fig. 34. a. b. c.
(b) Albin. Annot. Acad. Lib. 4. Tab. 1. Fig. 4.
(c) Albin. Tab. Muscul. 11. Fig. 29. e.
(d) Id. Tab. 11. Fig. 29. f.
(e) Id. Tab. 11. Fig. 28. i. Fig. 34. b. c.
(a) Eustach. Tab. 30. n. utr. lat.
(b) Id. Tab. 32. z. Tab. 28. y. utr. lat. Tab. 35. s.
(c) Id. Tab. 32. A. utr. lat.
(d) Id. Tab. 32. w. w. utr. lat. Tab. 33. z. utr. lat. Tab. 41. Fig. 5. l. l.

Sternohyoïdeus (*e*), Sternothyreoïdeus (*f*), Hyothyreoïdeus (*g*), Biventer maxillæ (*h*), Stylohyoïdeus (*i*), Stylohyoïdeus alter (*k*), Styloglossus (*l*), Stylopharyngeus (*m*), Mylohyoïdeus (*n*), Geniohyoïdeus (*o*), Ceratoglossus (*p*), Basioglossus (*q*), Chondroglosfus (*r*), Genioglossus (*s*), Lingualis (*t*), Constrictor pharyngis inferior (*u*), Constrictor pharyngis medius (*w*), Constrictor pharyngis superior (*x*), Salpingopharyngeus (*y*), Palatopharyngeus (*z*), Con-

(*e*) Eustach. Tab. 32. x. utr. lat. Tab. 33. c. Tab. 41. Fig. 5. m.
(*f*) Id. Tab. 32. y. utr. lat. Tab. 33. b. e. dextr. b. b. sin. Tab. 41. Fig. 5. n. n. dextr. et n. sin. Fig. 12. G.
(*g*) Id. Tab. 33. Q. Tab. 41. Fig. 5. o.
(*h*) Id. Tab. 32. r. r. sin. & r. dextr. Tab. 35. m. a. a. n.
(*i*) Id. Tab. 32. s. utr. lat. Tab. 35. l. sin. Tab. 41. Fig. 5. i.
(*k*) Id. Tab. 41. Fig. 11. K.
(*l*) Id. Tab. 33. M. Tab. 41. Fig. 8. H.
(*m*) Id. Tab. 33. P. Tab. 41. Fig. 8. F. Fig. 11. I. Tab. 42. Fig. 4. G. utr. lat. Fig. 6. O. utr. lat.
(*n*) Id. Tab. 33. H. Tab. 35. k. k. utr. lat. Tab. 41. Fig. 5. a.
(*o*) Id. Tab. 33. I. Tab. 41. Fig. 5. b. Fig. 8. M.
(*p*) Id. Tab. 33. M. Tab. 41. Fig. 8. I.
(*q*) Id. Tab. 33. L. Tab. 41. Fig. 8. K.
(*r*) Albin. Tab. Muscul. 11. Fig. 41. a, b.
(*s*) Eustach. Tab. 33. K. Tab. 41. Fig. 11. A. B. Fig. 8. L.
(*t*) Albin. Tab. Muscul. 11. Fig. 41. e. Fig. 43. a. b. c. d.
(*u*) Eustach. Tab. 41. Fig. 8. R. Tab. 42. Fig. 4. K.
(*w*) Id. Tab. 41. Fig. 8. Q. Fig. 11. L. Tab. 42. Fig. 4. I. utr. lat.
(*x*) Id. Tab. 42. Fig. 4. H. utr. lat.
(*y*) Id. Tab. 42. Fig. 6. L.
(*z*) Id. Tab. 42. Fig. 6. M. N. utr. lat.

Constrictor isthmi faucium (*a*), Levator palati mollis (*b*), Circumflexus palati (*c*), Azygus uvulæ (*d*), Cricothyreoïdeus (*e*), Cricoarytenoïdeus posticus (*f*), Arytænoïdeus obliquus (*g*), Arytænoideus transversus (*h*), Cricoarytænoïdeus lateralis (*i*), Thyreoarytænoïdeus (*k*), Thyreoarytænoïdeus alter, minor (*l*), Thyreoëpiglotticus major (*m*), Thyreoëpiglotticus minor (*n*).

LATISSIMUS COLLI (*a*).

Principium ipsius constat e tenuibus, magnamque partem

(*a*) Valsalva Tab. 5. Fig. 2. C. utr. lat.

(*b*) Eustach. Tab. 42. Fig. 4. F. utr. lat. Fig. 6. F. F. sin. & F. dextr.

(*c*) Id. Tab. 41. Fig. 13. θ. Tab. 42. Fig. 4. D. E. utr. lat. Fig. 6. D. E. utr. lat.

(*d*) Heister Comp. Anat. Tab. 8. Fig. 38. K.

(*e*) Eustach. Tab. 41. Fig. 8. V. dextr. V. V. sin. Fig. 11. S. utr. lat.

(*f*) Id. Tab. 42. Fig. 2. K. utr. lat.

(*g*) Id. Tab. 42. Fig. 2. G. & H. H.

(*h*) Id. Tab. 42. Fig. 2. F. F. F. F.

(*i*) Id. Tab. 42. Fig. 1. L.

(*k*) Id. Tab. 42. Fig. 1. K.

(*l*) Albin. Tab. Muscul. 12. Fig. 6. a. c.

(*m*) Id. Tab. 12. Fig. 3. f. g. h. Fig. 7. a. a. b. c.

(*n*) Id. Tab. 12. Fig. 3. i. k. l.

(*a*) Albin. Tab. Muscul. 11. Fig. 6. a. a. a. b. b. b. c. c. d. e. e. f. g. g. Eustach. Tab. 30. u. utr. lat.

tem ſparſis, fasciculis, quo in pectore infra claviculam, & in humero incipit (*b*). Accedunt in quibusdam hominibus fasciculi alii in latere colli (*c*). Cum panniculo adipoſo conglutinatus musculus, per collum adſcendit, oblique in priora, Sternomaſtoïdeum (*d*), & Cleidomaſtoïdeum (*e*) veſtiens. Pertingens ad latus menti, ſeſe maxillæ inſerit infra ortum Depreſſoris anguli oris (*f*). Fasciculi nonnulli in mala evanescunt (*g*), alii per exteriorem partem Depreſſoris anguli oris porriguntur verſus illum angulum (*h*); pars tenuis ſubit Depreſſorem anguli oris, cum eo decurrit, ſeſeque conjungit (*i*); portio alia pertinet ad Depreſſorem labii inferioris (*k*). Alii fasciculi quandoque adſunt, a reliquo musculo disjuncti.

Angulum oris, labium inferius, quod malæ a latere menti eſt, cutem colli, quæ eſt infra malam, trahit deorſum, & parum oblique in latus; eodem tempore totam cutem, quæ ſuperiorem partem pectoris, vicinum humerum, vicinam-

(*b*) Albin. Tab. 11. Fig. 16. a. a. a.
(*c*) Id. Tab. 11. Fig. 16. b. b. b.
(*d*) Id. Tab. 11. Fig. 16. i.
(*e*) Id. Tab. 11. Fig. 16. k.
(*f*) Id. Tab. 11. Fig. 16. g. g. Euſtach. Tab. 30. x.
(*g*) Albin. Tab. 11. Fig. 16. c. c. Euſtach. Tab. 30. y.
(*h*) Albin. Tab. 11. Fig. 16. d.
(*i*) Id. Tab. 11. Fig. 16. e. e.
(*k*) Id. Tab. 11. Fig. 16. f.

namque colli partem veſtit, ſurſum in priora trahit, colli cutem premit, trudit extrorſum. Si fasciculi alii adſunt, hi partes, ad quas pertinent, detrahunt.

STERNOMASTOIDEUS (*a*).

Oritur, principio tendineo (*b*), ab osſis pectoris parte priore & eadem ſuperiore, non longe a capite claviculæ (*c*). Paulatim latior & intumescens, poſt extenuatus, & denique in tendinem brevem, latum, tenuem, verſus (*d*), adſcendit ad capitis partem, quæ retro aurem eſt (*e*), &, cum Cleidomaſtoïdeo confluens, incurvo ductu inſeritur exteriori parti proceſſus mammillaris, ab imo ad ſummum, fere per amplitudinem ejus mediam (*f*), continuoque retrorſum vicinæ parti mammillari osſis temporis, eique vicinæ parti osſis occipitis (*g*).

Agit caput, ſi rectum eſt, oblique in illud latus, in quo ſitus, & in priora deorſum, cervicem eo verſus curvat, faciem-

(*a*) Albin. Tab. Muſcul. 16. Fig. 25. a. b. c. c. d. Fig. 26. a. b. d. e. Euſtach. Tab. 35. s.
(*b*) Albin. Tab. 16. Fig. 25. b. Fig. 26. b.
(*c*) Id. Tab. 16. Fig. 25. c. c. Euſtach. Tab. 35. f. — *α*.
(*d*) Albin. Tab. 16. Fig. 25. d. Fig. 26. e.
(*e*) Euſtach. Tab. 35. f. — *β*. Tab. 42. z.
(*f*) Albin. Tab. 16. Fig. 25. e. e. Fig. 26. f. g.
(*g*) Id. Tab. 16. Fig. 26. g. h.

ciemque in oppofitum latus aliquantum dirigit. Si cervix in pofteriora flexa fit, eo eam, fimulque in latus, magis, priusquam fupra dicto modo flectat, incurvat, ac caput deprimit. Cervice recta rigidaque, caput, cum ita converfum eft, ut facies in illud latus, in quo ipfe fitus, directa fit, reftituit.

CLEIDOMASTOIDEUS (*a*).

Originem trahit a fuperiore & eadem priore claviculæ parte, juxta caput ejus, quo offi pectoris innixa. (*b*) Rectius adfcendit, fe cum Sternomaftoïdeo conjungit (*c*), cui cæterum fubjacet, & communi cum eodem fine definit (*d*). Ab initio maximam partem carneus, extrinfecus tendinofus, in fine fit tendo craffus (*e*). Actio ferme eadem, quæ præcedentis eft, caput tamen rectius, quam ille, in latus trahit, collum rectius curvat, ac caput non æque multum convertit.

C O-

(*a*) Albin. Tab. Mufcul. 16. Fig. 25. f. g. g. h. Fig. 26. c. d. e. Euftach. Tab. 35. t. dextr.

(*b*) Albin. Tab. 16. Fig. 25. g. g. Euftach. Tab. 35. t. — α.

(*c*) Albin. Tab. 16. Fig. 25. h. Fig. 26. d.

(*d*) Id. Tab. 16. Fig. 25. e. e. Fig. 26. f. g. h. Euftach. Tab. 29. K. — α.

(*e*) Euftach. Tab. 53. t. — β.

CORACOHYOIDEUS (a).

Summa ora fuperioris marginis fcapulae, juxta lunulam, quae ad radicem proceffus Coracoïdei eft, ortum huic præbet (b). Inde fe flectit, ventremque primum format (c), quem tendo medius (d) cum ventre fecundo (e) conjungit, qui, ut & tendo, fe furfum curvat, &, oblique adfcendens, pervenit ad os hyoïdes, cujus bafis inferiori eidemque priori parti inferitur, juxta cornu, extremo tendinofo (f). Ubi fe per collum curvat, retinetur membrana, quæ ab eo ad claviculam usque exporrigitur.

Trahit os hyoïdes eodem tempore & deorfum & retrorfum, & in illud latus, ubi ipfe fitus. Sed non nifi cum pari fui animadvertitur agere, cum eoque recte detrahit os hyoïdes, ac fimul retrorfum cogit.

STERNOHYOIDEUS (a).

Principium hujus tendineum oritur ab osfis pectoris inte- riore

(a) Albin. Tab. Mufcul. 11. Fig. 35. a.a.b.c.d.e.f. Euftach. Tab. 41. Fig. 5. l. l. Tab. 33. Z. fin.
(b) Albin. Tab. 11. Fig. 35. a. a.
(c) Id. Tab. 11. Fig. 35. b. c.
(d) Id. Tab. 11. Fig. 35. d. Euftach. Tab. 41. Fig. 5. l. l.—β.
(e) Albin. Tab. 11. Fig. 35. e.
(f) Id. Tab. 11. Fig. 35. f. Euftach. Tab. 41. Fig. 5. l. l.—γ.
(a) Albin. Tab. Mufcul. 11. Fig. 39. a. b. c. d. e. Euftach. Tab. 41. Fig. 5. m. Tab. 33. c.

riore parte, & quidem ab eminente margine partis ejus illius, qua ſuſtinet claviculam juxta cartilaginem coſtæ primæ (*b*); porro a cartilaginis illius finitima ſuperiore eademque poſteriore parte (*c*), & ligamento, quo clavicula cartilagini illi alligatur (*d*), & præterea a capitis claviculæ parte proxima, eadem & poſteriore & inferiore (*e*); adſcendit primo verſus parem ſui, deinde rectius, & extremo tendinoſo inſeritur inferiori parti baſis hyoïdis, juxta ejus medium (*f*).

Detrahit baſin hyoïdis.

STERNOTHYREOIDEUS (*a*).

Lato principio oritur ab amplitudine interna oſſis pectoris, e regione inferioris partis cartilaginis coſtæ primæ, & a margine ejuſdem oſſis juxta eandem dictæ cartilaginis partem (*b*); atque ab illius etiam ipſius cartilaginis finitima interiore parte (*c*). Altero principio anguſtiore procedit a ſuperio-

(*b*) Albin. Tab. 11. Fig. 39. a.
(*c*) Id. Tab. 11. Fig. 39. b. Euſtach. Tab. 33. f.
(*d*) Albin. Tab. 11. Fig. 39. c.
(*e*) Id. Tab. 11. Fig. 39. d.
(*f*) Id. Tab. 11. Fig. 39. e. Euſtach. Tab. 41. Fig. 5. m. — β.
(*a*) Albin. Tab. Muſcul. 11. Fig. 44. a. b. c. d. e. f. g. h. Euſtach. Tab. 41. Fig. 5. n. ſin. & Fig. 12. G. Tab. 33. b. e. dextr.
(*b*) Albin. Tab. 11. Fig. 44. a. b.
(*c*) Id. Tab. 11. Fig. 44. b. c.

periore & eadem posteriore parte mediæ longitudinis cartilaginis costæ primæ (*d*); & a vicino ligamento, quo clavicula, ad cartilaginem illam alligata (*e*). Extremi parte lata, tenui, tendinea, inseritur externæ parti lateris cartilaginis thyreoïdeæ, primum mox supra marginem inferiorem juxta partem priorem, indeque oblique retrorsum sursumque tuberculum versus, quod cartilago illa ad priorem partem processus superioris habet; quo loco thyreoïdea in quibusdam eminet (*f*). Extremi autem parte angustiore, crassiore, tendinea, inseritur tuberculo modo dicto (*g*).

Cartilaginem thyreoïdeam, atque adeo laryngem deprimit, si cum sui pare agat, recte, si solus, oblique. Simul laxat asperam arteriam.

Quum plerumque partem dat Constrictori pharyngis inferiori, & Hyothyreoïdeo, eos forte adjuvat.

HYOTHYREOIDEUS (*a*).

Procedit ab inferiore & eadem interna parte basis hyoïdis

(*d*) Albin. Tab. 11. Fig. 44. d.
(*e*) Id. Tab. 11. Fig. 44. c.
(*f*) Id. Tab. 11. Fig. 44. f. g. Eustach. Tab. 41. Fig. 5. n. — β. Fig. 12. G. — β.
(*g*) Albin. Tab. 11. Fig. 44. h.
(*a*) Albin. Tab. Muscul. 11. Fig. 45. a. b. c. d. e. Eustach. Tab. 41. Fig. 5. o. & Fig. 12. E.

dis juxta cornu (*b*), & basi propinquæ ipsius cornu longitudinis fere dimidiæ (*c*): tenuis ab initio, dein crassior, porro tenuior, descendit, & inseritur inferiori parti lateris externi cartilaginis thyreoïdeæ (*d*), mox supra insertionem extremi latioris Sternothyreoïdei (*e*), & ante insertionem illam exteriori parti imi marginis thyreoïdeæ (*f*), juxta partem priorem mediam.

Thyreoïdeam attollit, os hyoïdes deprimit.

BIVENTER MAXILLÆ INFERIORIS (*a*).

Venter primus (*b*) oritur principio tendinoso (*c*) ex incili, quod radicem processus mammillaris ossis temporis ex interiore parte findit, & præcipue quidem ab interiore, eodemque humiliore margine ejus (*d*). Ex ventre primo procedit

(*b*) Albin. Tab. 11. Fig. 45. a. Eustach. Tab. 41. Fig. 12. E. — α.
(*c*) Albin. Tab. 11. Fig. 45. b. Eustach. Tab. 41. Fig. 12. E. — β.
(*d*) Albin. Tab. 11. Fig. 45. c. d. Eustach. Tab. 41. Fig. 12. E. — γ. γ. Fig. 5. o. — β.
(*e*) Albin. Tab. 11. Fig. 44. f. g.
(*f*) Id. Tab. 11. Fig. 45. d. e.

(*a*) Albin. Tab. Musculor. 12. Fig. 18. a. b. c. d. Fig. 19. a. b. c. c. d. e. f. g. g. h. i. Eustach. Tab. 35. m. α. α. n. Tab. 32. r. r. fin.
(*b*) Albin. Tab. 12. Fig. 18. a. Fig. 19. a.
(*c*) Id. Tab. 12. Fig. 19. b.
(*d*) Id. Tab. 12. Fig. 19. c. c. Eustach. Tab. 35. m. — β.

cedit tendo (*e*), qui in ventrem secundum (*f*) definit, hic autem, extremo tendinoso (*g*), infertus eft pofteriori parti imi marginis maxillæ inferioris, juxta menti medium (*h*). E tendinis extremo, ac tendinoso initio ventris fecundi, ab inferiore parte exit aponeurofis (*i*), adnectens fe priori parti bafis hyoïdis, juxta partem inferiorem, a latere (*k*), inter extrema Mylohyoïdei, Sternohyoïdei, Coracohyoïdei. Medius hicce tendo frequenter per medium Stylohyoïdeum, ob id tunc fiffum, tranfit (*l*).

Maxillam a fuperiore oblique deducit (*m*).

STYLOHYOÏDEUS (*a*).

Exili tendine incipit a pofteriore parte proceffus ftyliformis

(*e*) Albin. Tab. 12. Fig. 18. b. Fig. 19. b. Euftach. Tab. 35. m. n. — α. α.

(*f*) Albin. Tab. 12. Fig. 18. c. d. Fig. 19. e. f. g. g.

(*g*) Id. Tab. 12. Fig. 19. f.

(*h*) Id. Tab. 12. Fig. 18. d. Fig. 19. g. g. Euftach. Tab. 35. n. — γ.

(*i*) Id. Tab. 12. Fig. 19. h.

(*k*) Id. Tab. 12. Fig. 19. i.

(*l*) Id. Tab. 11. Fig. 37. e. Euftach. Tab. 35. m. α. α. n. fin. Tab. 32. r. r. fin.

(*m*) Conferantur quæ de actione hujus mufculi communicavit Cl. Albinus Acad. Annot. lib. 7. cap. 1.

(*a*) Albin. Tab. Mufcul. 11. Fig. 37. a. b. c. d. e. Euftach. Tab. 41. Fig. 5. i. Tab. 35. l. fin. Tab. 32. s. fin.

mis osſis temporis, juxta osſiculum, quod, illi proceſſui adjunctum, in multis mobile eſt (*b*). Inde producitur venter medius (*c*), qui in tendinem (*d*) tranſit, inſertum priori & eidem inferiori parti baſis hyoïdis, qua cornu cum ea connexum (*e*). In carne, inque tendine, fiſſura adeſt, per quam tranſit Biventer maxillæ inferioris (*f*), & ſupra fisſuram ſinus impresſus ab adjacente Biventre. Quandoque totus fisſus eſt.

Siniſter dexterque, æqua vi agentes, os hyoïdes recta attollunt in poſteriora.

STYLOHYOIDEUS ALTER (*a*).

Hic in nonnullis corporibus detegitur. A proceſſus ſtyliformis extremo orſus, pertinet ad hyoïdis osſiculi graniformis latus, quo illud ſpectat cornu ſubjectum. In aliis ortus finisque alius fuit.

(*b*) Albin. Tab. 11. Fig. 37. a.
(*c*) Id. Tab. 11. Fig. 37. b.
(*d*) Id. Tab. 11. Fig. 37. c.
(*e*) Id. Tab. 11. Fig. 37. d. Euſtach. Tab. 35. l.
(*f*) Albin. Tab. 11. Fig. 37. e. Euſtach. Tab. 35. l. fin. Tab. 32. s. fin.
(*a*) Euſtach. Tab. 41. Fig. 11. K.

STYLOGLOSSUS (a).

Oritur a priore eademque interiore parte extremæ fere illius partis processus styliformis, quæ mobilis in junioribus (b), hinc paulatim latior, primo tendinosus, tenuis, angustus, mox carneus & paulo crassior, mox tenuior, in priora introrsum tendit, se ad linguam adplicat juxta finem Ceratoglossi (c), indeque juxta eum, juxtaque finem Basioglossi, ulteriusque in priora ad apicem linguæ excurrit (d), conjunctus cum Linguali (e). Partem aliquam deorsum curvat, eaque se continuat Ceratoglosso (f).

Linguam retrorsum trahit, &, si depressa sit, eodem tempore attollit; cum pari sui dilatat.

STYLOPHARYNGEUS (a).

Tendineo principio oritur ab interiore parte partis posterio-

(a) Albin. Tab. Muscul. 11. Fig. 40. a. b. c. d. Fig. 43. e. f. g. Eustach. Tab. 41. Fig. 8. H. Fig. 11. F.

(b) Albin. Tab. 11. Fig. 40. a. Eustach. Tab. 41. Fig. 8. H. — α. Fig. 11. F. — α.

(c) Albin. Tab. 11. Fig. 40. b.

(d) Id. Tab. 11. Fig. 40. c.

(e) Id. Tab. 11. Fig. 41. f.

(f) Id. Tab. 11. Fig. 40. d.

(a) Albin. Tab. Muscul. 12. Fig. 27. a. b. c. d. e. Fig. 28. a. b. c. d. e. Fig. 30. a. b. c. Eustach. Tab. 42. Fig. 6. O. Tab. 41. Fig. 8. F. Fig. 11. I. Tab. 33. P.

rioris principii portionis illius, quæ, adjuncta processui styliformi ossis temporis, mobilis est ætate junioribus (*b*). Descendit in priora & modice simul introrsum, ad latus pharyngis, applicat se membranæ ipsius, per latus ejus pergit descendere; pars superior, eademque minor (*c*), se adjungit ad Palatopharyngeum (*d*); pars inferior, eademque major (*e*), altera portione inseritur lateri externo marginis cartilaginis thyreoïdeæ, ad radicem processus superioris (*f*), altera subsequenti parti marginis usque ad radicem processus inferioris (*g*).

Retrorsum ac simul extrorsum attollit thyreoïdeam cum pharynge, quo pharyngem etiam facit breviorem. Ambo, pariter agentes, pharyngem in latera diducunt.

MYLOHYOIDEUS (*a*).

Principio, majorem partem tendinoso (*b*), oritur ab emi-

(*b*) Albin. Tab. 12. Fig. 27. b. c. Fig. 28. b. c. Eustach. Tab. 41. Fig. 8. F. — α. Fig. 11. I. — α.

(*c*) Albin. Tab. 12. Fig. 27. d. Fig. 28. d.

(*d*) Id. Tab. 12. Fig. 27. l. Fig. 30. c. Eustach. Tab. 42. Fig. 6. Q. & P. Tab. 41. Fig. 11. P.

(*e*) Albin. Tab. 12. Fig. 27. e. Fig. 28. e.

(*f*) Id. Tab. 12. Fig. 27. f. Eustach. Tab. 41. Fig. 11. P. — α. Tab. 42. Fig. 6. P. — β.

(*g*) Albin. Tab. 12. Fig. 27. g.

(*a*) Albin. Tab. Muscul. 11. Fig. 38. a. a. b. c. d. e. f. g. Eustach. Tab. 41. Fig. 5. a. Tab. 35. k. k.

(*b*) Albin. Tab. 11. Fig. 38. a. a.

eminentia, per longitudinem maxillæ, a dente molare intimo fere usque ad ſymphyſem maxillæ, ex inferiore parte oblique porrecta (*c*). Procedit oblique in priora, ac ſui parem verſus, cum quo coït, per totum illud intervallum, quod inter mentum & os hyoïdes, continuatque parte carnea (*d*); porro lineam tendinoſam cum eo efficit (*e*), dein aponeuroſem (*f*), quæ inferitur priori, eidemque inferiori parti baſis oſſis hyoïdis (*g*).

Partes, quæ ſtatim ſupra hunc paremque ſitæ ſunt, Mylohoïdei premunt, agunt ſurſum; depreſſum hyoïdes attollunt, firmant.

GENIOHYOIDEUS (*a*).

Hujus principium tendinoſum incipit ab inferiore parte aſperæ eminentiæ (*b*), quam maxilla inferior ex interiore parte ex adverſo menti habet. Ex graciliore primo crasſior, dein extenuatus, latescens (*c*), recta pergit ad os hyoïdes, &

(*c*) Albin. Tab. 11. Fig. 38. b. Euſtach Tab. 41. Fig. 5. a. — α. β.
(*d*) Albin. Tab. 11. Fig. 28. c. Euſtach. Tab. 35. k. k. k. k.
(*e*) Albin. Tab. 11. Fig. 28. c d.
(*f*) Id. Tab. 11. Fig. 28. e.
(*g*) Id. Tab. 11. Fig. 28. f. Euſtach. Tab. 35. k. k. Tab. 41. Fig. 5. a. — γ. δ.
(*a*) Albin. Tab. Muſcul. 11. Fig. 36. a. b. c. d. e. Euſtach. Tab. 41. Fig. 5. b. Fig. 8. M.
(*b*) Albin. Tab. 11. Fig. 36. a. b. Euſtach. Tab. 41. Fig. 8. M. -- α.
(*c*) Albin. Tab. 11. Fig. 36. c.

& inferitur fcrobi, quæ in fuperiore & eadem priore parte bafis hyoïdis, juxta bafis illius medium, eft; continuoque reliquæ parti bafis, a fcrobe ad cornu usque (*d*), proximæque parti cornu (*e*). Extremum hocce crasfius, qua fcrobi infertum, tenuius, qua reliquæ parti bafis cornuque.

Os hyoïdes ad mentum trahit.

CERATOGLOSSUS (*a*).

A parte exteriore marginis inferioris cornu hyoïdis, ab ipfo ejus extremo ad eam partem fere usque, qua cum bafi connexum, oritur (*b*); adfcendit modice extrorfum, & fibras extremas difpergit per partem inferiorem, pofteriorem, & lateralem linguæ (*c*), continuatus Styloglоffo (*d*).

Dictam linguæ partem deorfum & introrfum trahit, cum pare fui agens, eam lateribus contrahit, anguftat.

BASIOGLOSSUS (*a*).

Originem trahit a bafis hyoïdis inferiore & eadem priore par-

(*d*) Albin. Tab. 11. Fig. 36. d.
(*e*) Id. Tab. 11. Fig. 36. e. Euftach. Tab. 41. Fig. 5. b. —— β. Fig. 8. M. —— β.
(*a*) Albin. Tab. Mufcul. 11. Fig. 40. e. e. f. d. Euftach. Tab. 41. Fig. 8. I.
(*b*) Albin. Tab. 11. Fig. 40. e. e. Euftach. Tab. 41. Fig. 8. I. -- α. α.
(*c*) Albin. Tab. 11. Fig. 40. f.
(*d*) Id. Tab. 11. Fig. 40. d.
(*a*) Albin. Tab. Mufcul. 11. Fig. 40. g. h. i. Euftach. Tab. 41. Fig. 8. K.

te, juxta cornu (*b*), & ab ipſius cornu proxima priore (*c*); adſcendit, ſenſim latior, & ad linguam deſinit, ut præcedens (*d*), ſed a parte ejus priore.

Partem dictam linguæ movet, contrahit, ut præcedens.

CHONDROGLOSSUS (*a*).

Origo huic a ſuperiore parte principii oſſiculi graniformis oſſis hyoïdis (*b*); ad linguam adſcendit, intermiſcet ſe Genioglosſo, immergitque dein linguæ, juxta Lingualis initium (*c*).

Eadem, ſed minus inſignis, hujus actio.

Poſſent Ceratogloſſus, Baſiogloſſus, & Chondroglosſus, dici Hyogloſſus.

GENIOGLOSSUS (*a*).

Principio tendinoſo ſtatim ſupra Geniohyoïdeum oritur (*b*), ab

(*b*) Albin. Tab. 11. Fig. 40. g. Euſtach. Tab. 41. Fig. 8. K. -- α.
(*c*) Albin. Tab. 11. Fig. 40. h.
(*d*) Id. Tab. 11. Fig. 40. i.
(*a*) Albin. Tab. Muſcul. 11. Fig. 41. a. b.
(*b*) Id. Tab. 11. Fig. 41. a.
(*c*) Id. Tab. 11. Fig. 41. b.
(*a*) Albin. Tab. Muſcul. 11. Fig. 41. c. d. Fig. 42. a. b. c. d. d. e. f. g. Fig. 43. k. l. l. l. m. n. o. p. Euſtach. Tab. 41. Fig. 11. A. B. Fig. 8. L.
(*b*) Albin. Tab. 11. Fig. 41. d. Fig. 42. a,

ab aſpera eminentia, quæ in interiore parte maxillæ inferioris eſt, propter ejus ſymphyſem (*c*). Ab ortu ſe paulatim & inſigniter pandit, retrorſum tendens ad imam partem linguæ, cujus ſe longitudini toti juxta medium immiſcet (*d*). Fibræ divergunt ab uno puncto, tanquam radii; aliæ ſe ad interiorem partem Ceratogloſſi adjungunt, & cum eo ad linguam pergunt (*e*). Aliæ per latus pharyngis incedunt, & harum aliquæ ad Conſtrictorem ſuperiorem pharyngis tendunt (*f*). Tendinoſa tenuitas ad baſin oſſis hyoïdis pertinet (*g*). Portio inſeritur ſuperiori parti principii oſſiculi graniformis hyoïdis (*h*).

Trahit linguam in priora.

LINGUALIS (*a*).

Ex linguæ radice oritur (*b*). Commiſcet ſe cum Baſiogloſſo, cum Styloglоſſo, & cum eo ad apicem linguæ decurrit

(*c*) Albin. Tab. 11. Fig. 41. k. Fig. 42. b.
(*d*) Id. Tab. 11. Fig. 43. l. l. l.
(*e*) Id. Tab. 11. Fig. 43. m.
(*f*) Id. Tab. 11. Fig. 43. n.
(*g*) Id. Tab. 11. Fig. 43. o.
(*h*) Id. Tab. 11. Fig. 43. p.
(*a*) Albin. Tab. Muſcul. 11. Fig. 41. e. Fig. 43. a. b. c. d.
(*b*) Id. Tab. 11. Fig. 43. a. b.

rit (c), in eoque evanescit. Per linguam incedenti Genio-glosso inhæret, a quo fasciculos quosdam accipit.

Linguam facit breviorem, contrahit, curvat, apicem trahit in fundum oris.

CONSTRICTOR PHARYNGIS INFERIOR (a).

Oritur capite altero a cartilagine thyreoïdea, & quidem ab exteriore parte marginis superioris, ante processum superiorem; proximoque tuberculo, quod ad radicem processus illius est; eminentia deinde oblonga, quæ est in latere thyreoïdeæ (b); a margine inferiore ante processum inferiorem (c); ab exteriore parte processus inferioris (d): altero capite procedit ab inferiore parte lateris externi cartilaginis cricoïdeæ, juxta partem ejus posteriorem, mox infra processum inferiorem thyreoïdeæ, qui cricoïdeam continet (e). Se retrorsum flectit, ambit pharyngis inferiora, usque

(c) Albin. Tab. 11. Fig 43. c.

(a) Albin. Tab. Muscul. 12. Fig. 23. a. b. b. c. d. e. e. Fig. 24. a. a. b. b. c. d. e. Eustach. Tab. 41. Fig. 8. R. Tab. 42. Fig. 4. K.

(b) Albin. Tab. 12. Fig. 23. b. b. Eustach. Tab. 41. Fig. 8. R. -- α. α.

(c) Albin. Tab. 12. Fig. 23. c.

(d) Id. Tab. 12. Fig. 23. d.

(e) Id. Tab. 12. Fig. 23. e. e. Fig. 24. b. b. Eustach. Tab. 41. Fig. 8. R. — α. α.

usque ad mediam poſticam partem ejus, ubi cum pari ſui coït (*f*). Conjuncti inter ſe dexter ſiniſterque, dum ſe circum pharyngem curvant, ſurſum verſus ſimul in longum mucronem porrigunt, acutoque extremo deſinunt aliquanto ſupra mediam pharyngis longitudinem (*g*). Partem accipit a Sternothyreoïdeo, & a Cricothyreoïdeo (*h*).

Pharyngem conſtringit.

CONSTRICTOR PHARYNGIS MEDIUS (*a*).

Caput alterum, illudque latius, incipit a ſuperiore & eadem exteriore parte extremi cornu osſis hyoïdis (*b*), alterum ab osſiculo graniformi hyoïdis (*c*). Fibræ tanquam ex puncto radiatim divergunt, compleĉtuntur pharyngem mediam, & ab ejus poſtica parte in longum mucronem deſinunt, qui, in multis tendineus, tenuis, affixus eſt osſi occipitis, ante foramen magnum, a parte inferiore (*d*).

Alium

(*f*) Albin. Tab. 12. Fig. 24. c. d. e.
(*g*) Id. Tab. 12. Fig. 24. c.
(*h*) Id. Tab. 11. Fig. 47. d. d. Tab. 12. Fig. 23. juxta d.
(*a*) Albin. Tab. Muſcul. 12. Fig. 23. f. g. h. Fig. 25. a. b. c. Euſtach. Tab. 41. Fig. 11. L. Tab. 42. Fig. 4. l. dextr.
(*b*) Albin. Tab. 12. Fig. 23. g.
(*c*) Id. Tab. 12. Fig. 23. h.
(*d*) Id. Tab. 12. Fig. 24. k. Fig. 25. a.

Alium mucronem versus inferiora exserit (*e*), & inter illos mucrones fibræ in angulos conveniunt; supremæ in acutos, deorsum patulos; sequentes, ut sequuntur, in majores, donec directo conveniant; post has sequentes in angulos sursum patulos, eoque minores, quo inferiores (*f*).

Attollunt Constrictores hi os hyoïdes, atque adeo etiam laryngem; pharyngem constringunt, attollunt, faciunt breviorem.

CONSTRICTOR PHARYNGIS SUPERIOR (*a*).

Parte summa exit e parte superiore marginis postici tendinis Circumflexi palati, ubi ille ultra hamulum jam processit in palatum (*b*), procedit porro a multis aliis partibus; nempe ab inferiore parte totius longitudinis hamuli processus pterygoïdei ossis multiformis, & a lamella interna processus illius, ad hamuli radicem (*c*); ex medio Buccinatoris principio, cui continuatus est (*d*); ab interna parte maxillæ

(*e*) Albin. Tab. 12. Fig. 25. b.

(*f*) Id. Tab. 12. Fig. 25. à b. ad c. Eustach. Tab. 42. Fig. 4. I. I. — *a*.

(*a*) Albin. Tab. Muscul. 12. Fig. 23. i. k. l. m. n. o. p. Fig. 24. l. l. i. i. k. m. m. Fig. 25. a. b. c. d. e. f. g. Eustach. Tab. 42. Fig. 4. H. in utr. lat.

(*b*) Albin. Tab. Muscul. 12. Fig. 23. k. Tab. 10. Fig. 15. o.

(*c*) Id. Tab. 12. Fig 23. l.

(*d*) Id. Tab. 12. Fig. 23. m.

maxillæ inferioris, juxta ſuperiora foſſulæ molaris poſtremi (e); a latere radicis linguæ, ubi primum Styloglosſus attingit Ceratoglosſum (f), & hæc pars pertenuis eſt; à Genioglosſi fibris, quas ille per latus pharyngis curvat (g). Partem ſuperiorem pharyngis amplectitur, marginem ſuperiorem incurvum habet, ſurſum patulum, eoque ſe, ſub Levatore palati mollis & ſub tuba Euſtachiana, per latus retrorſum flectit in ſuperiora. In fine ſui ſe pari immiſcet (h), & extremum ſe Conſtrictori medio innectit.

Premit partem pharyngis, quam ambit, conſtringit, trahit in priora & ſurſum.

SALPINGOPHARYNGEUS (a).

Oritur ab inferiore eademque priore parte cartilagineæ, quæ tubæ Euſtachianæ ineſt, naturæ prope extremæ (b), inde per poſteriora pharyngis deſcendit, adjungit ſe ad Palatopharyngeum (c), & cum eo commiſtus pergit; commune autem extremum Palatopharyngei & Salpingopharyngei

(e) Albin. Tab. 12. Fig. 23. n. Fig. 24. m. m. n. n. Fig. 26. c.
(f) Id. Tab. 12. Fig. 23. o.
(g) Id. Tab. 12. Fig. 23. p.
(h) Id. Tab. 12. Fig. 26. f. Euſtach. Tab. 42. Fig. 4. H. H. -- α. β.
(a) Albin. Tab Muſcul. 12. Fig. 27. q. r. Fig. 28. k. l. m. Euſtach. Tab. 42. Fig. 6. L.
(b) Albin. Tab. 12. Fig. 27. r. Fig. 28. l.
(c) Id. Tab. 12. Fig. 28. k. Euſtach. Tab. 42. Fig. 6. L. M. P.

gei per latus pharyngis se demittit, eminetque intra eam, ac facit arcum posteriorem, qui per latus faucium a palato molli descendit (*d*).

Pharyngem attollit nonnihil in priora, & facit eum eodem tempore breviorem. Tubam nonnihil detrahit.

PALATOPHARYNGEUS (*a*).

Juxta posticum marginem palati ossei exit ex membrana tendinosa, quæ, e naribus veniens, procedit per superiora palati mollis (*b*). In medio latitudinis palati mollis, fere a palati ossei postico margine usque ad radicem uvulæ, dexter sinisterque continuati inter se (*c*). Pars, sub Levatore palati mollis a principio jacens, exit ex aponeurosi Circumflexi palati (*d*). Pars per palatum molle incedit supra Levatorem palati illius, cum pari sui per mediam palati longitudinem continuata (*e*). E palato veniens in latera quisque digreditur, se curvat per lateralem pharyngis partem, porroque per posteriorem pergit (*f*), conjungens se cum

(*d*) Albin. Tab. 12. Fig. 28. m. Fig. 29. c.

(*a*) Albin. Tab. Muscul. 12. Fig. 11. f. g. Fig. 27. h. i. k. l. Fig. 28. f. g. h. Fig. 29. a.—f. Fig. 30. d. æ. e. f. g. h. i. Eustach. Tab. 42. Fig. 6. N. M.

(*b*) Albin. Tab. 12. Fig. 27. i. Fig. 28. g.

(*c*) Id. Tab. 12. Fig. 29. a.

(*d*) Id. Tab. 12. Fig. 27. k. Fig. 28. h. Fig. 29. b. b.

(*e*) Id. Tab. 12. Fig. 28. f.

(*f*) Id. Tab. 12. Fig. 27. l. Eustach. Tab. 42. Fig. 6. M.

cum Salpingopharyngeo & Stylopharyngeo (*g*). Horum extrema dextrum finiſtrumque fibris ſuis conveniunt inter ſe, per pharyngis longitudinem mediam (*h*), in poſticam partem membranæ pharyngis evaneſcunt (*i*), & inſeruntur cartilagini thyreoïdeæ (*k*); ſic ut altera pars inſeratur margini ſuperiori cartilaginis dictæ, intér proceſſum ejus ſuperiorem & epiglottidem (*l*); altera margini cartilaginis modo dictæ, & quidem lateri externo marginis illius ad radicem proceſſus ſuperioris (*m*), ac porro reliquo margini (*n*). Pars, quæ ſe per latus pharyngis demittit, eminet intra eam, arcumque facit poſteriorem, qui per latus faucium a palato molli deſcendit (*o*).

Cum utrique ſimul agunt, palatum molle detrahunt, præſertim latera ejus, maxime juxta uvulam: ſimul curvant illud, redduntque concavum in inferiora & priora, & ex lateri-

(*g*) Albin. Tab. 12. Fig. 27. d. Euſtach. Tab. 42. Fig. 6. M. O. L. P.

(*h*) Albin. Tab. 12. Fig. 27. n. o. Euſtach. Tab. 42. Fig. 6. P.

(*i*) Albin. Tab. 12. Fig. 27. p. o. p. Fig. 30. i. Euſtach. Tab. 42. Fig. 6. P. — α. α. α.

(*k*) Albin. Tab. 12. Fig. 27. ad p. p. Euſtach. Tab. 41. Fig. 11. P. — α. Tab. 42. Fig. 6. P. — β.

(*l*) Albin. Tab. 12. Fig. 30. f. Fig. 28. n. o. Fig. 29. e. f.

(*m*) Id. Tab. 12. Fig. 30. g. Fig. 27. f.

(*n*) Id. Tab. 12. Fig. 30. h. Fig. 27. g.

(*o*) Id. Tab. 12. Fig. 29. c.

teribus contrahunt. Pharyngem ſurſum trahunt, redduntque breviorem & laxiorem.

Hi inprimis, cum deglutimus, ex faucibus depellunt cibum & potionem; clauduntque viam, quæ in naſum patet, adjuti a Conſtrictoribus ſuperioribus pharyngis & a lingua (*p*).

CONSTRICTOR ISTHMI FAUCIUM (*a*).

Surgit hic a ſuperiore parte marginis linguæ circa radicem ejus (*b*). Procedit a lingua ad palatum ante tonſillam, per arcum illum, qui in faucibus a latere linguæ pertinet ad palatum molle (*c*), & hic dexter cum ſiniſtro convenit (*d*), unaque ſubtilibus præterea portionibus in uvulam excurrunt (*e*). Decurrit itaque ante Palatopharyngeum, cujus pars per palatum molle incedit ſupra Conſtrictorem iſthmi, ſub Levatore palati mollis, pars ante Conſtrictorem illum nuda eſt ab eo, pars poſt eum nuda (*f*). Palatum ad linguam trahit, concavum facit a parte linguæ, hanc contra palatum agit, ſic contrahit iſthmum faucium. *LE-*

(*p*) Conf. Albin. Hiſtor. Muſcul. Lib. 3. pag. 238. 239. ubi deglutitio ſummatim deſcribitur.

(*a*) Albin. Tab. Muſcul. 12. Fig. 11. a. b. c. d. e.

(*b*) Id. Tab. 12. Fig. 11. a.

(*c*) Id. Tab. 2. Fig 11. b. c.

(*d*) Id. Tab. 12. Fig. 11. d.

(*e*) Id. Tab. 12. Fig. 11. e.

(*f*) Id. Tab. 12. Fig. 11. f. g.

LEVATOR PALATI MOLLIS (*a*).

Oritur principio tendinoſo ab extremo oſſe petroſo, qua id Tuba Euſtachiana perforatum eſt; & ab inferiore quidem parte canalis illius extremi, ſtatim ſub principio partis tubæ ejusdem illius, quæ tota mollis (*b*). Tenuis, tendinoſus in principio, fit carneus, crasſior, poſt rurſus tenuior, pergit lateſcere, & ad palatum molle deſcendit in priora introrſum, lateſcens magis magisque (*c*); pertinetque ad mediam palati longitudinem, fere a poſtico margine palati oſſei, usque ad radicem uvulæ, ubi ſe dexter ſiniſterque continuant inter ſe (*d*), ſic ut angulos in ipſo coitu efficiant, in poſteriora patulos. In eodem palato ſe commiſcent cum Palatopharyngeis. Portio ſe fine tendineo tenui innectit membranæ tendinoſæ, quæ incedit per ſuperiora palati mollis, veniens e naribus, cum eaque ad medium poſticum marginem palati oſſei pertinere videtur (*e*). Palatum molle retrorſum attollunt, viamque, quæ cæteroquin ex ore & ex fau-

(*a*) Albin. Tab. Muſcul. 12. Fig. 9. a. b. c. d. e. f. Euſtach. Tab. 42. Fig. 6. F. dextr. F. F. ſin. lat.

(*b*) Albin. Tab. 12. Fig. 9. a.

(*c*) Id. Tab. 12. Fig. 9. b. c.

(*d*) Id Tab. 12. Fig. 9. d. Tab. 10. Fig. 14. k. Euſtach. Tab. 42. Fig. 6. F. F. F. — α. α.

(*e*) Albin. Tab. 12. Fig. 9. f. Tab. 10. Fig. 14. i.

faucibus, in nafum eft, claudunt Levatores eo tempore, quo, ore nafoque patulis, folo tamen ore fpiritum ducimus. Duobus modis via e faucibus in nafum clauditur; primo, cum patulo licet nafo fpiritum ducimus folo ore, altero cum deglutimus (*f*).

CIRCUMFLEXUS PALATI (*a*).

Duo capita habet. Alterum principio tendineo oritur ab extremo offe petrofo, qua id tuba Euftachiana perforatum eft, & ab inferiore quidem parte canalis illius extremi, ftatim a latere externo partis tubæ ejusdem illius, quæ tota mollis, itemque principii Levatoris palati mollis (*b*). Inde a fuperiore parte tendineum illud principium per marginem mufculi excurrit (*c*); & hic principii excurfus tendineus ab exteriore latere mufculi latior quandoque eft, adhæretque ligamento cuidam tenui, angufto, quod a primo mufculi ortu, fecundum radicem internam eminentiæ acutæ offis multiformis, quæ eft pone foramen tertii rami quinti nervorum paris; porroque fecundum interiorem partem eminentiæ

(*f*) Conferatur Cl. Albini Hiftoria mufculorum Lib. 3. pag. 243.

(*g*) Albin. Tab. Mufcul. 12. Fig. 9. g. h. i. k. l. Fig. 10. a.—l. Euftach. Tab. 41. Fig. 13. ⊖. Tab. 42. Fig. 6. D. E.

(*b*) Albin. Tab. 12. Fig. 10. a. Fig. 9. h.

(*c*) Id. Tab. 12. Fig. 10. a. c.

nentiæ illius oblongæ, quæ ex eodem offe inter foramen modo dictum & os petrofum eminet, porrectum eft. Principium anterius oritur ab interiore eminente pariete finus oblongi, impresfi radici parietis interni proceffus pterygoïdei offis multiformis ab exteriore parte (*d*). — Altetum caput tendineum adhæret fuperiori parti lateris externi cartilagineæ naturæ, quæ adfcribitur tubæ Euftachianæ (*e*). Lamellarum inftar hæc capita inter fe conjunguntur, confluuntque in mufculum, tenuem, latum (*f*), fefe demittentem in priora fecundum exteriorem partem parietis interni proceffus pterygoïdei, & abeuntem, ubi ad finem ejus pervenit, in tendinem latum (*g*), qui circum hamulum proceffus pterygoïdei osfis multiformis fe flectit (*h*), latus ibi, fed in anguftum corrugatus; & pofteaquam fe flexit, explicat fe per palati mollis initium, fpecie aponeurofis (*i*), inferitque poftico lunato margini palati osfei, usque ad futuram palati (*k*), & ad poftremum fe conjungit cum pari

(*d*) Albin. Tab. 12. Fig. 10. d. e. Fig. 15. p. q.
(*e*) Id. Tab. 12. Fig. 10. f.
(*f*) Id. Tab. 12. Fig. 10. h.
(*g*) Id. Tab. 12. Fig. 10. i. Euftach. Tab. 41. Fig. 13. Θ. — β. Tab. 42. Fig. 6. E.
(*h*) Albin. Tab. 12. Fig. 10. k. Euftach. Tab. 41. Fig. 13. Θ. -- β.
(*i*) Id. Tab. 12. Fig. 10. l.
(*k*) Id. Tab. 12. Fig. 10. m. Fig. 9. i. k.

pari sui (*l*). Pertinacissime adnectitur membranæ tendinosæ, quæ ex naribus venit, decurritque per superiora palati mollis.

Tendit, concutit, deorsum, in latus simul & in priora nonnihil trahit palati mollis partem osseo vicinam. Tubam Eustachianam tantillum dimovet; latus ejus externum deprimit versus internum, ac sic tubam angustat.

AZYGUS UVULÆ (*a*).

Principium hujus initio tenui tendineo implicatum est membranæ tendinosæ, quæ, ex naribus veniens, incedit per superiora palati mollis, sub ejus tegumento (*b*); & extremis tendineis Levatorum palati illius, juxta suturam palati ossei, ut ab eo procedere videatur. Hinc decurrit per medium palatum molle (*c*), perque uvulæ longitudinem (*d*).

Uvulam in priora attollit, & facit breviorem.

CRICOTHYREOIDEUS (*a*).

Hic e duabus partibus constat, priore & posteriore. Pars prior

(*l*) Albin. Tab. 12. Fig. 9. I.
(*a*) Albin. Tab. Muscul. 12. Fig. 8. a. b. c.
(*b*) Id. Tab. 12. Fig. 8. a. d. d.
(*c*) Id. Tab. 12. Fig. 8. b.
(*d*) Id. Tab. 12. Fig. 8. c.
(*a*) Albin. Tab. Muscul. 11 Fig. 46. a. b. c. d. d. Fig. 47. a. b. c. d. d. Fig. 48. a. a. b. c. c. c. Eustach. Tab. 41. Fig 11. S. fin.

prior oritur a ſuperiore margine cartilaginis cricoïdeæ, in latere partis prioris (*b*), inſeritur exteriori parti marginis inferioris thyreoïdeæ, juxta partem ejus mediam priorem (*c*). Pars poſterior oritur in exteriore parte cricoïdeæ, a media longitudine lateris ejus, fere per totam illius latitudinem (*d*); in fine ſe exteriore parte ſui adjungit ad Conſtrictorem inferiorem pharyngis (*e*); & ſub hac parte ſe inſerit thyreoïdeæ (*f*), implens totum lunatum marginem, qui fit tum a proceſſu inferiore thyreoïdeæ, tum ab ipſo cartilaginis illius margine imo, a proceſſu modo dicto usque ad tuberculum, quod e media fere marginis longitudine eminet, ex parte etiam pertinens ad interiorem ejusdem marginis partem.

Poſterior thyreoïdeam magis, quam prior, trahit in priora; cricoïdeam in poſteriora; prior rectius & deprimit thyreoïdeam, & attollit cricoïdeam.

CIRCOARYTÆNOIDEUS POSTICUS (*a*).

Oritur a cartilagine cricoïdea, cujus occupat ſinuatam ſuperfi-

(*b*) Albin. Tab. 11. Fig. 46. a. Fig. 47. a. Euſtach. Tab. 41. Fig. 11. S. — α. α.

(*c*) Id. Tab. 11. Fig. 46. b. Fig. 47. b.

(*d*) Id. Tab. 11. Fig. 46. c. Fig. 47. c. Fig. 48. a. a.

(*e*) Id. Tab. 11. Fig. 46. d. d. Fig. 47. d d. Fig. 48. b.

(*f*) Id. Tab. 11. Fig. 48. c. c. c. Euſtach. Tab. 41. Fig. 11. S. — β. β.

(*a*) Albin. Tab. Muſcul. 12. Fig. 2. d. d. d. e. Fig. 4. f. f. g. Euſtach. Tab. 42. Fig. 2. K. Fig. 1. N.

perficiem, quam in poſtica parte a latere eminentiæ mediæ habet (*b*). Parvus, paulatim anguſtior, primum crasſior, poſt extenuatus, adſcendit oblique extrorſum, & inſeritur extremo tuberculo, quod baſis arytænoïdeæ a poſtica parte in latere externo exigit (*c*).

Illam laryngis (*d*) cartilaginem, quam arytænoïdeam dicunt, extrorſum & ſimul modice retrorſum erigit primum, dein inclinat. Cum ambo eodem tempore agunt, arytænoïdeas a ſe invicem deducunt, imprimis a priore, & ſuperiore, parte, patefaciunt ergo glottidem, diducunt rimulam. Eodem tempore easdem cartilagines convertunt, ſic ut illam partem, qua ſe mutuo reſpiciunt, dirigant ad priora; eoque glottidis rimam internam quam maxime diducunt, cujus pars poſterior ex eo rotunda fit.

ARYTÆNOIDEUS OBLIQUUS (*a*).

Procedit a ſuperiore parte partis poſterioris ejusdemque exte-

(*b*) Albin. Tab. 12. Fig. 2. d. d. d. Fig. 4. f. f. Euſtach. Tab. 42. Fig. 2. K. — *α*. *α*.

(*c*) Albin. Tab. 12. Fig. 2. e. Fig. 4. g. Euſtach. Tab. 42. Fig. 1. N. — *β*.

(*d*) Conferatur de Larynge Cl. Albin. Hiſt. Muſcul. Lib. 3. pag. 252. & Tab. Muſcul. 10. Fig. 7. 14.

(*a*) Albin. Tab. Muſcul. 12. Fig. 2. a. b. c. Fig. 3. a. b. c. d. Euſtach. Tab. 42. Fig. 2. G. & H. H. Fig. 1. H. I. I.

terioris basis cartilaginis arytænoïdeæ (*b*); abit in extrema duo, alterum se Thyreoarytænoïdeo continuat (*c*), alterum secundum glottidis marginem, qui inter arytænoïdeam & epiglottidem intercedit, porrigit se ad epiglottidem, ad marginem ejus lateralem pertinens (*d*). Antequam in extrema illa abeat, flectit se in priora tum circum posteriorem partem verticis arytænoïdeæ, tum circum cartilagineum verticis illius additamentum.

Arytænoïdeas adducit ad se mutuo, forte Epiglottidem inclinat in posteriora. Contrahit & glottidem & rimulam ejus & rimam internam, quam & a posteriore parte in angulum comprimit.

ARYTÆNOIDEUS TRANSVERSUS (*a*).

Ab altera arytænoïdea deducitur ad alteram; affixusque est cartilagini arytænoïdeæ sinistræ, margini inferiori partis ejus posterioris, qui supra basem est (*b*), & eidem margini dextræ cartilaginis (*c*).

Ary-

(*b*) Albin. Tab. 12. Fig. 2. a Eustach. Tab. 42. Fig. 1. I. — α.
(*c*) Id. Tab. 12. Fig. 2. b. Fig. 3. b. e.
(*d*) Id. Tab. 12. Fig. 2. c. Fig. 3. c. d.
(*a*) Albin. Tab. Muscul. 12. Fig. 1. a. a. b. b. Eustach. Tab. 42. Fig. 2. F. F. F. F.
(*b*) Albin. Tab. 12. Fig. 1. a. a.
(*c*) Id. Tab. 12. Fig. 1. b. b.

Arytænoïdeam alteram ad alteram adducit, eoque comprimit rimulam glottidis, internamque rimam arctat, & a posteriore parte comprimit.

CRICOARYTÆNOIDEUS LATERALIS (*a*).

Oritur à cricoïdeæ summi marginis exteriore parte, in latere, statim juxta insidentem ei arytænoïdeam (*b*); extremum insertum est basi arytænoïdeæ, a latere; mox ante finem Cricoarytænoïdei postici (*c*). Adscendit ergo oblique, retrorsum se inclinans.

Utroque agente glottidis rimæ internæ pars anterior, quæ est ante cartilagines arytænoïdeas, minuitur, & ad postremum plane comprimitur, contingentibus se lateribus ejus: pars autem posterior, quæ ab iisdem cartilaginibus fit, angusta rima patet, eaque connivente a parte priore, rotundiore a posteriore, multoque breviore, quam ipsa cæterum rima interna. Et glottidis quoque rimula, cum ea angusta est, diducitur modice.

(*a*) Albin. Tab. Muscul. 12. Fig. 5. a. a. b. Eustach. Tab. 42. Fig. 1. L.

(*b*) Albin. Tab. 12. Fig. 5. a. a. Eustach. Tab. 42. Fig. 1. L.-- α. α.

(*c*) Albin. Tab. 12. Fig. 5. b. Fig. 4. g. Eustach. Tab. 42. Fig. 1. L. — β.

THYREOARYTÆNOIDEUS (*a*).

Incipit ab inferiore parte partis internæ thyreoïdeæ, juxta ejus medium (*b*); altero principio oritur a ligamento, quo colligatæ a priore parte ſunt cricoïdea, & thyreoïdea (*c*). Pars exterior magis adſcendit (*d*), hanc ſubit altera magis transverſa, quæ decuſſat eam: & pars ejus major exteriori illi ſubjacet (*e*). Extremum inſertum eſt exteriori parti marginis prioris cartilaginis arytænoïdeæ, ſupra baſem ejus, atque adeo ſupra finem Cricoarytænoïdei lateralis (*f*).

Una cum pari ſui comprimit priorem partem rimæ glottidis internæ, verum magis, fortiusque, quam Cricoarytænoïdei laterales; atque ita ut a poſteriore parte multo brevior rima maneat, eaque etiam anguſtior.

THYREOARYTÆNOIDEUS ALTER, MINOR (*a*).

Oritur ab interiore eademque ſuperiore parte thyreoïdeæ, non

(*a*) Albin. Tab. Muſcul. 12. Fig. 3. e. Fig. 4. a. a. b. c. d. e. Euſtach. Tab. 42. Fig. 1. K.

(*b*) Albin. Tab. 12. Fig. 4. a. a. Euſtach. Tab. 42. Fig. 1. K. — α. α.

(*c*) Albin. Tab. 12. Fig. 4. b.

(*d*) Id. Tab. 12. Fig. 4. c.

(*e*) Id. Tab. 12. Fig. 4. d.

(*f*) Id. Tab. 12. Fig. 4. e. Fig. 5. b. Euſtach. Tab. 42. Fig. 1. K. — β.

(*a*) Albin. Tab. Muſcul. 12. Fig. 6. a. c. Fig. 7. h. i.

non longe a fiffura cordiformi (*b*). Extremum inferitur arytænoïdeæ, mox fupra Cricoarytænoïdeum lateralem (*c*).

THYREOEPIGLOTTICUS MAJOR (*a*).

Origo ejus eft a cartilagine thyreoïdea juxta exteriorem partem partis fuperioris originis Thyreoarytænoïdei; unde primum per exteriorem partem Thyreoarytænoïdei illius, & per fuperiorem quidem partis illius, adfcendit, dein fecundum latus glottidis (*b*); pertinetque ad marginem lateralem epiglottidis, adjungens fe extremo Arytænoïdei obliqui, ad eundem marginem pertinenti (*c*). Fafciculus ejus per Thyreoarytænoïdeum alterum tranfit, cum cæterum procedat pone eum (*d*). Portio accefforia oritur ab exteriore parte marginis fuperioris cartilaginis cricoïdeæ a latere (*e*).

THYREOEPIGLOTTICUS MINOR (*a*).

Ab interiore parte cartilaginis Thyreoïdeæ juxta ejus medium,

(*b*) Albin. Tab. 12. Fig 6. a.
(*c*) Id. Tab. 12. Fig. 6. c. Fig. 5. b.
(*a*) Albin. Tab. Mufcul. 12. Fig. 3. f. g. h. Fig. 7. a. a. b. c.
(*b*) Id. Tab. 12. Fig. 3. g. Fig. 7. b.
(*c*) Id. Tab. 12. Fig. 3. h. Fig. 7. f.
(*d*) Id. Tab. 12. Fig. 7. c. h.
(*e*) Id. Tab. 12. Fig. 7. d. d. e.
(*a*) Albin. Tab. Mufcul. 12. Fig. 3. i. k. l.

dium, incipit (*b*), pertinetque ad marginem lateralem epiglottidis, fupra radicem ejus (*c*), eamque deprimit.

REGIO IX. SUB MALA.

Pterygoïdei duo, externus (*a*), & internus (*b*), hanc regionem occupant.

PTERYGOIDEUS INTERNUS (*a*).

Oritur e fundo cavi proceffus pterygoïdei osfis multiformis, principio tendinofo; porro ab interiore parte parietis externi proceffus ejusdem paulo minus, quam tota (*b*), ab inferiore parte osfis palati, qua dehiscenti proceffui pterygoïdeo interfertum (*c*), unde a principio tendinofus: & juxta hanc originem oritur etiam ab osfe maxillari fuperiori (*d*). Tendit ad inferiorem partem amplitudinis internæ illius

(*b*) Albin. Tab. 12. Fig. 3. k.
(*c*) Id. Tab. 12. Fig. 3. l.
(*a*) Euftach. Tab. 41. Fig. 13. r. Tab. 29. F.
(*b*) Id. Tab. 41. Fig. 13. Δ. utr. lat.
(*a*) Albin. Tab. Mufcul. 12. Fig. 15. a. b. c. d. e. Fig. 17. a. a. b. Euftach. Tab. 41. Fig. 13. r.
(*b*) Albin. Tab. 12. Fig. 15. b. Fig. 17. a. a. Euftach. Tab. 41. Fig. 13. r. — α.
(*c*) Albin. Tab. 12. Fig. 15. c.
(*d*) Id. Tab. 12. Fig. 15. d.

illius partis maxillæ inferioris, quam ea ad caput erigit, huicque ad imum angulum usque insertum est (e).

Maxillam inferiorem adducit ad superiorem, simul autem nonnihil oblique in latus sibi oppositum trahit.

PTERYGOIDEUS EXTERNUS (a).

Incipit a parietis externi processus pterygoïdei amplitudine exteriore prope tota (b); ab inferiore parte marginis parietis modo dicti, qui margo spectat cavum pterygoïdis (c); ab exteriore parte portionis pterygoïdeæ ossis palati, & a finitima parte ossis maxillaris superioris (d); ab inferiore parte ossis multiformis, juxta externum latus radicis processus pterygoïdei (e). Inde increscit primum modice, dein decrescit, in finem principio multo angustiorem abit; & tendinosum, quale etiam principium est, adfigitque se collo maxillæ inferioris, ubi id ab interiore parte

(e) Albin. Tab. 12. Fig. 15. e. f. f. Fig. 17. b. c. c. Eustach. Tab. 41. Fig. 13. Γ. — β.

(a) Albin. Tab. Muscul. 12. Fig. 15. g. — o. Fig. 16. a. — h. Eustach. Tab. 41. Fig. 13. Δ. fin.

(b) Albin. Tab. 12. Fig. 15. h.

(c) Id. Tab. 12. Fig. 15. i. k. Fig. 16. b. c.

(d) Id. Tab. 12. Fig. 15. l. Eustach. Tab. 41. Fig. 13. Δ; — α.

(e) Albin. Tab. 12. Fig. 15. m. Fig. 16. g. g.

te partis prioris statim sub capitulo suo sinuatum est (*f*); & priori. & eidem internæ parti marginis lamellæ cartilagineæ (*g*), quæ articulo maxillæ interjecta.

Maxillam in priora trahit, & simul oblique in latus alterum cogit, caput ejus e sinu ossis temporis protrahens, subjiciensque tuberculo ejusdem ossis.

REGIO X. PECTUS.

In Pectore siti sunt Pectoralis (*a*), Serratus anticus (*b*), Subclavius (*c*).

PECTORALIS (*a*).

Valens, crassusque, hic musculus oritur a priore parte fere tota claviculæ partis illius, quæ ad thoracis speciem incurva est (*b*); a priore margine ossis pectoris, a radice sustentaculi claviculæ, usque ad eum locum, ubi cartilago costæ

(*f*) Albin. Tab. 12. Fig. 15. n. n. Fig. 16. e. Eustach. Tab. 41. Fig. 13. Δ. — β.

(*g*) Albin. Tab. 12. Fig. 15. o. Fig. 16. h.

(*a*) Eustach. Tab. 32. K. Tab. 28. F. utr. lat. Tab. 35. y.

(*b*) Id. Tab. 32. I. Tab. 35. x.

(*c*) Id. Tab. 32. G. Tab. 35. u.

(*a*) Albin. Tab. Muscul. 18. Fig. 4. a. — k. Fig. 5. a. — f. Eustach. Tab. 35. y.

(*b*) Albin. Tab. 18. Fig. 4. a. a. Eustach. Tab. 35. y. — α.

costæ sextæ inserta (c); ab exteriore parte extremæ cartilaginis costæ sextæ (d); a superiore parte partis exterioris cartilaginis costæ septimæ fere extremæ, principio aliquamdiu tendineo, tenui (e). Cohæret cum aponeurosi obliqui externi abdominis (f), a qua portio parva ad eum etiam accedere solet (g). Pars, quæ oritur a priore parte totius cartilaginis & sæpe ipsius extremæ osseæ partis costæ quintæ, subjacet musculo; quemadmodum & subjacent portiones, quas accipit in priore parte, & ea ossi pectoris vicina, cartilaginum, quibus costæ superiores quatuor ad os pectoris pertinent. Ab his partibus petit superiorem ossis humeri (h), fasciculisque omni ex parte originis radiorum instar coëuntibus se insigniter coangustat. Pars superior (i) desinit in tendinem (k), insertum eminentiæ ossis humeri oblongæ (l) in parte ejus interiore, aliquantum infra tuber inæquale magnum capitis superioris, per longitudinem jacenti, ac sinum, per quem Bicipitis caput alterum

(c) Albin. Tab. 18. Fig. 4. b. b. b. Eustach. Tab. 35. y. — β. γ.
(d) Albin. Tab. 18. Fig. 4. c.
(e) Id. Tab. 18. Fig. 4. d.
(f) Id. Tab. 18. Fig. 4. f. f. Eustach. Tab. 35. y. — γ. δ.
(g) Albin. Tab. 18. Fig. 4. g.
(h) Eustach. Tab. 35. y. — ε.
(i) Albin. Tab. 18. Fig. 4. k. Fig. 5. a. b.
(k) Id. Tab. 18. Fig. 4. l. l.
(l) Id. Tab. 18. Fig. 4. m.

rum ſe demittit, a priore parte terminanti. Pars inferior, a priore parte veniens, ſe circum ſuperiorem flectit (*m*), deſinitque in extremum tendineum poſterius, quod a ſuperiore parte decuſſat extremum prius, ipſi applicatum, &, in fine cum eo connexum (*n*), inſeritur osſi humeri (*o*).

Cum brachium ſecundum latus corporis naturaliter pendet, attrahit id ad latus illud, modiceque ſimul in priora: cum ab eo recta in latus ſublatum, deprimit ad idem, pariterque ſimul in priora: idem in priora ſublatum, trahit ante pectus; retrorſum actum in priora. Pars ejus, quæ deſcendit, cum ſola agit, os humeri præterea attollit: transverſa agit recte in priora: quæ adſcendit, non ſolum os humeri, ſed totum quoque humerum, ideſt, ſcapulam & claviculam trahit deorſum.

SERRATUS ANTICUS (*a*).

Hujus caput primum (*b*) oritur, ut ſubſequentia, parte tendinea tenui, ab exteriore parte marginis ſuperioris extremæ

(*m*) Albin. Tab. 18. Fig. 5. c.
(*n*) Id. Tab. 18. Fig. 5. d. d.
(*o*) Id. Tab. 18. Fig. 5. e. e. f.
(*a*) Albin. Tab. Muſcul. 17. Fig. 22. a.—n. Euſtach. Tab. 35. x. Tab. 32. I.
(*b*) Albin. Tab. 17. Fig. 22. a. b.

tremæ partis offeæ coftæ tertiæ (*c*), & a proxima cartilaginis ejus (*d*). Caput fecundum (*e*) procedit ab exteriore parte coftæ quartæ, ductu obliquo, a fuperiore ejus parte, juxta cartilagineam ipfius portionem (*f*), & a proxima cartilaginea parte ipfa (*g*). Caput tertium (*h*) oritur ab exteriore parte marginis fuperioris coftæ quintæ non longe a cartilaginea ejus portione (*i*). In triangularem quafi formam fe anguftat, furfum ac modice in latus procedit, extremumque tendineum format (*k*), quod in margine, qui axillam fpectat, citius apparere incipit, & inferitur fuperiori & eidem internæ parti proceffus coracoïdei fcapulæ, haud longe a mucrone ejus extremo (*l*).

Proceffum dictum, atque adeo fcapulam ipfam in priora deorfum ad pectus trahit. Si hæc retinetur, magis fi attollitur, coftas, a quibus oritur, attollit, trahitque in latus.

SUB-

(*c*) Albin. Tab. 17. Fig. 22. c. c. Euftach. Tab. 35. x. — β.
(*d*) Albin. Tab. 17. Fig. 22. d.
(*e*) Id. Tab. 17. Fig. 22. e. f. Euftach. Tab. 35. x. — γ.
(*f*) Albin. Tab. 17. Fig. 22. g. g.
(*g*) Id. Tab. 17. Fig. 22. h.
(*h*) Id. Tab. 17. Fib. 22. i. k. Euftach. Tab. 35. x. — δ.
(*i*) Albin. Tab. 17. Fig. 22. l.
(*k*) Id. Tab. 17. Fig. 22. l. m.
(*l*) Id. Tab. 17. Fig. 22. n. Euftach. Tab. 35. x — ε.

SUBCLAVIUS (*a*).

Tendo, quo incipit, per inferiorem carnis partem excurrens, oritur ab exteriore parte cartilaginei extremi costæ primæ (*b*), aut tuberculo, quod in priore parte costæ primæ est, paulo antequam in cartilaginem transit (*c*). In latus procedens tendo, paulatim latior fit, & carneus. Venter, crassus, oblongus, latescens, in fine se extenuat, sub clavicula, secundum ductum ejus pergit, & inseritur inferiori parti claviculæ, à loco modice a capite ejus primo distante, ad eum usque, ubi incumbit processui coracoïdeo (*d*).

Claviculam attrahit ad os pectoris, impeditque, ne ab eodem in latus recedat, eandem cum processu coracoïdeo, id est, totum humerum, ducit deorsum in priora.

REGIO XI. LATUS THORACIS.

In hac solus occurrit Serratus magnus (*a*).

SER-

(*a*) Albin. Tab. Muscul. 17. Fig. 20. a. b. c. c. Eustach. Tab. 35. u.
(*b*) Albin. Tab 17. Fig. 20. a. b. Eustach. Tab. 35. u. — β.
(*c*) Eustach. Tab. 35. u. — α.
(*d*) Albin. Tab. 17. Fig. 20. c. c. Eustach. Tab. 35. n. — γ. γ.
(*a*) Eustach. Tab. 30. D. Tab. 32. M. utr. lat. Tab. 36. f. Tab. 33. m.

SERRATUS MAGNUS (*a*).

Habet Serratus magnus novem plerumque capita, ex coſtis octo ſuperioribus enaſcentia. Accedit aliquando decimum a nona coſta. Primum caput oritur ab exteriore & eadem inferiore parte coſtæ primæ (*b*), & a principio etiam inhæret intercoſtali externo primo (*c*). Caput ſecundum oritur a tota altitudine coſtæ ſecundæ (*d*), & a principio etiam inhæret intercoſtali externo primo (*e*). Primum & ſecundum hocce caput conjunguntur in unum, ex quo naſcitur pars crasſior (*f*), extremo tendinoſo inſerta præcipue interiori parti oræ ſcapulæ brevisſimæ, mediæ inter baſem oramque ſuperiorem (*g*). Caput tertium oritur ab exteriore parte marginis inferioris coſtæ ſecundæ (*h*); lateſcit ad effigiem trianguli, pertingitque ad majorem partem baſis ſcapulæ, ad interiorem partem ejus (*i*).

Oritur

(*a*) Albin. Tab. Muſcul. 17. Fig. 41. a.—z. A.— L. Euſtach. Tab. 33. m. Tab. 36. f.

(*b*) Albin. Tab. 17. Fig. 21. a. b. Euſtach. Tab. 33. m.—α.

(*c*) Albin. Tab. 17. Fig. 21. c. Euſtach. Tab. 33. m.—β.

(*d*) Albin. Tab. 17. Fig. 21. d. e.

(*e*) Id. Tab. 17. Fig. 21. f.

(*f*) Id. Tab. 17. Fig. 21. g. Euſtach. Tab. 33. m.—α. β.

(*g*) Id. Tab. 17. Fig. 21. h.

(*h*) Id. Tab. 17. Fig. 21. i. k. k. k. Euſtach. Tab. 33. m.—γ.

(*i*) Albin. Tab. 17. Fig. 21. l. l. l.

Oritur caput quartum ab exteriore parte coſtæ tertiæ (*k*), & a principio etiam inhæret intercoſtali externo tertio (*l*), extremo ſuo eoque tendinoſo pertinet ad baſem ſcapulæ infra caput tertium (*m*). Caput quintum oritur ab exteriore parte coſtæ quartæ (*n*), tendinoſoque extremo inſeritur ſcapulæ angulo inferiori, mox infra caput quartum (*o*). Caput ſextum inhæret a principio intercoſtali externo quarto (*p*), & oritur ab exteriore parte coſtæ quintæ (*q*), inſertum angulo inferiori ſcapulæ, mox infra quintum caput, extremo tendinoſo (*r*). Septimum caput inhæret ab initio Intercoſtali externo quinto (*s*), oriturque ab exteriore parte coſtæ ſextæ (*t*): pertinet ad imum anguli inferioris ſcapulæ, mox infra caput ſextum, extremo tendinoſo (*u*). Caput octavum ab initio inhæret Intercoſtali externo ſexto (*v*), & oritur ab exteriore parte coſtæ ſeptimæ

(*k*) Albin. Tab. 17. Fig. 21. m. n. n. Euſtach. Tab. 33. m. — δ.
(*l*) Albin. Tab. 17. Fig. 21. o. o.
(*m*) Id. Tab. 17. Fig. 21. p.
(*n*) Id. Tab. 17. Fig. 21. q. r. r. Euſtach. Tab. 33. m. — ε.
(*o*) Albin. Tab. 17. Fig. 21. s.
(*p*) Id. Tab. 17. Fig. 21. t. u. u.
(*q*) Id. Tab. 17. Fig. 21. v. Euſtach. Tab. 33. m. — ζ.
(*r*) Albin. Tab. 17. Fig. 21. w.
(*s*) Id. Tab. 17. Fig. 21. x. y. y.
(*t*) Id. Tab. 17. Fig. 21. z. Euſtach. Tab. 33. m. — η.
(*u*) Albin. Tab. 17. Fig. 21. A.
(*v*) Id. Tab. 17. Fig. 21. B. C. C.

mæ (*w*). Caput nonum, ab initio inhæret Intercoftali externo feptimo (*x*), & oritur ab exteriore parte coftæ octavæ (*y*). Decimum caput ab initio inhæret Intercoftali externo octavo (*z*), ortum ab exteriore parte coftæ nonæ (*a*). Cauda communis capitis octavi, noni & decimi, ad fcapulæ angulum inferiorem pertinet extremo tendinofo (*b*); cum quo extremo quandoque etiam conjungitur caput feptimum. Peramplus ergo hicce mufculus, ad latus thoracis fceleti applicatus, retrorfum it ad fcapulæ bafem, fenfim fe ex latisfimo contrahens (*c*).

Scapulam in priorem corporis partem trahit; ea retenta, coftas, a quibus oritur, retrorfum, extrorfumque.

REGIO XII. ABDOMEN.

In abdomine fiti funt Obliquus externus (*a*), Obliquus

(*w*) Albin. Tab. 17. Fig. 21. D. Euftach. Tab. 33. m. — θ.
(*x*) Albin. Tab. 17. Fig. 21. E. F. F.
(*y*) Id. Tab. 17. Fig. 21. G. Euftach. Tab. 33. m. — ι.
(*z*) Albin. Tab. 17. Fig. 21. H. I. I.
(*a*) Id. Tab. 17. Fig. 21. K. Euftach. Tab. 36. f. — ν. θ.
(*b*) Albin. Tab. 17. Fig. 21. L.
(*c*) Euftach. Tab. 33. m.
(*a*) Id. Tab. 32. T. Tab. 28. I. K. utr. lat. Tab. 29. W. utr. lat. Tab. 35. A.

quus internus (*b*), Transversus (*c*), Rectus (*d*), Pyramidalis (*e*).

OBLIQUUS EXTERNUS ABDOMINIS (*a*).

Obliquo externo octo solent esse capita, a totidem costis inferioribus parte tendinea oriunda. Caput primum incipit a costa quinta (*b*); secundum a costa sexta (*c*); tertium a septima (*d*); quartum ab octava (*e*); quintum a nona (*f*); sextum a decima (*g*); septimum a costa undecima (*h*), & hæc pars connexa est cum Transversi abdominis principio, ibi ex ejus tendinea parte exeuns (*i*); octavum a cartilagine costæ duodecimæ (*k*). Oriuntur capita margine oblique posito, ab inferiore ora costæ, per costæ exteriorem partem, in priora, marginem ejus superio-rem

(*b*) Eustach. Tab. 32. R. Tab. 29. V. utr. lat. Tab. 35. c. Tab. 36. i. g.
(*c*) Id. Tab. 33. q. utr. lat. Tab. 37. o. utr. lat. Tab. 38. o.
(*d*) Id. Tab. 33. n.
(*e*) Id. Tab. 33. u.
(*a*) Albin. Tab. Muscul. 13. Fig. 1. a. -- z. A. -- R. Fig. 2. a. -- z. A — I. Eustach. Tab. 35. A. Tab. 28. I. K. Tab. 29. W.
(*b*) Albin. Tab. 13. Fig. 1. b. c. d. d. Fig. 2. b. c. d. d.
(*c*) Id. Tab. 13. Fig. 1. e. f. g. g. Fig. 2. e. f. g. g.
(*d*) Id. Tab. 13. Fig. 1. h. i. k. k. Fig. 2. h. i. k. k.
(*e*) Id. Tab. 13. Fig. 1. l. m. n. n. Fig. 2. l. m. n. n.
(*f*) Id. Tab. 13. Fig. 1. o. p. q. q. Fig. 2. o. p.
(*g*) Id. Tab. 13. Fig. 1. r. s. t. t.
(*h*) Id. Tab. 13. Fig. 1. u. v. w. w.
(*i*) Id. Tab. 13. Fig. 1. x.
(*k*) Id. Tab. 13. Fig. 1. y. z. A.

rem versus, ducto (*k.k*). Omnia aliquamdiu manent distincta, contingunt se tamen, procedunt oblique deorsum in priora, quo & reliqua musculi caro, cum capita illa coaluerunt, pergit (*l*). Musculus sic procedens, ubi ad anteriorem partem corporis pervenit, se explicat in amplam aponeurosem (*m*). Per hanc eminent partes variæ; caro obliqui interni (*n*), & cum hac Transversi (*o*), Recti (*p*), hujus lineæ tendineæ (*q*), Pyramidalis (*r*). Desinit aponeurosis, quæ a superiore cum ima Pectoralis parte connexa est, pars summa ad priorem partem cartilaginis costæ sextæ (*s*), ad eandem partem extremæ cartilaginis costæ septimæ (*t*), ad cartilaginem mucronatam (*u*). Porro aponeuroses utriusque Obliqui externi se decussant, continuantque, cum subjectis conjungunt, formantque lineam al-

(*k.k*) Eustach. Tab. 35 A. — γ. δ. ε. ζ.
(*l*) Albin. Tab. 13. Fig. 1. a.a. Fig. 2. a.a.
(*m*) Id. Tab. 13. Fig. 1. B. B. B. B. B. C. C. D. E. E. E. E. F. F. F. G. H. H. I. K. L. M. Fig. 2. q. q. q. q. q. r. r. s. t. t. t. t. u. u. u. v. v. w. w. x. x. y. y. z. A. B. B. B. C. D. E. F. F. F. G. H. I. K. Eustach. Tab. 35. A. — β.
(*n*) Albin. Tab. 13. Fig. 1. C. C. Fig. 2. r. r.
(*o*) Id. Tab. 13. Fig. 1. D. Fig. 2. s.
(*p*) Id. Tab. 13. Fig. 1. E. E. E. E. Fig. 2. t. t. t. t.
(*q*) Id. Tab. 13. Fig. 1. F. F. F. Fig. 2. u. u. u. u.
(*r*) Id. Tab. 13. Fig. 1. G. Fig. 2. v.
(*s*) Id. Tab. 13. Fig. 2. C. Fig. 1. R.
(*t*) Id. Tab. 13. Fig. 2. D.
(*u*) Id. Tab. 13. Fig. 2. E. Eustach. Tab. 35. A. — λ. κ.

albam (v), quæ ſe per totam abdominis longitudinem extendit ad pubis ſynchondroſem usque, ſic ut dextri & ſiniſtri aponeuroſes ſe decuſſantes commisceant cum ligamentis, quæ pubis ſynchondroſem a priore parte continent (w), & pars ima procurrat, ſeſeque cum ligamentis inſerat osſi pubis oppoſito (x). In linea alba foramen eſt, per quod in embryone exibant vaſa umbilicalia (y). Juxta pubis ſynchondroſem in duas partes aponeuroſis ſe findit, inde ad pubem usque diſtinctas, tendinum ſpecie (z), ex quo fiſſura fit, per quam elabitur funiculus vaſorum ſpermaticorum cum Cremaſtere (in fœmina ligamentum uteri rotundum). Interior ſe commiſcet cum ligamentis ſynchondroſem continentibus. Exterior harum partium ſe inſerit tuberculo, quod e ſuperiore eademque priore parte osſis pubis eminet; proximæque ſpinæ, quæ ab illius tuberculi latere externo eſt; ex parte etiam ab interno ejusdem tuberculi latere cum ligamentis, quæ pubis ſynchondroſem a priore parte continent, commiſcet (a). Ab altero tendinum modo dictorum ad

(v) Albin. Tab. 13. Fig. 2. E. F. F. F. Euſtach. Tab. 38. K. K. Tab. 35. A. B. — κ. ι.

(w) Albin. Tab. 13. Fig. 2. H.

(x) Id. Tab. 13. Fig. 2. I. K.

(y) Id. Tab. 13. Fig. 2. G.

(z) Id. Tab. 13. Fig. 1. H. H. I. K. Fig. 2. x. x. y. y.

(a) Id. Tab. 13. Fig. 1. K.

ad alterum pertinet pars tenuior, qua primum à ſe invicem ad fiſſuram faciendam diſcedere incipiunt, eosque connectit inter ſe (*b*); ſub qua parte funiculus vaſorum Spermaticorum cum Cremaſteris principio decurrit; & infra eam juxta ipſam pubem, funiculus elabitur per annulum Obliqui hujus, qui annulus parvus eſt (*c*), & relinquitur inter partem hanc tenuiorem (*d*), tendines (*e*), & os pubis. Pertinet denique muſculus hic poſteriore parte ad ſuperiorem & exteriorem partem prioris longitudinis criſtæ oſſis ilium primum carne (*f*), aliis in tendinoſum finem extenuata, dein aponeuroſi (*g*). Imus margo tendineus à criſtæ ilium extremo priore pertinet ad pubem (*h*); hic, craſſus, cum vagina tendinea, quæ femur ambit, cohæret, eique tenuem portionem dat. Perforata aliquot foraminibus aponeuroſis eſt, quibus exeunt vaſa, nervi.

Peritonæum coërcet, firmat, premit, comprimit, ſic abdomen contrahit, & quæ id continet, premit, atque exprimit exprimenda: premendo viſcera abdominis Diaphrag-

ma

(*b*) Albin. Tab. 13. Fig. 1. L. Fig. 2. z.
(*c*) Id. Tab. 13. Fig. 2. A.
(*d*) Id. Tab. 13. Fig. 2. z.
(*e*) Id Tab. 13. Fig. 2. x. y.
(*f*) Id. Tab. 13. Fig. 1. P. Q. Euſtach. Tab. 35. A. — η.
(*g*) Albin. Tab. 13. Fig. 1. O. P.
(*h*) Id. Tab. 13. Fig. 1. N. N. Euſtach. Tab. 35. A. — θ.

ma agit ſurſum, ad anguſtandum thoracem, premendos pulmones, aëremque ex iis exprimendum.

OBLIQUUS INTERNUS ABDOMINIS (*a*).

Cum Serrato poſtico inferiore procedit, gemina aponeuroſi, poſt in unam confluente (*b*), a ſpinis vertebrarum lumborum inferiorum trium, & ſequentibus osſis ſacri, itemque a procesſibus transverſis vertebrarum lumborum inferiorum; a ſuperiore parte illius criſtæ ilium partis, quæ ultra proceſſus transverſos lumborum eminet in poſteriora, poſt a ſuperiore parte reliquæ criſtæ illius (*c*), & ubi criſta priore parte deſinit, cohæret cum margine tendineo Obliqui externi abdominis, ſic ut ab eo oriri videatur (*d*). Caro, ſic nata, circum abdomen tendit in priora, decurſu fibrarum ferme radiato, ſic tamen ut plures adſcendant (*e*); inter coſtæ decimæ extremum, ac partem lateralem pubis, vertitur

(*a*) Albin. Tab. Muſcul. 13. Fig. 3. a.—k. Fig. 4. a.—u. Fig. 5. a.—v. Euſtach. Tab. 35. C. Tab. 36. i. g. Tab. 32. R.

(*b*) Albin. Tab. 13. Fig. 3. a. a. Fig. 5. a. Euſtach. Tab. 36. g.--γ.

(*c*) Albin. Tab. 13. Fig. 3. b. b. Fig. 4. b. Fig. 5. b. b. d. d. Euſtach. Tab. 36. i.—α. α.

(*d*) Albin. Tab. 13. Fig. 4. c. c. Fig. 5. e. e.

(*e*) Id. Tab. 13. Fig. 4. a. Fig. 5. f. Euſtach. Tab. 36. i. Tab. 35. C.—α.

tur lunato termino in aponeurosem latam (*f*), quæ se in duas lamellas dividit (*g*), non tota, sed maxima parte sui; etenim, quod aponeurosis est infra locum, qui circa medius inter umbiculum pubisque synchondrosem, simplex manet, a posteriore parte conjunctum cum aponeurosi Transversi, cum eaque incedens ante Rectum (*h*). Ipse musculus ab ortu suo pandit se atque inserit exteriori parti marginis inferioris costæ duodecimæ, partis osseæ extremæ & cartilagineæ (*i*), undecimæ (*k*), decimæ (*l*), & in intervallis costarum cohæret cum Intercostali interno undecimo (*m*), atque decimo (*n*). Lamellarum, in quas se aponeurosis dividit, prior, affigitur inferiori parti costæ nonæ (*o*), conjungit se cum aponeurosi Obliqui externi (*o o*), posteriorem partem ejus ad lineam albam usque vestiens,

secun-

(*f*) Albin. Tab. 13. Fig. 4. e. e. e. Fig. 5. o. o. o. Eustach. Tab. 35. C. — β.

(*g*) Albin. Tab. 13. Fig. 4. g. g. g. h. & k. k. Fig. 5. s. s. s. & t. t. t.

(*h*) Id. Tab. 13. Fig. 4. inter g. inferiorem & i. inferiorem. Eustach. Tab. 33. r.

(*i*) Albin. Tab. 13. Fig. 3. d. e. Fig. 5. g. h. Eustach. Tab. 36. i. — β. γ.

(*k*) Albin. Tab. 13. Fig. 3. f. g. Fig. 5. k. l. Eustach. Tab. 36. i. — δ.

(*l*) Albin. Tab. 13. Fig. 3. h. Fig. 5. n. n. Eustach. Tab. 35. C. -- ε. ζ.

(*m*) Albin. Tab. 13. Fig. 5. i.

(*n*) Id. Tab. 13. Fig. 5. m.

(*o*) Id. Tab. 13. Fig. 4. g. g. g. h. Fig. 5. q. q.

(*oo*) Eustach. Tab. 35. C. — η. θ.

ſecundum marginem thoracis evaneſcens in Obliqui externi aponeuroſem, infra ſe cum eadem aponeuroſi inſerit pubis ſpinæ, tuberculo, ligamentis, & hac parte admodum tenuis eſt; Lamella poſterior (*p*), poſt Rectum incedens, ſe affigit imo thoracis margini (*q*), qui fit ex cartilaginibus coſtæ octavæ & ſeptimæ; margini oſſeæ partis cartilaginis mucronatæ, & cartilaginis ipſius (*r*); porro ad lineam albam pertinet (*s*). Pars carnis, ſub qua decurrit funiculus vaſorum ſpermaticorum, leviter eminet, & per eam ille conſpicuus eſt (*t*); hæcque pars deinde ſupra funiculum decurrit, & in principium Cremaſteris abit (*u*). Poſtea funiculus per carnem exit (*v*). In fœmina, quæ Cremaſterem non habet, infra imum marginem elabuntur uteri ligamenta rotunda.

Actio in genere eadem eſt, quæ Obliqui externi; magis autem in thoracis marginem agere videtur.

TRANSVERSUS ABDOMINIS (*a*).

Ex interiore parte coſtarum inferiorum ſeptem (*b*), extremis

(*p*) Albin. Tab. 13. Fig. 4. k. k. Fig. 5. t. t. t.
(*q*) Id. Tab. 13. Fig. 4. l. m. n.
(*r*) Id. Tab. 13. Fig. 4. o. p. q. r.
(*s*) Id. Tab. 13. Fig. 4. s. s. s.
(*t*) Id. Tab. 13. Fig. 4. t. Fig. 5. u.
(*u*) Id. Tab. 13. Fig. 4. u. Fig. 5. v. Euſt. Tab. 32. R. γ. Tab. 35. C. θ.
(*v*) Albin. Tab. 13. Fig. 4. y.
(*a*) Albin. Tab. Muſcul. 14. Fig. 1. w.—γ. Fig. 2. a.—z. Fig. 3. a.—r. Euſtach. Tab. 33. q. Tab. 37. o. Tab. 38. o.
(*b*) Euſtach. Tab. 36. Q.—ι. κ. Tab. 33. q. dextr.

tremis procesſibus transverſis imæ dorſi (*c*), & lumborum ſuperiorum quatuor, ſuperiore & interiore parte criſtæ osſis ilium (*d*), eique proxima marginis imi tendinei Obliqui externi, originem trahit. Caput primum principio tendineo oritur ab interiore parte coſtæ ſextæ, ab extrema parte oſſea, & proxima cartilaginea (*e*). Hoc caput accenſeri poſſet Triangulari ſterni, quia cum ejus capite inferiore & citius & ductu magis conſimili conjunctum eſt, quam cum capite, quod mox infra ſequitur. Caput ſecundum incipit principio tendineo ab interiore parte cartilaginis coſtæ ſeptimæ (*f*). Sequitur tunc principium, in partes aliquot fiſſum, quo oritur ab interiore parte cartilaginis coſtæ octavæ (*g*). Ex intervallo coſtæ octavæ & nonæ, e ſuperficie interna Intercoſtalis interni, & partim ab ipſa coſta nona, aponeuroſi quadam venit (*h*), qualis etiam ex intervallo coſtæ nonæ & decimæ (*i*), decimæ & undecimæ (*), undecimæ & duodecimæ (†), adeſt. Procedit porro ab-

(*c*) Euſtach. Tab. 37. o. — β. β. β. β. β.
(*d*) Id. Tab. 37. o. — γ. ζ. ζ. Tab. 33. q. β.
(*e*) Albin. Tab. 14. Fig. 1. w. x. y. z. Fig. 2. a. b. c. d.
(*f*) Id. Tab. 14. Fig. 1. α. β. γ. γ. Fig. 2. e. f. g.
(*g*) Id. Tab. 14. Fig. 1. δ. δ. δ. δ.
(*h*) Id. Tab. 14. Fig. 1. ε. Fig. 2. i.
(*i*) Id. Tab. 14. Fig. 1. η. Fig. 2. m.
(*) Id. Tab. 14. Fig. 2. o.
(†) Id. Tab. 14. Fig. 2. q.

ab interiore parte cartilaginis coſtæ nonæ (*k*), decimæ (*l*), undecimæ (*m*), duodecimæ (*n*), a criſta ilium (*o*), a margine tendineo Obliqui externi abdominis (*p*). Pergit oriri capite tendineo ab exteriore parte imi marginis coſtæ duodecimæ (*q*), & a poſteriore extremi proceſſus transverſi vertebræ quintæ lumborum (*r*); alio a poſteriore parte extremi proceſſus transverſi lumborum quartæ (*s*); huicque ſuperinducta tendinea tenuitas eſt (*t*), quæ cum eo oritur a proceſſu transverſo (*u*), & præterea ab eo ipſo capite procedit (*v*); ſeſeque affigit exteriori parti imi marginis coſtæ duodecimæ (*w*); ſimili capite ab exteriore parte extremi proceſſus transverſi vertebræ lumborum tertiæ (*x*), & hoc ſimili obductum eſt tenuitate tendinea, cum

(*k*) Albin. Tab. 14. Fig. 1. ζ. Fig. 2. l.
(*l*) Id. Tab. 14. Fig. 1. θ. Fig. 2. n.
(*m*) Id. Tab. 14. Fig. 1. ι. Fig. 2. p.
(*n*) Id. Tab. 14. Fig. 2. r.
(*o*) Id. Tab. 14. Fig. 1. κ.
(*p*) Id. Tab. 14. Fig. 1. λ. λ. Fig. 2. u. u.
(*q*) Id. Tab. 14. Fig. 3. a. b. b.
(*r*) Id. Tab. 14. Fig. 3. c.
(*s*) Id. Tab. 14. Fig. 3. e. f.
(*t*) Id. Tab. 14. Fig. 3. g.
(*u*) Id. Tab. 14. Fig. 3. f.
(*v*) Id. Tab. 14. Fig. 3. h. h.
(*w*) Id. Tab. 14. Fig. 3. i. i.
(*x*) Id. Tab. 14. Fig. 3. k. l. m.

cum eo oriente, & præterea ab eo adſcedente (y); denique una cum ſimili tenuitate tendinea a poſteriore parte proceſſus transverſi extremi ſecundæ lumborum (z). Pars tendinea a procesſibus transverſis & a criſta ilium aliquamdiu in priora pergit, ſpecie membranæ, priusquam ſe in carnem vertat, ſua ſuperiore parte adhærens imo margini coſtæ duodecimæ ad ejus mucronem usque (a), in principio præterea connexa cum aponeuroſi communi Serrati poſtici inferioris, & obliqui interni (b), & cum ea annexa criſtæ ilium (bb).

Pars carnea a coſtis, a tendine dicto, a criſta ilium, margine obliqui externi procedens, ſe circum peritonæum flectit in priora (c), fibris plerisque transverſis, quarum inferiores partem efficiunt tenuiorem, quæ ſe cum inferiore parte carnis Obliqui externi commiſcet. Ad poſtremum in amplam deſinit aponeuroſem (d), hæc ad lineam albam

usque

(y) Albin. Tab. 14. Fig. 3. l. m. o. o.
(z) Id. Tab. 14. Fig. 3. p. q.
(a) Id. Tab. 14. Fig. 3. v. w. x. y. Fig. 2. s. Euſtach. Tab. 37. o. — δ.
(b) Albin. Tab. 14. Fig. 3. s. s.
(bb) Euſtach. Tab. 37. o. — γ.
(c) Id. Tab. 14. Fig. 1. μ. Fig. 2. t. Fig. 3. γ. Euſtach. Tab. 37. o. — ε. Tab. 33. q. — α.
(d) Albin. Tab. 14. Fig. 1. ν. ν. Fig. 2. v. Euſtach. Tab. 33. q. — γ.

usque ſeſe extendit, & non longe ab initio ſuo cum aponeuroſi Obliqui interni plane coït (*e*), unaque cum ea inſeritur priori parti cartilaginis mucronatæ, non longe ab ipſius mucrone (*f*), & inferiori parti marginis cartilaginis ejusdem (*g*), porroque eidem margini, & margini partis oſſeæ (*h*), conjuncta ibi cum extremo tendineo Triangularis ſterni. Circa medium inter umbilicum & pubis ſynchondroſem, ex transverſo ſindit ſe aponeuroſis (*i*), ac ſuperiore parte earum, in quas ſe ſindit, pone Rectum, incedit, peritonæum proxime ambit, veſtitque poſteriorem partem lamellæ poſterioris aponeuroſis obliqui interni (*k*), inferiore ſe inter Rectum & peritonæum non interſerit, ſed veſtiens poſteriorem partem aponeuroſis Oblibli interni, cum ea incedit ante Rectum & Pyramidalem (*l*). Per fiſſuram ipſam Rectus tranſit, cui magnitudine & fiſſura reſpondet. Ante cartilaginis enſiformis mucronem conjungit ſe aponeuroſis Transverſi cum aponeuroſi ejusdem alterius lateris, & infra hunç per longitudinem to-

tam

(*e*) Albin. Tab. 14. Fig. 1. π. Euſtach. Tab. 33. r.
(*f*) Albin. Tab. 14. Fig. 1. ϱ.
(*g*) Id. Tab. 14. Fig. 1. σ.
(*h*) Id. Tab. 14. Fig 1. τ. Euſtach. Tab. 33. q. — ∂.
(*i*) Albin. Tab. 14. Fig. 1. ⸸.
(*k*) Id. Tab. 14. Fig. 1. φ. φ. φ.
(*l*) Id. Tab. 14. Fig. 1. ν.

tam lineæ albæ. Ab inferiore parte tota tenuis, connexaque cum imo margine obliqui externi, deinde cum vagina tendinea femur ambiente, posteaque inseritur ossi pubis cum obliquo interno.

Actio est, quæ præcedentium.

RECTUS ABDOMINIS (a).

Exoritur tendinibus duobus; altero, eoque præcipuo e superiore eademque priore parte ligamenti, quo synchondrosis ossium pubis a priore parte constricta (b), & exigua portione a proximo osse pubis (c); altero longius venit e priore parte ligamenti ejusdem (d); duo tendines se conjungunt, non multo post in carnem se vertunt, quæ quo adscendit altius magis latescit, & primum crassior fit, dein sensim extenuatur, tribus extremis desinens ad costæ septimæ, sextæ, quintæ, cartilagines. Pertinet primum ad inferiorem proximamque exteriorem partem extremæ cartilaginis costæ septimæ (e); secundum ad exteriorem partem marginis inferioris cartilaginis costæ sextæ, propius mediam ejus

(a) Albin. Tab. Muscul. 13. Fig. 6. a.--q. q. Eustach. Tab. 33. n.
(b) Albin. Tab. 13. Fig. 6. a. b.
(c) Id. Tab. 13. Fig. 6. c.
(d) Id. Tab. 13. Fig. 6. d. e.
(e) Id. Tab. 13. Fig. 6. o. o. Eustach. Tab. 33. n. — α.

ejus longitudinem, ad externum primi latus (*f*); tertium ad exteriorem eandemque inferiorem partem cartilaginis costæ quintæ, fere, ubi cartilago illa incipit, ad externum latus extremi secundi (*g*). Lineæ transversæ tres carnem hujus musculi in quatuor distinguunt portiones (*), prima e regione umbilici est (*h*); secunda media inter umbilicum, & locum, ubi Rectus pectus primum conscendit (*i*); tertia ibi, ubi Rectus pectus primum conscendit, aut conscensurus est (*k*). Infra umbilicum aliquando quarta adest, sæpe imperfecta (*l*). Pertinacissime adhærent Aponeurosi Obliquorum communi, qua, tanquam vagina, continetur Rectus.

Actio Recti fere, quæ Obliqui externi.

PYRAMIDALIS (*a*).

Oritur principio tendineo e superiore parte ligamenti, quo

(*f*) Albin. Tab. 13. Fig. 6. p. p. Eustach. Tab. 33. n. — β.
(*g*) Albin. Tab. 13. Fig. 6. q. q. Eustach. Tab. 33. n. — γ.
(*) Albin. Tab. 13. Fig. 6. f. g. h. i. Eustach. Tab. 33. n. — ζ. ε. δ.
(*h*) Albin. Tab. 13. Fig. 6. l. Eustach. Tab. 33. n. — ζ.
(*i*) Albin. Tab. 13. Fig. 6. m. Eustach. Tab. 33. n. — ε.
(*k*) Albin. Tab. 13. Fig. 6. n. Eustach. Tab. 33. n. — δ.
(*l*) Albin. Tab. 13. Fig. 6. k.
(*a*) Albin. Tab. Muscul. 13. Fig. 7. a. b. c. d. Eustach. Tab. 33. u.

quo pubis ossium synchondrosis a priore parte constricta (*b*); & a proxima pubis ossis parte (*c*). Pergit secundum lineam albam, paulatim crassior, in fine vero extenuatus, se in acutum verticem sensim angustat, & lato, tendineo, tenui extremo se innectit communi aponeurosi Obliqui interni & Transversi in linea alba (*d*).

Juvat Rectum.

REGIO XIII. CIRCA FUNEM SPERMATICUM AC TESTEM.

Solus in hac regione adest Cremaster (*a*).

CREMASTER (*a*).

Principium hujus abscedit ab Obliquo interno, & adjungit se funiculo vasorum spermaticorum (*b*); partim a Transverso, qui cum Obliquo interno confluere solet, producitur, & tenuem etiam partem quandoque ab ea parte imi marginis Obliqui externi, quæ est juxta os pubis, accipit

(*b*) Albin. Tab. 13. Fig. 7. a.
(*c*) Id. Tab. 13. Fig. 7. b.
(*d*) Id. Tab. 13. Fig. 7. d.
(*a*) Eustach. Tab. 32. r. utr. lat. & Tab. 33. w. x. utr. lat.
(*a*) Albin. Tab. Muscul. 13. Fig. 4. v. w. x. x. Eustach. Tab. 33. x.
(*b*) Albin. Tab. 13. Fig. 4. v. w. Eustach. Tab. 33. x. — α.

pit (*c*). Ad teſtem deſcendit, & dilatatus, funem magis complectitur, circum tunicam vaginalem teſtis ſe explicat, paulatim extenuatus (*d*).

Teſtem ſuſpenſum tenet, attollit, forte, in complexu venereo, comprimit.

REGIO XIV. INTER ABDOMEN THORACEMQUE.

Inter abdomen thoracemque magna parte ſui intergerinus muſculus eſt, Diaphragma (*a*), ſic ut peritonæo incumbat, pleuras cum pericardio ſuſtineat.

DIAPHRAGMA (*a*).

Procedit a priore parte lumborum ſceleti capitibus octo, quorum quatuor in dextra parte ſunt, totidemque in ſiniſtra, adſcendit intra thoracem, reflexumque pertingit ad imum ejus marginem.

Capita duo prima (*b*) (quorum ſiniſtrum dextro majus, & ad

(*c*) Euſtach. Tab. 33. w.
(*d*) Albin. Tab. 13. Fig. 4. x. x.
(*a*) Veſalius de Hum. corp. fabr. Lib. 2. Tab. 7. Δ. Cowper Myotom. ann. 1724. Tab. 34. 35. Senac Hiſt. de l'Acad. R. des Sciences ann. 1729. Pl. 10. pag 134.
(*a*) Albin. Tab. Muſcul. 14. Fig. 4. a. — u. Fig. 5. a. — z. α. — υ. Fig. 6 a. — z. α. — ω. A. — K. Fig. 7. a. — z. α. — ω. A. — F.
(*b*) Id. Tab. 14. Fig. 5. & 6. a. æ. b. c. d. a. æ. b. c. d.

& ad quæ extrinfecus accedit tenuitas tendinea (*c*), nascens è ligamentis, quæ per fuperficiem corporum vertebrarum lumborum infra ortum horum capitum excurrunt) craffis tendinibus (*d*), oriuntur ab inferiore parte corporis vertebræ lumborum tertiæ, & quidem a lateribus partis ejus prioris, alias a fuperiore parte corporis fecundæ (*e*); abeunt hi tendines ab exterioribus lateribus in carnes (*f*). Ad hæc capita a vicinis partibus, nunc his, nunc illis, principia quædam accedere folent (*g*). Capita fecunda (*h*) principio tendineo nafcuntur e ligamento, quod inter corpus tertiæ & quartæ lumborum intercedit (*i*), & in carnes abeunt (*k*). Capita tertia (*l*) principio tendineo oriuntur a lateribus fuperioris marginis corporis quartæ lumborum (*m*), & in carnes transeunt (*n*). Capita quarta (*o*) prin-

(*c*) Albin. Tab. 14. Fig. 5. & 6. æ. æ.
(*d*) Id. Tab. 14. Fig. 5. & 6. c. c.
(*e*) Id. Tab. 14. Fig. 5. & 6. b. b.
(*f*) Id Tab. 14. Fig. 5. & 6. d. d.
(*g*) Id. Hift. Mufcul. Lib. 3. pag. 297.
(*h*) Id. Tab. 14. Fig. 5. & 6. e. f. g. e. f. g.
(*i*) Id. Tab. 14. Fig. 5. & 6. e. f.
(*k*) Id. Tab. 14. Fig. 5. & 6. g. g.
(*l*) Id. Tab. 14. Fig. 5. & 6. h. i. k. h. i. k.
(*m*) Id. Tab. 14. Fig. 5. & 6. h. h. i. i.
(*n*) Id. Tab. 14. Fig. 5. & 6. k. k.
(*o*) Id. Tab. 14. Fig. 5. & 6. l. m. n.

principiis tendineis oriuntur a priore parte radicis processus transversi lumborum quartæ (*p*), & cito in carnem abeunt (*q*). Accedit aliquando principium e superficie Quadrati lumborum (*r*). Aliquando in uno, aliquando in utroque, latere portio invenitur, quæ inferiorem Diaphragmatis marginem facit, quæ oritur a processu transverso quartæ lumborum vertebræ (*s*), itemque a quintæ, primum tendinea (*t*), dein carnea (*u*), & adjungit se parti carneæ secundæ (*v*), post se cum ea conjungit (*w*), inseritque cartilagini costæ duodecimæ (*x*).

Capita omnia adscendunt, & sensim crassiora fiunt, præsertim intumescunt media. Hæc diu disjuncta, coëunt postea & sic, ut a capite primo sinistro portio accedat ad carneam partem primam dextram, posteaque excurrat per marginem dextrum foraminis, quo stomachus exit (*y*); & a capite primo dextro pars, pone præcedentem portionem incedens,

(*p*) Albin. Tab. 14. Fig. 5. & 6. l. m.
(*q*) Id. Tab. 14. Fig. 5. & 6. m.
(*r*) Id. Tab. 14. Fig. 5. & 6. o. o.
(*s*) Id. Tab. 14. Fig. 5. y. E.
(*t*) Id. Tab. 14. Fig. 5. x. Fig. 6. D.
(*u*) Id. Tab. 14. Fig. 5. z. Fig. 6. F.
(*v*) Id. Tab. 14. Fig. 5. v. Fig. 6. G. B.
(*w*) Id. Tab. 14. Fig. 5. α.
(*x*) Id. Tab. 14. Fig. 5. β. Fig. 6. H.
(*y*) Id. Tab. 14. Fig. 5. q.

dens, eam decuſſet, abeatque in carnem primam ſiniſtram (z). Per medium, quod inter capita hæc relinquitur, intervallum exit aörta, intrant radices ductus thoracici. Secunda cum primis confluunt. Inter prima & ſecunda elabuntur nervi intercoſtales, in ſiniſtro latere ſolus truncus primarius (alter enim pergit inter duo principia capitis ſiniſtri primi), in dextro uterque & vena azyga. Cum ſecundis confluunt tertia, cum tertiis quarta.

Ex omnibus conjunctis Diaphragma ſe diffundit in latitudinem, adſcendit in thoracis cavum, in priora, & in utrumque latus ſe curvat ad ambitum thoracis internum, ad quem curvato ductu ſe demittit, pergitque ſecundum eundem, donec in imo ejus deſinat. Ab inferiore hinc concavum (*a*), a ſuperiore gibbum eſt (*b*). Amplior & magis ſurſum in thoracem acta pars dextra eſt. Ubi thoracis ambitum attingit, abit in extrema tria (*c*), duo lateralia ampliſſima, mediumque anguſtius. Extremum carneum medium ad interiorem partem cartilaginis mucronatæ ferme extremæ deſinit (*d*). Extrema lateralia primum ſeſe peritonæo innectunt

(z) Albin. Tab. 14. Fig. 5. r.
(*a*) Id. Tab. 14. Fig 5. 6.
(*b*) Id. Tab. 14. Fig. 7. 4.
(*c*) Id. Tab. 14. Fig. 5. ε. η. θ.
(*d*) Id. Tab. 14. Fig. 5. ε. ζ. ζ.

tunt (*e*), tum vero inſerunt interiori parti cartilaginis coſtæ ſeptimæ (*f*), octavæ (*g*), cartilaginis & oſſeæ partis, nonæ (*h*), decimæ (*i*), undecimæ (*k*): ultimum hocce extremum pertinet partim ad ligamentum (*l*), quod fere a principio cartilaginis coſtæ undecimæ pertinet ad oſſeam partem decimæ, juxta cartilagineam; quemadmodum aliquando aliud adhuc adeſt, quod partim pertinet ad ſimile ligamentum (*m*), inter duodecimam & undecimam coſtam inveniendum, partim inferitur interiori parti coſtæ duodecimæ (*n*).

Quod Diaphragmatis inter cavum abdominis & thoracis intercedit, prope totum tendineum eſt, tendine per ambitum fere ovato in lateribus (*o*), ante in obtuſum mucronem exeunte (*p*), inde in poſteriorem partem ſenſim latiore, a poſteriore inſigniter lunato, in univerſum con-

(*e*) Albin. Tab. 14. Fig. 5. η. θ. ι. ι.
(*f*) Id. Tab. 14. Fig. 5. κ. κ. Fig. 4. b. b.
(*g*) Id. Tab. 14. Fig. 5. μ. μ. Fig. 4. c. c.
(*h*) Id. Tab. 14. Fig. 5. ξ. ξ. Fig. 4. d. e. f.
(*i*) Id. Tab. 14. Fig. 5. π. Fig 4. g. h. i.
(*k*) Id. Tab. 14. Fig. 5. σ. σ. Fig. 4. k. l. m.
(*l*) Id. Tab. 14. Fig. 4. k. l. w.
(*m*) Id. Tab. 14. Fig. 4. n. o. v̇.
(*n*) Id. Tab. 14. Fig. 4. n. o. p.
(*o*) Id. Tab. 14. Fig. 6. w. w. w. x. y. z. α. — λ. μ. μ. μ. — ω. Fig. 7. o. o o. — z. α. — ε. ζ. — ω. &c.
(*p*) Id. Tab. 14. Fig. 5. δ.

concavo ab inferiore parte, ſed diſtincto in duo, præcipue a lateribus, cava magna, oblonga, quorum dextrum amplius; in medio planiore, & ex transverſo etiam modice gibbo, & a dextra ad ſiniſtram aliquantum declivi.

Tendinea hæcce pars, orta ex carne, in quam, non admodum craſſam, capita abeunt, deſinit iterum in partes duas carneas laterales ſecundas (*q*), quæ lateri thoracis dicto modo inſeruntur, & occurrunt Transverſorum abdominis principiis, quibus pectinatim ſe aliquando interſerunt, ſæpe ex parte continuant.

Duo habet foramina, alterum in parte carnea (*r*), quo exit œſophagus; hoc juxta ſpinam, nonnihil a latere ſiniſtro, oblongum, fiſſuræ ſimile, medium patens, ab utroque extremo in angulum acutum anguſtatum, craſſiore carne cinctum, alterum in tendine (*s*), quo vena cava ex abdomine ad thoracem tranſit; hoc in dextra parte juxta medium, non longe a ſpina, magnum, quodammodo ovatum.

Fibrarum hujus muſculi decurſus in parte carnea quidem ſatis ſimplex videtur, ſed in tendinea admodum implicatus eſt

(*q*) Id. Tab. 14. Fig. 5. *n*. *θ*. Fig. 7. *γ*. *γ*. D. D. Fig. 6. *θ*. *θ*. B. B. Fig. 4. a.

(*r*) Id. Tab. 14. Fig. 5. s. Fig. 6. u. Fig. 7. n.

(*s*) Id. Tab. 14. Fig. 6. I. Fig. 7. C.

eſt (*t*); per eam latæ aponeuroſes quædam porriguntur (*u*), & circum foramina ſingulari etiam modo ſeſe habere ſolet. Nec in omni corpore idem eſt, ſed multæ & magnæ circa hunc decurſum ſæpe animadvertuntur varietates.

Firmat Diaphragma peritonæum, pleuras, pericardium, cum iis abdomen diſtinguens a thorace. Peritonæum contrahit, agitque deorſum, ac ſic conſtringit ab hac parte abdomen, agens abdominales muſculos extrorſum, deprimens viſcera. Trahit caro tendinem omni ex parte deorſum, hinc cavum thoracis augetur ad admittendum aërem in inſpiratione, maxime ab utroque latere, ubi poſiti pulmones ſunt. Oeſophagum conſtringit mox ſupra ventriculum.

REGIO XV. SUB PECTORE.

Et hac in Regione, præter Triangularem ſterni (*a*), nullus eſt.

TRIANGULARIS STERNI (*a*).

Oritur principiis tendineis ab interiore parte coſtæ tertiæ

(*t*) Inveſtigavit hunc exactisſime, & egregie deſcripſit Cl. Albinus Hiſt. Muſcul. Lib. 3. pag. 302. ſeq. Conf. Tab. 14. Fig. 4. 5. 6. & 7. ex quibus melius, quam ex brevi deſcriptione, intelligetur.

(*u*) Albin. Tab. 14. Fig. 7. p. &c. *n. n.* θ. &c. Fig. 6. z. a. &c. *v.* &c.

(*a*) Veſalius Epit. Fig. Muſc. v. Q. & de Hum. corp. fabr. Lib. 2. Tab. 8. β.

(*a*) Albin. Tab. Muſcul. 14. Fig. 1. a. — v.

tiæ (*b*), quartæ (*c*), quintæ (*d*), & quidem ab extrema oſſea parte & principio cartilagineæ. Caro ex conjunctione duorum capitum ſuperiorum nata, abit in partem tendineam (*e*), quæ in aliis conjuncta cum extremo tendineo capitis inferioris (*f*), in aliis ſeparata: inſeritur hæc interiori parti extremæ cartilaginis coſtæ quartæ (*g*), oſſis pectoris inter extrema cartilaginum coſtæ quartæ & quintæ (*h*), extremæ cartilaginis coſtæ quintæ (*i*), oſſis pectoris inter extrema cartilaginum coſtæ quintæ & ſextæ (*k*); extremæ cartilaginis coſtæ ſextæ (*l*), ſeptimæ (*m*). Abit caro capitis tertii in aliud extremum, inſertum margini oſſis cartilaginis mucronatæ (*n*). Porro inde continuo inſeritur reliquo margini oſſis illius, usque ad cartilaginem mucronatam, & illius cartilaginis margini (*o*).

Muſculus, Triangulari ſterni reſpondens, nonnunquam inven-

(*b*) Albin. Tab. 14. Fig. 1. a. b. c. d.
(*c*) Id. Tab. 14. Fig. 1. e. f. g. h.
(*d*) Id. Tab. 14. Fig. 1. i. k. l. m.
(*e*) Id. Tab. 14. Fig. 1. n. n.
(*f*) Id. Tab. 14. Fig. 1. u. u.
(*g*) Id. Tab. 14. Fig. 1. o.
(*h*) Id. Tab. 14. Fig. 1. p.
(*i*) Id. Tab. 14. Fig. 1. q.
(*k*) Id. Tab. 14. Fig. 1. r.
(*l*) Id. Tab. 14. Fig. 1. s.
(*m*) Id. Tab. 14. Fig. 1. t.
(*n*) Id. Tab. 14. Fig. 1. u. u. v.
(*o*) Id. Tab. 10. Fig. 24. v. w.

inventus eſt (*p*), ortus ab oſſea parte coſtæ ſecundæ, & a cartilaginea (*q*), & extremo tendineo inſertus cartilagini coſtæ tertiæ (*r*).

Illam coſtarum, a quibus oritur, partem, ubi in cartilaginem vertuntur, deprimit, trahitque introrſum.

REGIO XVI. LUMBI ET COXÆ PARS PRIOR.

Occupant hanc Regionem Pſoas parvus (*a*), Pſoas magnus (*b*), Quadratus lumborum (*c*), Iliacus internus (*d*).

PSOAS PARVUS (*a*).

Hic, aliquando abſens, adhæret principio tendineo imo margini corporis vertebræ dorſi imæ, a latere (*b*); itemque ligamento, inter corpus illud, corpusque ſummæ lumborum interjecto (*c*), & ſummo etiam margini ſummæ lumbo-

(*p*) Albin. Tab. 10. Fig. 24. x. y. z. α.
(*q*) Id. Tab. 10. Fig. 24. y. z.
(*r*) Id. Tab. 10. Fig. 24. α.
(*a*) Euſtach. Tab. 38. q.
(*b*) Id. Tab. 38. r. r. s.
(*c*) Id. Tab 38. p. dextr. Tab. 39. Fig. 1. n.
(*d*) Id. Tab. 38. u.
(*a*) Albin. Tab. Muſcul. 15. Fig. 14. a.—l. Euſtach. Tab. 38. q.
(*b*) Albin. Tab. 15. Fig. 14. a. b.
(*c*) Id. Tab. 15. Fig. 14. c.

borum (*d*); altero principio tendineo enascitur e corporis lumborum summæ vertebræ margine imo, ligamentoque proxime inferiori (*e*). Inchoat tendinem circa mediam lumborum longitudinem (*f*), qui se ad Psoam magnum inflectit (*g*), & lato fine inserit margini ossis coxæ, qui summam pelvis oram ante os ilium facit, juxta spinam, quam margo ille supra foramen magnum habet (*h*). Abscedit ab hoc tendine aponeurosis, quæ Psoam magnum simul cum Iliaco interno a priore parte, qua ante ischion delabuntur, ambit.

Lumbos, ut Psoas magnus, erigit, curvat; Pelvem in priora attollit; coërcet Psoam magnum & Iliacum internum, additque iis robur.

PSOAS MAGNUS (*a*).

Huic decem numero capita sunt; quinque oriuntur a corporibus vertebrarum, ligamentisque interjectis (*b*); horum primum oritur ab imo margine corporis vertebræ primæ dorsi,

(*d*) Albin. Tab. 15. Fig. 14. d.
(*e*) Id. Tab. 15. Fig 14. f. e.
(*f*) Id. Tab. 15. Fig. 14. g. Eustach. Tab. 38. q.—α.
(*g*) Id. Tab. 15. Fig 14. h.
(*h*) Id. Tab. 15. Fig. 14. i.
(*a*) Albin. Tab. Muscul. 21. Fig. 12. a.—n. Fig. 13. a.—y. Fig. 15. b. Eustach. Tab. 38. r. r. s.
(*b*) Albin. Tab. 21. Fig. 12. a. b. c. d. e. f. g. h. i. k. l. Fig. 13. a. d. g. k. n.

ſi, a ligamento, quod inter corpus illud corpusque quintæ lumborum intercedit, & a proxima ſuperiore parte corporis illius quintæ (c); ſecundum ab imo margine corporis vertebræ quintæ lumborum, a ligamento, quod inter corpus illud & corpus quartæ intercedit, & a proxima ſuperiore parte corporis quartæ (d); eodem modo tertium a quarta & tertia, quartum a tertia & ſecunda, quintum a ſecunda & prima, & a ligamentis mediis (e): quinque procedunt a priore & eadem inferiore parte proceſſuum transverſorum vertebrarum lumborum, quintæ, quartæ, tertiæ, ſecundæ, primæ (f). Ex tot principiis natus Pſoas magnus, ſe ſecundum lumbos demittit ad priorem iſchii, quæ juxta ilium eſt, delabens per ſinum ejus, donec ſe tendine, quem inchoat ab ea parte, qua contingit Iliacum internum, qui ſe exteriori parti Pſoæ magni adjungit, quem tendinem cum eo communem habet, inſerat extremo & priori parti trochanteris minoris, eum quaſi comprehendens (g). Cum Iliaco adhæret etiam capſæ, articulum coxæ continenti.

Attollit femur in priora, coxam deprimit; ſimul femur per

(c) Albin. Tab. 21. Fig. 12. a. b. c. Fig. 13. a. b. c.
(d) Id. Tab. 21. Fig. 12. d. e. Fig. 13. d. e. f.
(e) Id. Tab. 21. Fig. 12. f. g., h. i., k. l. Fig. 13. g. h. i., k. l. m., n. o. p.
(f) Id. Tab. 21. Fig. 13. q. s. s. u. w. y.
(g) Id. Tab. 21. Fig. 15. b. c. c.

per exteriorem partem retrorſum rotat; coxam per priorem introrſum, ſi eam, dum firmatum femur, moveat. Lumbos quoque in priora ſimul & in latus curvat, retrorſum curvatos erigit.

QUADRATUS LUMBORUM (*a*).

Conſtat e duabus ſeriebus fibrarum, quarum una & præcipua oritur principio tendineo a ſuperiore & eadem interiore parte criſtæ oſſis ilium, mox a poſteriore mediæ longitudinis ejus (*b*), & a ligamento, quod a proceſſu transverſo vertebræ lumborum imæ ad os ilium ex transverſo pertinet (*c*). Vertitur ſic orta hæc fibrarum ſeries in ventrem tumidulum, oblique verſus ſpinam adſcendentem, & abit dein in portiones tendinoſas, quæ ſenſim anguſtiores & exiliores inſeruntur imæ parti extremorum proceſſuum transverſorum vertebrarum lumborum, ſecundæ (*d*), tertiæ (*e*), quartæ (*f*), quintæ (*g*). Pars hæcce præterea extremo tendi-

(*a*) Albin. Tab. Muſcul. 15. Fig. 12. a. a. b. c. c. d. e. Fig. 13. a. b. c. d. e. f. g. h. i. k. l. m. n. Euſtach. Tab. 38. p. dextr. & Tab. 39. n.

(*b*) Albin. Tab. Muſcul. 15. Fig. 12. a. a. Euſtach. Tab. 39. n. — α. Tab. 38. p. — α. α. dextr.

(*c*) Albin. Tab. 15. Fig. 12. b. Fig. 13. a.

(*d*) Id. Tab. 15. Fig. 13. b. c.

(*e*) Id. Tab. 15. Fig. 13. d. e.

(*f*) Id. Tab. 15. Fig. 13. f. g.

(*g*) Id. Tab. 15. Fig. 13. h. i.

dineo lato pertingit ad interiorem partem marginis inferioris costæ duodecimæ, non longe a capite ejus primo (*h*), alioque se inserit lateri corporis vertebræ dorsi imæ, juxta costam imam (*i*). Altera series oritur distinctis capitibus a superiore parte extremorum processuum transversorum vertebrarum lumborum secundæ (*k*), tertiæ (*l*), quartæ (*m*), quintæ (*n*). Capita hæc decurrunt ante partes, quæ insertæ processibus transversis, oblique in latus adscendunt, & ad priorem seriem se adjungunt.

Lumbos curvat in latus, coxam attollit, deprimit costas, ad quas pertinet.

ILIACUS INTERNUS (*a*).

Incipit a posteriore parte processus transversi vertebræ primæ lumborum (*b*); a ligamento, quod a processu transverso primæ lumborum ad proximam partem cristæ ilium pertinet (*c*); ab interna amplitudine ossis ilium, mox infra cri-

(*h*) Albin. Tab. 15. Fig. 12. c. c. Eustach. Tab. 38. p. — β. β. dextr. Tab. 39. n. — β.
(*i*) Albin. Tab. 15. Fig. 12. d e.
(*k*) Id. Tab. 15. Fig. 13. k
(*l*) Id. Tab. 15. Fig. 13. l.
(*m*) Id. Tab. 15. Fig. 13. m.
(*n*) Id. Tab. 15. Fig. 13. n.
(*a*) Albin. Tab. Muscul. 21. Fig. 14. a. — k. Fig. 15. a. Eustach. Tab. 38. u.
(*b*) Albin. Tab. 21. Fig. 14. a.
(*c*) Id. Tab. 21. Fig. 14. b. k.

criftam (*d*), a cujus porro amplitudinis parte fuperiore tota oriri pergit, ubi crifta a priore parte definit (*e*); præterea oritur ab ora priore offis ilium, ac deinde ab ambitu interno, ac porro ab inferiore parte radicis tuberculi, quod ex eadem illa ora eminet, atque etiam a vicina parte capfæ, articulum coxæ continentis. Tanta ipfi amplitudo, quanta offis ilium ante facrum; paulatim fe anguftat, cum ad ifchion venit, per finum ejus fub aponeurofi Pfoæ parvi cum magno defcendit, &, formam teretem adfumens, conjungit fe cum Pfoa magno, partem tendinis communis efficit (*g*), qui dicto modo fe inferit (*h*).

Eadem hujus actio, quæ Pfoæ magni, nifi quod lumbos non flectat, & paulo etiam magis femur illa fui parte, quæ eft a latere Pfoæ vertat, coxamque magis introrfum deprimat.

Ubi Iliacus cum Pfoa magno fe demittit ab Ifchio ad femur, burfa vel vefica eft, nullibi patens, a pofteriore parte adhærens finui ifchii, partibusque vicinis, intus humorem lubricantem continens, motum dictorum mufculorum faciliorem reddens (*i*).

R E-

(*d*) Albin. Tab. 21. Fig. 14. c. c. d. Euftach. Tab. 38. u. — α. α.
(*e*) Albin. Tab. 21. Fig. 14. infra d.
(*f*) Id. Tab. 21. Fig. 14. f. f.
(*g*) Id. Tab. 21. Fig. 14. i.
(*h*) Id. Tab. 21. Fig. 15. a. b.
(*i*) Conf. Albin. Hift. Mufcul. Lib. 3. pag. 319. 320.

REGIO XVII. CIRCA PERINÆUM VIRI.

Accelerator (a) & Erector penis (b), perinæum viri occupant.

ACCELERATOR (a).

Oritur parte sua posteriore a ligamento duriusculo, (quod a superiore parte urethræ, priusquam illa a vesica procedens penem subeat, decurrit ad penem, toto decursu adhærens urethræ superiori parti, eamque peni alligans) atque adeo juxta superiorem partem lateris urethræ; continuoque inde tractu ab inferiore parte capitis, quo corpus spongiosum majus incipit, & ab inferiore corporis ipsius, cum id jam procedit per penem (b). Amplectitur cum pari sui bulbum urethræ, qua is eminet, conjungit dein alter se cum altero (c), per mediam bulbi longitudinem: & ubi conjungunt se fibræ angulos faciunt, posteriores quidem vix, prope è directo convenientes; sequentes, ut ab his longius distant, minores. Fit sic vagina quædam musculosa, quæ

(a) Vesalius de hum. corp. fabr. Lib. 2. Tab. Cap. 49. Fig. 1. H. I.
(b) Id. Lib. 2. Tab. Cap. 49. Fig. 1. K. L.
(a) Albin. Tab. Muscul. 12. Fig. 37. a. a. b. c. c.
(b) Id. Tab. 12. Fig. 37. c c.
(c) Id. Tab. 12. Fig. 37. b.

quæ ſua poſteriore parte innixa Sphincteri ani externo, bulbum urethræ continet, comprimit. Tendit itaque totum illud corpus in erectione penis, comprimit partem illam urethræ, ac per eam fluentem urinam; rigido maxime pene, ſemen ejicit, præſertim cum contracto ſimul Sphinctere externo pars ejus poſterior firmatur.

ERECTOR PENIS (*a*).

Principium hujus tendineum oritur ab interiore parte tuberis iſchii, paulo antequam id in os pubis abeat (*b*), comitatur caput corporis ſpongioſi majoris, & extremo tendineo ipſi inſeritur ultra caput (*c*); cæterum ſe etiam capiti, qua id pubis oſſi non adjacet, inſerit, fere a capitis illius principio.

Trahit dictum caput deorſum & retrorſum, & modice in latus; idem facit brevius, premitque; corpus ſpongioſum, ſanguine turgidum, magis tendit, ad erigendum & rigidum efficiendum penem.

G E-

(*a*) Albin. Tab. Muſcul. 12. Fig. 37. k. l. m. k. l. m. Fig. 40. a. b. b.
(*b*) Id. Tab. 12. Fig. 40. a. b. b.
(*c*) Id. Tab. 12. Fig. 37. l. m. m.

GENITALIS MULIEBRIS AMBITUS.

Hoc in ambitu dantur Conſtrictor cunni (a), & Erector clitoridis (b).

CONSTRICTOR CUNNI (a).

Oritur in latere poſterioris partis cunni, ab ejus corporis ſpongioſi initio, accipiens faſciculum a proxima Sphincteris ani externi parte. Per latus introitus cunni, poſteaque pone nympham, adſcendit ad clitoridem, cujus cruri & finitimæ corporis parti ſe inſerit.

Cunnum contrahit, premit, comprimit, ejus corpus ſpongioſum tendit, cum turget, ſtimulante venere.

ERECTOR CLITORIDIS (a).

Reſpondet Erectori penis, inſertus capiti corporis ſpongioſi clitoridis, eundemque uſum præſtans.

R E-

(a) Euſtach. Tab. 14. Fig. 1. m.

(b) Id. Tab. 14. Fig. 1. n.

(a) Euſtach. Tab. 14. Fig. 1. m. De Graaf de mulier. organis Tab. 3. Fig. 2. E. E. Tab. 12. m. m. n. n. Cowper Myotomia ann. 1724. Tab. 18. n. 11. Santorin. Tab. 11. Fig. 1. G.

(a) Euſtach. Tab. 14. Fig. 1. N. De Graaf de mul. org. Tab. 11. i. k. Tab. 3. Fig. 1. G. H. Fig. 2. C. Bidloo Tab. 51. Fig. 1. E. Cowper Myotom. 1724. Tab. 18. n. 10. Santorin. Tab. 11. Fig. 1. E.

REGIO XVIII. CIRCUM ANUM.

Sphincter externus ani (*a*), Transversus perinæi (*b*), Transversus alter perinæi (*c*), Levator ani (*d*), Coccygeus (*e*), Sphincter internus ani (*f*), in regione circum anum inveniuntur.

SPHINCTER EXTERNUS ANI (*a*).

In viro mucro posterior adhæret coccygi extremo (*b*), unde fibræ, ad anum usque (*c*), ex utroque latere convenientes, angulos efficiunt deorsum patulos, superiores acutos, sequentes, ut sequuntur, majores (*d*); abit porro in caudam, quæ ad postremum evanescit in perinæo (*e*). Supra caudam hanc exit in mucronem quasi triangularem, qui se-

(*a*) In viro Eustach. Tab. 29. c. Tab. 36. r. in fœmina Eustach. Tab. 14. Fig. 1. K.
(*b*) In viro Santorin. Tab. 3. Fig. 5. I. in fœmina Tab. 2. Fig. 1. g.
(*c*) In viro Santorin. Tab. 3. Fig. 5. H. in fœmina Tab. 2. Fig. 1. F.
(*d*) In viro Eustach. Tab. 37. r. in fœmina Santorin. Tab. 2. Fig. 1. M.
(*e*) Eustach. Tab. 36. f.
(*f*) Eustach. Tab. 10. Fig. 2.
(*a*) In viro Albin. Tab. Muscul. 12. Fig. 35. a. b. Fig. 36. a. b. c. c. Eustach. Tab. 36. r. In fœmina. Eustach. Tab. 34. I. K.
(*b*) Albin. Tab. 12. Fig. 35. a. Eustach. Tab. 36. r. — α.
(*c*) Albin. Tab. 12. Fig. 35. b.
(*d*) Id. Tab. 12. Fig. 36. a.
(*e*) Id. Tab. 12. Fig. 36. b. Eustach. Tab. 37. q.

se innectit inferiori parti Acceleratorum, qua illi coëunt inter se (*f*).

Cutem, quæ est circa anum, ipsumque anum contrahit; perinæum suo priore mucrone trahit retrorsum, firmat Acceleratores, premit eosdem, ac partem urethræ, quæ per perinæum incedit, juvat seminis & urinæ ejectionem.

In fœmina (*g*) anum a priore parte in perinæo rotundiore ambitu circumit, implet totum illud spatium, quod inter anum & cunni ostium interjacet, portiones dat Constrictoribus cunni, in mucronem dein abit, evanidum in perinæo, aut circa illud.

TRANSVERSUS PERINÆI (*a*).

Oritur ab interiore parte tuberis ischii exilis hicce musculus (*b*), per perinæum adscendit, magis tamen transversus, & in extremum definit, quod partim adjungit Acceleratori, partim Sphincteri ani externo, & quod pari etiam sui continuari solet (*c*).

Ambo anum una cum finitimo perinæo trahunt retrorsum, aliquantum comprimunt ut & extremum intestini recti,

(*f*) Albin. Tab. 12. Fig. 36. c. c.
(*g*) Eustach. Tab. 14. Fig. 1. K.
(*a*) Albin. Tab. Muscul. 12. Fig. 37. d. e. Fig. 38. a.
(*b*) Id. Tab. 12. Fig. 38. a.
(*c*) Id. Tab. 12. Fig. 37. e.

cti, juvantque excrementorum, cum elapfura funt, expresfionem.

TRANSVERSUS ALTER PERINÆI (a).

Interna pars offis pubis, circa locum, qui medius inter ima tuberis ifchii, pubisque fynchondrofem, originem huic præbet (b); incedit per perinæum, & fe extremo fuo ad Erectorem penis inflectens, inter eum & Acceleratorem pertinet in angulum, in quem caput penis cum bulbo urethræ coït (c).

Premit priorem inteftini recti extremi partem, eam retrorfum agit una cum urethræ parte proxima.

LEVATOR ANI (a).

Ani Levatores quamdam infundibuli formam referunt, unamque, præter portiones, coxygi affixas, fimul tæniam efficiunt, quæ, circum inteftinum rectum imprimis ducta, extremis fuis pelvis lateribus, angulis penis & bulbo urethræ, affixa; inque ambitu ejus, præter inteftinum re-

(a) Albin. Tab. Mufcul. 12. Fig. 37. f. i. Fig. 39. a.
(b) Id. Tab. 12. Fig. 39. a.
(c) Id. Tab. 12. Fig. 37. i.
(a) In viro Albin. Tab. Mufcul. 12. Fig. 31. a. a.—k. Fig. 32. a.—g. a.—g. Fig. 33. a.—k. Fig. 34. a.—k. Euftach. Tab. 37. r.

rectum, etiam inferiora veſicæ cum veſiculis ſeminalibus & proſtata, ac vagina, in fœmina, continentur.

Oritur quisque ab interiore parte oſſis pubis circa inferiora ſynchondroſis (*b*), indeque parte carnea (*c*), & tendinea (*d*), per ſuperiora retrorſum circum principium Obturatoris interni, usque ad acutum iſchii proceſſum extremum (*e*). Inſerit ſe priori margini coccygis oſſium ultimi & penultimi (*f*); alter præterea alteri ſe, partim extremo tendineo partim carne, mox infra coccygem continuat, fibris in ipſo coitu angulos facientibus deorſum patulos (*g*). Pars tenuis venit ex angulo, in quem caput penis cum corpore ſpongioſo urethræ coït, porroque à latere ſuperioris partis bulbi urethræ (*h*).

Dexter & ſiniſter una agentes poſteriorem extremi recti partem trahunt in priora ſimulque modice ſurſum; conſtrin-

gunt

(*b*) Albin. Tab. 12. Fig. 31. b. c. d. Fig. 32. a. b c. Fig. 33. b. c. d. Fig. 34. b. c. d.

(*c*) Id. Tab. 12. Fig. 31. b. c. Fig. 32. a. b. Fig. 33. b. c. Fig. 34. b. c.

(*d*) Id. Tab. 12. Fig. 31. c. d. Fig. 32. c. Fig. 33. c. d. Fig. 34 c. d.

(*e*) Id. Tab. 12. Fig. 31. f. Fig. 33. e. Fig. 34. e. Euſtach. Tab. 37. r. — α.

(*f*) Albin. Tab. 12. Fig. 31. h. Fig. 33. g. Fig. 34. g. h. Euſtach. Tab. 37. r.

(*g*) Albin. Tab. 12. Fig. 31. i. k. Fig. 33. i. k. Fig. 34. i. k.

(*h*) Id. Tab. 12. Fig. 32. e. Fig. 33. f. Fig. 34. f.

gunt ſimul, excrementaque, per inteſtinum illud deorſum acta, exprimunt; eademque opera ipſum rectum retinent, idemque, expreſſis excrementis, attollunt, reſtituunt.

In fœmina paulo aliter ſeſe habet (*i*).

COCCYGEUS (*a*).

Incipit principio tendineo ab apice proceſſus acuti iſchii (*b*), & ab interiore parte proceſſus ejusdem (*c*), ſeſeque ſimili extremo inſerit interiori parti marginis oſſis ſacri juxta coccygem (*d*), coccygis oſſis primi (*e*), ſecundi (*f*), tertii (*g*), & continuat ſe etiam ligamento (*h*), quod intercedit inter os ſacrum & coccygis os primum, & quod inter coccygis os primum & ſecundum (*i*), & quod inter ſecundum & tertium (*k*).

Coc-

(*i*) Conf. Albin. Hiſt. Muſcul. Lib. 3. pag. 333.

(*a*) Albin. Tab. Muſcul. 17. Fig. 7. a. b. c. Fig. 8. a. — k. Euſtach. Tab. 36. ſ.

(*b*) Albin. Tab. 17. Fig. 7. a. b. Euſtach. Tab. 36. ſ. — α.

(*c*) Albin. Tab. 17. Fig. 7. c. Fig. 8. a. b.

(*d*) Id. Tab. 17. Fig. 8. c. d. Euſtach. Tab. 36. ſ. — β.

(*e*) Albin. Tab. 17. Fig. 8. e. Euſtach. Tab. 36. ſ. — γ.

(*f*) Albin. Tab. 17. Fig. 8[illegible]

(*g*) Id. Tab. 17. Fig. 8. g.

(*h*) Id. Tab. 17. Fig. 8. h.

(*i*) Id. Tab. 17. Fig. 8. i.

(*k*) Id. Tab. 17. Fig. 8. k.

Coccygem retinet, & in priora flectit, ischii processum versus; retrorsus actum restituit. Alligat imam sacri partem ad coccygem; ac retinet. Intestinum rectum, cum valde distentum, premit, reprimit.

SPHINCTER INTERNUS ANI (*a*).

Annulus carneus est, crassus satis, atque valens, quem natura intestino recto induit, proxime anum; quique anum contrahit & constringit.

REGIO XIX. DORSUM CUM LUMBORUM POSTERIORE PARTE ET CERVICE.

Dorsum, lumborum partem posteriorem & cervicem, occupant Cucullaris (*a*), Latissimus dorsi (*b*), Rhomboïdeus major (*c*), Rhomboïdeus minor (*d*), Serratus posticus superior (*e*), Serratus posticus inferior (*f*), Levator scapu-

læ

(*a*) Albin. Tab. Muscul. 12. Fig. 31. l. l. Fig. 32. l. Eustach. Tab. 10. Fig. 2.

(*a*) Eustach. Tab. 28. c. Tab. 29. P. Tab. 31. M. utr. lat. Tab. 32. E. utr. lat. Tab. 34. D.

(*b*) Id. Tab. 29. R. Tab. 30. E. Tab. 31. S. Tab. 32. L. Tab. 34. G.

(*c*) Id. Tab. 29. O. Tab. 34. F.

(*d*) Id. Tab. 29. N. Tab. 34. E.

(*e*) Id. Tab. 29. M. Tab. 36. e.

(*f*) Id. Tab. 36. g. h.

læ (*g*), Splenius capitis (*h*), Splenius colli (*i*), Biventer cervicis (*k*), Complexus (*l*), Trachelomaſtoïdeus (*m*), Transverſalis cervicis (*n*), Cervicalis deſcendens (†), Sacrolumbalis (*o*), Longiſſimus dorſi (*p*), Spinalis dorſi (*q*), Semiſpinalis dorſi (*r*), Spinalis cervicis (*s*), Interſpinales cervicis (*t*), Rectus poſticus major capitis (*u*), Rectus poſticus minor capitis (*w*), Obliquus inferior capitis (*x*), Obliquus ſuperior capitis (*y*), Multifidus ſpinæ (*z*), Interſpinales lumborum (*a*), Interſpinales dorſi (*b*), Intertrans-
ver-

(*g*) Euſtach. Tab. 29. L. Tab. 36. d.
(*h*) Id. Tab. 29. I. dextr. Tab. 36. c.
(*i*) Id. Tab. 37. c.
(*k*) Albin. Tab. Muſcul. 16. Fig. 23. a.—p. Fig. 24. a.—g.
(*l*) Id. Tab. 16. Fig. 33. q.—x. Fig. 24. h.—x.
(*m*) Euſtach. Tab. 37. b. utr. lat. Tab. 39. h.
(*n*) Id. Tab. 37. d.
(†) Albin. Tab. Muſcul. 15. Fig. 3. A.—E. Fig. 4. t.—z. a.—ß.
(*o*) Euſtach. Tab. 36. l.—δ. Tab. 37. h.
(*p*) Id. Tab. 36. l.—γ.
(*q*) Id. Tab. 37. l. utr. lat.
(*r*) Albin. Tab. Muſcul. 15. Fig. 8. a.—q.
(*s*) Euſtach. Tab. 39. Fig. 1. f.
(*t*) Albin. Tab. Muſcul. 16. Fig. 2. a.—k. Fig. 3. a.—g.
(*u*) Euſtach. Tab. 39. Fig. 1. b.
(*w*) Id. Tab. 39. Fig. 1. a.
(*x*) Id. Tab. 89. Fig. 1. d.
(*y*) Id. Tab. 39. Fig. 1. c.
(*z*) Id. Tab. 39. Fig. 1. m. m. utr. lat. in cervice.
(*a*) Albin. Tab. Muſcul. 15. Fig. 11.
(*b*) Albin. ibid.

verſarii lumborum (c), Intertransverſarii dorſi (d), Levatores coſtarum breviores (e), Levatores coſtarum longiores (f).

CUCULLARIS (a).

Oritur principio tendineo a media craſſa oſſis occipitis parte, eique finitima laterali (b); in nucha cum pari ſui cohæret (c), & cum eo abſcedit a ligamento cervicis (d); porro procedit a ſpinis duarum inferiorum colli vertebrarum, omniumque dorſi, poſteriorem earum partem complectens (e). In ſpinarum intervallis cum Cucullari ſiniſtro cohæret. Carnis fibræ ſuperiores deſcendunt oblique in priora ad claviculam; inferiores adſcendunt ad ſpinam ſcapulæ; quæ a confinio dorſi & cervicis, transverſæ ſunt, quibus quo tum ſuperiores, tum inferiores propiores, eo etiam magis ſunt decurſu ſimiles (f). Juxta imam cervicem, ſummum.

(c) Albin. Tab. 15. Fig. 10.
(d) Id. Tab. 15. Fig. 9.
(e) Id. Tab. 17. Fig. 14. a. c.
(f) Id. Tab. 17. Fig. 15. a. — d.
(a) Albin. Tab. Muſcul. 17. Fig. 18. a. — m. Fig. 19. a. a. Euſtach. Tab. 34. D. Tab. 29. P. Tab. 28. C.
(b) Albin. Tab. 17. Fig. 18. a. b. b. c. Euſtach. Tab. 34. D. — α.
(c) Albin. Tab. 17. Fig. 18. à c. ad c.
(d) Id. Tab. 17. Fig. 18. à c. ad d.
(e) Id. Tab. 17. Fig. 18. à d. ad e.
(f) Id. Tab. 17. Fig. 18. m. m.

mumque dorſum plaga tendinea amplior eſt (*g*), ſimilisque in imo angulo (*h*). Deſinit ad partem ſuperiorem & poſteriorem claviculæ longitudinis dimidiæ illius, quæ juxta ſcapulæ proceſſum ſuperiorem eſt (*i*); ad ſpinam ſcapulæ non longe a baſi (*k*), ad exteriorem partem marginis ſuperioris ſpinæ ſcapulæ, & proceſſus ſuperioris (*l*).

Diverſis partibus ſui, diverſimode movet ſcapulam & claviculam, easque vel ad caput retrorſum attollit, vel recta retrorſum trahit, vel deprimit, cum fibrarum decurſus alius atque alius eſt; quando ſe totus contrahit, agit retrorſus.

LATISSIMUS DORSI (*a*).

Peramplus hic oritur ab extremis ſpinis vertebrarum dorſi ſex inferiorum, ſpinis vertebrarum lumborum & oſſis Sacri (*b*), a proceſſibus obliquis, qui ſunt a latere hiatus oſſis ſacri, in quem ſpinæ canalis exit (*c*); inde verſus latus rece-

(*g*) Albin. Tab. 17. Fig. 18. f. Euſtach. Tab. 29. P. Tab. 34. D. -- ε.
(*h*) Albin. Tab. 17. Fig. 18. g. Euſtach. Tab. 34. D. — δ. Tab. 29. P.
(*i*) Albin. Tab. 17. Fig. 19. a. a. Euſtach. Tab. 28. C.
(*k*) Albin. Tab. 17. Fig. 18. h. Euſtach. Tab. 34. D. — θ. η.
(*l*) Albin. Tab. 17. Fig. 18. k. k. i. l.
(*a*) Albin. Tab. Muſcul. 18. Fig. 1. a. a. — l. Fig. 2. a. a. — k. Fig. 3. a. — h. Euſtach. Tab. 34. G. Tab. 29. R. Tab. 32. L. Tab. 31. S. Tab. 30. E.
(*b*) Albin. Tab. 18. Fig. 2. b. b. Euſtach. Tab. 34. G.
(*c*) Albin. Tab. 18. Fig. 2. c. d. Euſtach. Tab. 34. G.

recedens cohæret cum principio Glutei magni (*d*), pergitque oriri ab exteriore margine partis mediæ cristæ ilium (*e*), ab exteriore parte costarum, duodecimæ, undecimæ (*f*), decimæ (*g*), nonæ (*h*). Ad humeri ossis superiorem partem procedit, &, ad Teretem majorem se inflectens (*i*), abit in tendinem (*k*), insertum, aliquantum infra capitis superioris ossis humeri tuber inæquale minus (*l*), priori parti eminentiæ, quæ sinum ossis humeri, per quem descendit tendo Bicipitis brachii, a posteriore parte terminat (*m*); & in ipsum sinum excurrens, occurrit Pectoralis tendini, eique se ex parte continuat. In decursu suo inferiorem scapulæ angulum complectitur (*n*), & ibi aliquando fasciculum carneum ab ejus posteriore & inferiore parte accipit. Inter extremos & hujus & Teretis majoris tendines bursa tenuis, parva, est, utrique pertinacissime accreta. In axilla ab inferiore parte tendinis Latissimi procedit aponeurosis ad vagi-

(*d*) Albin. Tab. 18. Fig. 2. d. e. Fig. 1. c. d.
(*e*) Id. Tab. 18. Fig. 2. e. f. Eustach. Tab. 34. G. — ζ. *n*.
(*f*) Albin. Tab. 18. Fig. 1. f.
(*g*) Id. Tab. 18. Fig. 1. g. Fig. 3. a.
(*h*) Id. Tab. 18. Fig. 1. h. Fig. 3. b. Eustach. Tab. 31. T. T. T.
(*i*) Albin. Tab. 18. Fig. 1. i. Fig. 2. h. Eustach. Tab. 34. G. — θ.
(*k*) Albin. Tab. 18. Fig. 3. f.
(*l*) Id. Tab. 18. Fig. 3. g. g.
(*m*) Id. Tab. 18. Fig. 3. h. h. Eustach. Tab. 33. n. 35.
(*n*) Eustach. Tab. 34. G.

vaginam tendineam, quæ post integumenta brachium ambit. Pars præterea tendinea, a radice tuberis minoris capitis humeri oriens, descendit per priorem partem tendinis Latissimi, ubi is se inserit, firmiter ei adnectitur, & infra Latissimi tendinem per priora tendinis Teretis majoris excurrit.

Os humeri trahit deorsum post tergum; idem cum sublatum, deprimit; humerum, scapulam, claviculam, trahit deorsum in posteriora, imprimis parte sua inferiore.

RHOMBOIDEUS MAJOR (*a*).

Incipit tendineo principio a latere extremi mucronis spinæ vertebræ colli primæ (*b*), dorsi duodecimæ (*c*) undecimæ (*d*), decimæ (*e*), nonæ (*f*), & in intervallis illarum spinarum cohæret cum musculis proximis. In latus ad scapulæ basem oblique descendit, secundum eam se curvat (*g*), & extremum basi scapulæ inserit usque ad angulum inferiorem (*h*).

Sca-

(*a*) Albin. Tab. Muscul. 17. Fig. 24. a. — k. Eustach. Tab. 34. F. Tab. 29. O.
(*b*) Albin. Tab. 17. Fig. 24. b.
(*c*) Id. Tab. 17. Fig. 24. c.
(*d*) Id. Tab. 17. Fig. 24. d.
(*e*) Id. Tab. 17. Fig. 24. e.
(*f*) Id. Tab. 17. Fig. 24. f. Eustach. Tab. 34. F. — α. β.
(*g*) Albin. Tab. 17. Fig. 24. h. i.
(*h*) Id. Tab. 17. Fig. 24. i. k. Eustach. Tab. 34. F. — γ. δ.

Scapulæ baſem oblique retrorſum ſimulque ſurſum trahit, quo etiam vertit ſcapulam, ſic ut angulus eat retrorſum, ſurſumque, cervix aliquantum in priora deorſum.

RHOMBOIDEUS MINOR (a).

Oritur a ligamento cervicis, juxta ſpinas trium primarum colli vertebrarum (b); ad ſcapulam deſcendens extremum ſuum inſerit illi parti baſis, quæ eſt juxta naſcentem ſpinam, ubi angulum baſis cum ora ſuperiore efficit (c).

Actio ferme eadem, quæ majoris.

SERRATUS POSTICUS SUPERIOR (a).

Incipit a ligamento cervicis circa tertiam ſecundamque colli a dorſo ſpinam (b); a ſpina primæ colli (c), duodecimæ dorſi (d), undecimæ (e), & in ſpinarum illarum intervallis cum proximis muſculis cohæret (f). In latus procedit,

(a) Albin. Tab. Muſcul. 17. Fig. 23. a. b. b. c. c. Euſtach. Tab. 34. E. Tab. 29. N.
(b) Albin. Tab. 17. Fig. 23. a. Euſtach. Tab. 34. E. — α.
(c) Albin. Tab. 17. Fig. 23. c. c. Euſtach. Tab. 34. E. — β.
(a) Albin. Tab. Muſcul. 17. Fig. 16. a. — p. Euſtach. Tab. 36. e.
(b) Albin. Tab. 17. Fig. 16. a. b. b. Euſtach. Tab. 36. e. — α. β.
(c) Albin. Tab. 17. Fig. 16. c. Euſtach. Tab. 36. e. — γ. δ.
(d) Albin. Tab. 17. Fig. 16. d.
(e) Id. Tab. 17. Fig. 16. e.
(f) Id. Tab. 17. Fig. 16. f. g.

cedit, defcendens, & latefcens, finditque fe in quatuor extrema, quæ inferuntur coftæ fecundæ (*g*), tertiæ (*h*), quartæ (*i*), quintæ (*k*), ubi hæ primum in priora fe incipiunt curvare, ibique fecundum fuperiorem marginem earum ab exteriore parte.

Coftas attollit, fubjectos mufculos, quos ambit, continet, firmat.

SERRATUS POSTICUS INFERIOR (a).

Pars tendinea hujus oritur cum Latiffimo dorfi a fpina dorfi vertebræ tertiæ (*b*), fecundæ (*c*), primæ (*d*), lumborum quintæ (*e*), quartæ (*f*), tertiæ (*g*), & in intervallis fpinarum illarum cohæret cum proximis mufculis (*h*). Huic fimilis aponeurofis incedit a proceffibus transverfis vertebrarum lumborum, hæc ad priorem accedit. Continent

(*g*) Albin. Tab. 17. Fig. 16. h. m.
(*h*) Id. Tab. 17. Fig. 16. i. n.
(*i*) Id. Tab. 17. Fig. 16. k. o.
(*k*) Id. Tab. 17. Fig. 16. l. p.
(*a*) Albin. Tab. Mufcul. 17. Fig. 17. a. -- t. Euftach. Tab. 36. g. h.
(*b*) Albin. Tab. 17. Fig. 17. a. b.
(*c*) Id. Tab. 17. Fig. 17. c.
(*d*) Id. Tab. 17. Fig. 17. d.
(*e*) Id. Tab. 17. Fig. 17. e.
(*f*) Id. Tab. 17. Fig. 17. f.
(*g*) Id. Tab. 17. Fig. 17. g.
(*h*) Id. Tab. 17. Fig. 17. h. i. k. l. m. Euftach. Tab. 36. g.

nent ambo caput commune Longiſſimi dorſi & Sacrolumbalis, deſinuntque in unam aponeuroſem, quæ originem præbet huic Serrato (*i*) & Obliquo interno abdominis (*k*). Serratus hic leviter adſcendit in latus, finditque ſe in portiones quatuor, quarum prima, reliquis major, inſeritur coſtæ nonæ, exteriori parti marginis ejus inferioris, fere ubi ſe a dorſo per latus in priora curvat (*l*), ſecunda, proxima ſuperiore anguſtior, inſeritur coſtæ decimæ (*m*), tertia, anguſtior proxima ſuperiore, coſtæ undecimæ (*n*), quarta, rurſus anguſtior proxima ſuperiore, coſtæ duodecimæ (*o*). Coſtas, quibus inſertus, deprimit, trahitque retrorſum; coërcet, firmat, muſculos, quos complectitur.

LEVATOR SCAPULÆ (*a*).

Oritur ab ora ſcapulæ, quam illa habet mox ſupra primum ſpinæ ſuæ initium (*b*), adſcendit oblique in priora, abitque in caudas quatuor, paulatim gracileſcentes, & ex interiore

(*i*) Euſtach. Tab. 36. h.
(*k*) Id. Tab. 36. i.
(*l*) Albin. Tab. 17. Fig. 17. n. o. o. Euſtach. Tab. 36. h. — α.
(*m*) Albin. Tab. 17. Fig. 17. p. q. q. Euſtach. Tab. 36. h. — β.
(*n*) Albin. Tab. 17. Fig. 17. r. s. s. Euſtach. Tab. 36. h. — γ.
(*o*) Albin. Tab. 17. Fig. 17. t. u. u. Euſtach. Tab. 36. h. — δ.
(*a*) Albin. Tab. Muſcul. 16. Fig. 13. a. — l. Fig. 14. a. b. Euſtach. Tab. 36. d.
(*b*) Albin. Tab. 16. Fig. 13. a. a. Fig. 14. a. Euſtach. Tab. 36. d. — α.

riore parte ſe in tendineam naturam vertentes, quas inſerit extremis proceſſibus transverſis vertebrarum colli quartæ (*c*) quintæ (*d*), ſextæ (*e*), & ſeptimæ (*f*).

Inflectit cervicem in illud latus, in quo ipſe collocatus eſt, ac ſimul aliquantum retrorſum. Scapulam tenet ſuſpenſam, attollit in priora, vertit eam eodem tempore.

SPLENIUS CAPITIS (*a*).

Tribus capitibus incipit a ſpinis vertebrarum dorſi undecimæ (*b*), duodecimæ (*c*), primæ colli (*d*); porro procedit a ligamento cervicis (*e*). In latus oblique adſcendit, eandem prope latitudinem ſervans, & inſeritur poſteriori & eidem laterali externæ parti proceſſus mammillaris, per ejus longitudinem totam (*f*), indeque retrorſum oſſi mammillari, ac vicino occipitis (*g*), fere usque ad locum medium inter

(*c*) Albin. Tab. 16. Fig. 13. d. e. Euſtach. Tab. 36. d.—β.
(*d*) Albin. Tab. 16. Fig. 13. f. g. Euſtach. Tab. 36. d.—γ.
(*e*) Albin. Tab. 16. Fig. 13. h. i. Euſtach. Tab. 36. d.—δ.
(*f*) Albin. Tab. 16. Fig. 13. k. l. Euſtach. Tab. 36. d.—ε.
(*a*) Albin. Tab. Muſcul. 16. Fig. 27. a.—h. Euſtach. Tab. 36. c.
(*b*) Albin. Tab. 16. Fig. 27. a.
(*c*) Id. Tab. 16. Fig. 27. b.
(*d*) Id. Tab. 16. Fig. 27. c.
(*e*) Id. Tab. 16. Fig. 27. d. d.
(*f*) Id. Tab. 16. Fig. 27. f. g. g. Euſtach. Tab. 36. c.—γ.
(*g*) Albin. Tab. 16. Fig. 27. h. h. Euſtach. Tab. 36. c.—β.

inter radicem processus mammillaris & medium occiput.

Capitis partem, ad quam pertinet, totumque adeo caput, retrorsum inclinat oblique spinam dorsi versus, eodemque curvat cervicem. Caput in priora pendulum retinet, & una cum cervice erigit.

SPLENIUS COLLI (*a*).

Enascitur altero capite, tendineo, a latere extremæ spinæ vertebræ dorsi nonæ (*b*), altero, breviore, a latere extremæ spinæ vertebræ dorsi decimæ (*c*). Principia hæc carnea (*d*) fiunt; sicque producitur musculus, non valde latus, qui se findit in extrema tria, quorum primum pertinet ad extremam posteriorem partem tuberculi posterioris processus transversi vertebræ colli quintæ (*e*), secundum ad inferiorem partem extremi processus transversi vertebræ colli sextæ (*f*), tertium ad processus transversi vertebræ colli septimæ maxime eminentis mucronis priorem partem (*g*).

Cervicem in posteriora curvat, torquetque, medium dorsum versus.

B I-

(*a*) Albin. Tab. Muscul. 16. Fig. 1. a.—o. Eustach. Tab. 37. c.
(*b*) Albin. Tab. 16. Fig. 1. a. b.
(*c*) Id. Tab. 16. Fig. 1. c. d. Eustach. Tab. 37. c. — α.
(*d*) Albin. Tab. 16. Fig. 1. e.
(*e*) Id. Tab. 16. Fig. 1. f. g. h.
(*f*) Id. Tab. 16. Fig. 1. i. k. l.
(*g*) Id. Tab. 16. Fig. 1. m. n. o.

BIVENTER CERVICIS (*a*).

Hic, cum Complexo ſæpe confluens (*), oritur a poſteriore & eadem ſuperiore parte tuberum, in quæ deſinunt proceſſus transverſi vertebrarum dorſi ſextæ (*b*), ſeptimæ (*c*), octavæ (*d*), nonæ (*e*), decimæ (*f*). Accedit portio oriens a latere ſpinæ vertebræ dorſi duodecimæ (*g*). Coëunt dicta capita in ventrem, qui rurſus verſus cervicis initium vertitur in tendinem (*h*), unde venter ſecundus oritur, plagam tendineam extrinſecus monſtrans (*i*), qui extremo tenui, & fere carneo, inſeritur oſſis occipitis parti poſteriori, ad latus mediæ, aliquanto inferius, quam ubi Cucullaris incipit (*k*).

Cervice rigida, caput ſuper ſummam vertebram flectit in poſteriora. Cervicem rectam, cum nihil impedit, in eandem

(*a*) Albin. Tab. Muſcul. 16. Fig. 23. a. — p. Fig. 24. a. — g.
(*) Euſtach. Tab. 37. a.
(*b*) Albin. Tab. 16. Fig. 23. a. b.
(*c*) Id. Tab. 16. Fig. 23. c. d.
(*d*) Id. Tab. 16. Fig. 23. e. f.
(*e*) Id. Tab. 16. Fig. 23. g. h.
(*f*) Id. Tab. 16. Fig. 23. i. k.
(*g*) Id. Tab. 16. Fig. 23. l. Fig. 24. b. c.
(*h*) Id. Tab. 16. Fig. 23. m. Fig. 24. d.
(*i*) Id. Tab. 16. Fig. 23. n. Fig. 24. e.
(*k*) Id. Tab. 16. Fig. 23. o. p. p. Fig. 24. f. g. g.

dem partem curvat, sed simul nonnihil oblique in illud latus, ubi situs. Caput in priora pendulum attollit, erigens cervicem.

COMPLEXUS (a).

Septem huic capita, quorum tria inferiora oriuntur a posteriore & eadem superiore parte processuum transversorum, fere extremorum, vertebrarum dorsi decimæ (b), undecimæ (c), duodecimæ (d); quartum a posteriore & superiore parte processus transversi vertebræ colli primæ, juxta obliquum adscendentem (e); quintum ab exteriore & posteriore parte radicis processus obliqui adscendentis vertebræ colli secundæ, inde usque a radice transversi (f), & a processus obliqui descendentis tertiæ margine laterali externo; sextum simili modo ab obliquo adscendente tertiæ (g), & descendente quartæ; septimum simili modo ab obliquo adscendente quartæ (h), & descendente quintæ. Omnia capita adscendunt oblique versus spinam, convergunt, car-(nem-

(a) Albin. Tab. Muscul. 16. Fig. 23. q.—x. Fig. 24. h.—x.
(b) Id. Tab. 16. Fig. 24. h. i. Fig. 23. q. r.
(c) Id. Tab. 16. Fig. 24. k. l. Fig. 23. s. t.
(d) Id. Tab. 16. Fig. 24. m. n. Fig. 23. u. v.
(e) Id. Tab. 16. Fig. 24. o. p.
(f) Id. Tab. 16. Fig. 24. q. r.
(g) Id. Tab. 16. Fig. 24. s. t.
(h) Id. Tab. 16. Fig. 24. u. v.

nemque satis latam formant, quæ extrinsecus plagam tendineam habet (*i*), porro Biventrem subit, cum eo se conjungit, & inserit (*k*).

Caput & collum flectit, ut Biventer, sed obliquius.

TRACHELOMASTOIDEUS (*a*).

Sunt & huic capita distincta septem. Inferiora tria procedunt a processibus transversis vertebrarum dorsi decimæ (*b*), undecimæ (*c*), duodecimæ (*d*); quartum a posteriore & superiore parte processus transversi vertebræ primæ colli, juxta obliquum adscendentem (*e*); quintum a processu obliquo adscendente vertebræ colli secundæ; ab exteriore & eadem posteriore parte radicis processus illius, inde usque ab initio transversi (*f*), ut & a posteriore parte marginis lateralis externi processus oblique descendentis vertebræ colli tertiæ (*g*); sextum eodem modo ab obliquo adscendente ter-

(*i*) Albin. Tab. 16. Fig. 23. w. Fig. 23. w.
(*k*) Id. Tab. 16. Fig. 23. x. o. p. p.
(*a*) Albin. Tab. Muscul. 16. Fig. 21. a. — q. Fig. 22. a. — o. Eustach. Tab. 39. h. Tab. 37. b.
(*b*) Albin. Tab. 16. Fig. 21. a. b. Fig. 22. a. b.
(*c*) Id. Tab. 16. Fig. 21. c. d. Fig. 22. c. d.
(*d*) Id. Tab. 16. Fig. 21. e. f. Fig. 22. e. f.
(*e*) Id. Tab. 16. Fig. 21. g. h.
(*f*) Id. Tab. 16. Fig. 21. i. k.
(*g*) Id. Tab. 16. Fig. 21. juxta g.

tertiæ, & defcendente quartæ (*h*); feptimum eodem modo ab aliquo adfcendente quartæ, & defcendente quintæ (*i*). Omnia adfcendunt, intumescunt, in carnem abeunt, extrinfecus plagam tendineam habentem (*k*), efficiuntque musculum brevem, anguftum, fenfim latiorem, craffiorem, rurfus extenuatum, in fine tendinofum, & infertum pofteriori margini proceffus mammillaris (*l*).

Cervicem in pofteriora, & fimul aliquantum oblique in latus, curvat, trahens eo, inclinansque capitis, cui infertus eft, partem.

TRANSVERSALIS CERVICIS (*a*).

Quinque hujus capita oriuntur a fuperiore & eadem pofteriore parte proceffuum transverforum vertebrarum dorfi octavæ (*b*), nonæ (*c*), decimæ (*d*), undecimæ (*e*), duode-

(*h*) Albin. Tab. 16. Fig. 21. l. m. Fig. 22. juxta h. i.
(*i*) Id. Tab. 16. Fig. 21. n. o. Fig. 22. k. l. m.
(*k*) Id. Tab. 16. Fig. 21. p. Fig. 22. n.
(*l*) Id. Tab. 16. Fig. 21. q. r. r. Fig. 22. o. p. Euftach. Tab. 37. b. — α. Tab. 39. h. — β.
(*a*) Albin. Tab. Mufcul. 16. Fig. 16. a. — r. Fig. 17. a. — i. Fig. 18. a. — r. Euftach. Tab. 37. d.
(*b*) Albin. Tab. 16. Fig. 17. a. b.
(*c*) Id. Tab. 16. Fig. 17. c.
(*d*) Id. Tab. 16. Fig. 17. d. e.
(*e*) Id. Tab. 16. Fig. 17. f. g.

decimæ (*f*). Hæc ad partem mufculi exteriorem (*g*) pertinent. Ad partem autem mufculi interiorem (*h*) accedunt capita tria, tendineis principiis orientia a pofteriore parte proceffus obliqui adfcendentis vertebræ colli primæ, ad latus externum obliqui defcendentis fecundæ (*i*), ab eadem parte adfcendentis vertebræ colli fecundæ, ad latus externum defcendentis tertiæ (*k*); ab eadem parte adfcendentis vertebræ colli tertiæ, ad latus externum defcendentis quartæ (*l*). Venter fic natus primo latescit, intumescit, dein detumescit, & in quinque tendines finditur, quorum quatuor inferuntur parti inferiori & pofteriori cornu pofterioris extremi proceffus transverfi vertebræ colli fecundæ (*m*), tertiæ (*n*), quartæ (*o*), quintæ (*p*), quintus inferiori ac pofteriori parti extremi proceffus transverfi fextæ (*q*). Omnes per ventrem ab inferiore parte decurrunt, eisque fere

ad

(*f*) Albin. Tab. 16. Fig. 17. h. i. Euftach. Tab. 37. d. — α. α. α. α. α.
(*g*) Id. Tab. 16. Fig. 16. c. d. e. f.
(*h*) Id. Tab. 16. Fig. 16. g. h. i. k. l. m. n. o. p.
(*i*) Id. Tab. 16. Fig. 16. g. h. i.
(*k*) Id. Tab. 16. Fig. 16. k. l. m.
(*l*) Id. Tab. 16. Fig. 16. n. o. p.
(*m*) Id. Tab. 16. Fig. 18. b. c.
(*n*) Id. Tab. 16. Fig. 18. d. e.
(*o*) Id. Tab. 16. Fig. 18. f. g.
(*p*) Id. Tab. 16. Fig. 18. h. i.
(*q*) Id. Tab. 16. Fig. 18. k. l.

ad finem usque caro inhæret. Extremum denique ſe cum Intertransverſario cervicis ſexto poſteriore conjungit, & cum eo inſerit parti inferiori & priori proceſſus transverſi atlantis (*r*).

Cervicem in latus, ſimulque in poſteriora oblique curvat.

CERVICALIS DESCENDENS (*a*).

Capita hujus oriuntur a coſta ſexta (*b*), quinta (*c*), quarta (*d*), tertia (*e*), ſecunda (*f*), tendinibus diverſis (*g*), & quidem a poſteriore parte coſtarum paulo propius ſpinam, quam ubi caudæ Sacrolumbalis inſertæ ſunt. Tendines ab exteriore parte cito carnem producunt, ab interiore autem longiores ſunt. Cum Sacrolumbali ita ſe conjungit (*h*), ut ejus continuatio ſit, hoc eſt portionum ejus illarum, quas a coſtis accipit. Deſinit in tres caudas tendineas, quæ ſe circum muſculos ſubjectos flectunt, pertinentque ad colli vertebram ſecundam (*i*), tertiam (*k*), quartam (*l*), & ſe inſe-

(*r*) Albin. Tab. 16. Fig. 16. q. r. Fig. 18. m. n. o.
(*a*) Albin. Tab. Muſcul. 15. Fig. 3. A. -- E. Fig. 4. t. -- z. α -- η.
(*b*) Id. Tab. 15. Fig. 4. t.
(*c*) Id. Tab. 15. Fig. 4. u.
(*d*) Id. Tab. 15. Fig. 4. v.
(*e*) Id. Tab. 15. Fig. 4. w.
(*f*) Id. Tab. 15. Fig. 4. x.
(*g*) Id. Tab. 15. Fig. 4. y. y. &c.
(*h*) Id. Tab. 15. Fig. 4. z.
(*i*) Id. Tab. 15. Fig. 4. β. β.
(*k*) Id. Tab. 15. Fig. 4. δ. δ.
(*l*) Id. Tab. 15. Fig. 4. ζ. ζ.

inferunt imæ parti extremi cornu posterioris processus earum transversi (*m*). Cervicem curvat, fere ut Transversalis.

LONGISSIMUS DORSI (a) ET SACROLUMBALIS (b).

Unum referunt, caudas habentem duas. Caput commune, parte carnea & tendinea constans (*c*), oritur à crista ossis ilium partim carne, partim tendine (*d*), cum Gluteo magno cohæret (*e*), pergit oriri a tuberculis duobus superioribus, quæ sunt juxta hiatum extremi canalis ossis sacri (*f*), a spinis omnibus ossis sacri, vertebrarum lumborum primæ, secundæ (*g*), tertiæ (*h*), quartæ (*i*), quintæ (*k*), dividit se dein in Longissimum dorsi & Sacrolumbalem (*l*). Per Longissimum pars tendinea, extrinsecus conspi-

(*m*) Albin. Tab. 15. Fig. 4. γ. ε. η.

(*a*) Albin. Tab. Muscul. 15. Fig. 3. a.—f. Fig. 5. a.—s. Eustach. Tab. 36. l.—δ. Tab. 37. h.

(*b*) Albin. Tab. Musc. 15. Fig. 3. s.—z. α.—ω. Fig. 4. a.—s. Eustach. Tab. 36. l—γ.

(*c*) Albin. Tab. 15. Fig. 3. a. b.

(*d*) Id. Tab. 15. Fig. 3. c. d. e. Eustach. Tab. 36. l.—η.

(*e*) Albin. Tab. 15. Fig. 3. e. f.

(*f*) Id. Tab. 15. Fig. 3. g. h.

(*g*) Id. Tab. 15. Fig. 3. h. i.

(*h*) Id. Tab. 15. Fig. 3. k.

(*i*) Id. Tab. 15. Fig. 3. l.

(*k*) Id. Tab. 15. Fig 3. m. Eustach. Tab. 36. l.

(*l*) Albin. Tab. 15. Fig. 3. n. Eustach. Tab. 36. l.—δ. γ.

ſpicua, aliquamdiu excurrit (*m*), cauda per cervicem adſcendit (*n*), abit in tendinem (*o*), ſe cum Cervicalis deſcendentis tendine (*p*) ad poſtremum conjungentem; qui, quandoque bifidus, ſæpe ſe cum quibusdam cervicis muſculis conjungit. Hoc autem in decurſu partes variæ ſecedunt a Longiſſimo; findit etenim ſe in multas caudas (†), majorem partem tendineas, quas coſtis inſerit, exteriori ſcilicet earum parti, poſtquam coſtæ non longe a proceſſibus transverſis receſſere, & quidem duodecimæ, undecimæ, decimæ (*q*) nonæ (*r*), octavæ (*s*), ſeptimæ (*t*), ſextæ (*u*), quintæ (*v*), quartæ (*w*), tertiæ (*x*); in caudas alias, quas inſerit, poſteriori & eidem inferiori parti extremorum proceſſuum transverſorum vertebrarum dorſi, primæ (*y*), ſecundæ (*z*), ter-

(*m*) Albin. Tab. 15. Fig. 3. p.
(*n*) Id. Tab. 15. Fig. 3. q.
(*o*) Id. Tab. 15. Fig. 3. r.
(*p*) Id. Tab. 15. Fig. 3. E. E.
(†) Euſtach. Tab. 37. h.
(*q*) Albin. Tab. 15. Fig. 5. b.
(*r*) Id. Tab. 15. Fig. 5. c.
(*s*) Id. Tab. 15. Fig. 5. d.
(*t*) Id. Tab. 15. Fig. 5. e.
(*u*) Id. Tab. 15. Fig. 5. f.
(*v*) Id. Tab. 15. Fig. 5. g.
(*w*) Id. Tab. 15. Fig. 5. h.
(*x*) Id. Tab. 15. Fig. 5. i.
(*y*) Id. Tab. 15. Fig. 5. v. w.
(*z*) Id. Tab. 15. Fig. 6. x. y.

tertiæ (*a*), quartæ (*b*), quintæ (*c*), ſextæ (*d*), ſeptimæ (*e*) octavæ (*f*), nonæ (*g*), decimæ (*h*), undecimæ (*i*), duodecimæ (*k*). Tot caudis emiſſis paulatim conſumitur Longiſſimus, ſed novis capitibus augetur, quorum numerus certus non eſt; talia ſæpe oriuntur a ſuperiore & eadem poſteriore parte proceſſuum transverſorum, fere extremorum, vertebrarum dorſi, primæ (*l*), ſecundæ (*m*), tertiæ (*n*), quartæ (*o*).

Sacrolumbalis emittit caudas duodecim ad totidem coſtas, duodecimam (*p*), undecimam (*q*), decimam (*r*), nonam (*s*), octavam (*t*), ſeptimam (*u*), ſextam (*y*), quin-

(*a*) Albin. Tab. 15. Fig. 6. z. α.
(*b*) Id. Tab. 15. Fig. 6. β. γ.
(*c*) Id. Tab. 15. Fig. 6. δ. ε.
(*d*) Id. Tab. 15. Fig. 6. ζ. η.
(*e*) Id. Tab. 15. Fig. 6. θ. ι.
(*f*) Id. Tab. 15. Fig. 6. κ. λ.
(*g*) Id. Tab. 15. Fig. 6. μ. ν.
(*h*) Id. Tab. 15. Fig. 6. ξ.
(*i*) Id. Tab. 15. Fig. 6. ο.
(*k*) Id. Tab. 15. Fig. 5. l. m.
(*l*) Id. Tab. 15. Fig. 6. π. υ.
(*m*) Id. Tab. 15. Fig. 6. ρ. υ.
(*n*) Id. Tab. 15. Fig. 6. σ. υ.
(*o*) Id. Tab. 15. Fig. 6. τ. υ.
(*p*) Id. Tab. 15. Fig. 6. t.
(*q*) Id. Tab. 15. Fig. 3. t. u. v. Fig. 4. a.
(*r*) Id. Tab. 15. Fig. 3. x. y. Fig. 4. b.
(*s*) Id. Tab. 15. Fig. 3. z. α. β. Fig. 4. c.
(*t*) Id. Tab. 15. Fig. 3. γ. δ. ε. Fig. 4. d.
(*u*) Id. Tab. 15. Fig. 3. ζ. η. θ. Fig. 4. e.

quintam (*w*), quartam (*x*), tertiam (*y*), fecundam (*z*), primam (*a*). Infertæ pleræque funt imæ parti fuperficiëi inæquabilis, quæ eft in exteriore parte coftarum non longe a fpina dorfi, in ipfo earum fefe in latus flectentium cubito. Quæ ad coftas duas fuperiores pertinent, fere juxta tuberculum illud infertæ funt, cui affixum ligamentum alligans coftam procesfui transverfo vertebræ. Quæ ad coftam primam pertinet, præterea fe inferit proceffui transverfo vertebræ dorfi fummæ. Accedit quandoque cauda decima tertia, ad proceffum transverfum vertebræ imæ colli definens. Accedunt ad Sacrolumbalem portiones aliquot, principiis tendineis orientes a pofteriore parte coftarum, paulo propius fpinam, quam ubi caudæ Sacrolumbalis infertæ, duodecimæ (*b*), undecimæ (*c*), decimæ (*d*), nonæ (*e*), octavæ (*f*), feptimæ (*g*).

Ca-

(*v*) Albin. Tab. 15 Fig. 3. ι. κ. λ. Fig. 4. f.
(*w*) Id. Tab. 15. Fig. 3. μ. ν. ξ. Fig. 4. g.
(*x*) Id. Tab. 15. Fig. 3. ο. π. ρ. Fig. 4. h.
(*y*) Id. Tab. 15. Fig. 3. σ. τ. υ. Fig. 4. i.
(*z*) Id. Tab. 15. Fig. 3. φ. χ. Fig. 4. k.
(*a*) Id. Tab. 15. Fig. 3. ψ. ω. Fig. 4. l.
(*b*) Id. Tab. 15. Fig. 4. s. m.
(*c*) Id. Tab. 15. Fig. 4. s. n.
(*d*) Id. Tab. 15. Fig. 4. s. o.
(*e*) Id. Tab. 15. Fig. 4. s. p.
(*f*) Id. Tab. 15. Fig. 4. s. q.
(*g*) Id. Tab. 15. Fig. 4. s. r.

Caput denique commune caudas inſerit decem vertebris lumborum, quinque imo tuberculo, quod eſt juxta poſteriorem partem radicis proceſſus transverſi vertebræ lumborum primæ (*h*), ſecundæ (*i*), tertiæ (*k*), quartæ (*l*), quintæ (*m*); quinque margini inferiori partis poſterioris proceſſus transverſi vertebræ lumborum primæ ad extremum proceſſus illius (*n*), ſecundæ (*o*), tertiæ (*p*), quartæ (*q*), quintæ (*r*); portionem denique latam inferiori margini coſtæ ultimæ ab inferiore parte (*s*).

Longiſſimus & Sacrolumbalis lumbos & dorſum, in priora curvata, retinent, erigunt, flectunt retrorſum, & aliquantum ſimul in latus. Caudæ, quæ inſertæ coſtis, eas agunt deorſum.

SPINALIS DORSI (*a*).

Quinque tendinibus oritur a ſpinis vertebrarum lumborum

(*h*) Albin. Tab. 15. Fig. 6. a. b.
(*i*) Id. Tab. 15. Fig. 6. c. d.
(*k*) Id. Tab. 15. Fig. 6. e. f.
(*l*) Id. Tab. 15. Fig. 6. g. h.
(*m*) Id. Tab. 15. Fig. 6. i. k.
(*n*) Id. Tab. 15. Fig. 6. l. m.
(*o*) Id. Tab. 15. Fig. 6. n. o.
(*p*) Id. Tab. 15. Fig. 6. p. q.
(*q*) Id. Tab. 15. Fig. 6. r.
(*r*) Id. Tab. 15. Fig. 6. s.
(*s*) Id. Tab. 15. Fig. 6. t. u. u.
(*a*) Albin. Tab. Muſcul. 15. Fig. 7. a.—n. Euſtach. Tab. 47. l.

rum duarum ſuperiorum, triumque inferiorum dorſi. Eorum inferior, qui oritur a quarta lumborum, longiſſimus, craſſiſſimusque (*b*); proximus, qui a quinta lumborum, brevior & tenuior (*c*); hoc brevior & tenuior, qui a prima dorſi (*d*); hoc quartus, qui a ſecunda (*e*); breviſſimus, gracillimus, ſuperior, qui a tertia (*f*). Abeunt in carnem (*g*), formantque muſculum, tenuem, non valde latum, & modice in progreſſu latescentem, qui in ſeptem deſinit caudas, primum carneas, dein tendineas; pertinent hæ ad ſpinas ſeptem dorſi vertebrarum, & lateri extremi fere mucronis earum inſeruntur, quintæ (*g*), ſextæ (*h*), ſeptimæ (*i*), octavæ (*k*), nonæ (*l*), decimæ (*m*), undecimæ (*n*).

Dorſum cum Longiſſimo retinet, erigit, flectit in poſteriora, & eodem tempore nonnihil in latus.

S E-

(*b*) Albin. Tab. 15. Fig. 7. a.
(*c*) Id. Tab. 15. Fig. 7. b.
(*d*) Id. Tab. 15. Fig. 7. c.
(*e*) Id. Tab. 15. Fig. 7. d.
(*f*) Id. Tab. 15. Fig. 7. e.
(*g*) Id. Tab. 15. Fig. 7. g.
(*h*) Id. Tab. 15. Fig. 7. h.
(*i*) Id. Tab. 15. Fig. 7. i.
(*k*) Id. Tab. 15. Fig. 7. k.
(*l*) Id. Tab. 15. Fig. 7. l.
(*m*) Id. Tab. 15. Fig. 7. m.
(*n*) Id. Tab. 15. Fig. 7. n.

SEMISPINALIS DORSI (*a*).

Quatuor hujus capita, diu tendinea, incipiunt a posteriore & eadem superiore parte processuum transversorum fere extremorum tertiæ (*b*), quartæ (*c*), quintæ (*d*), sextæ (*e*), dorsi vertebrarum. Musculus, sic enatus, findit se in septem caudas, quæ tendinoso fine pertinent ad inferiorem partem lateris spinarum vertebrarum dorsi superiorum quinque, collique proximarum duarum, non longe a mucrone earum; itaque ad spinam, octavæ dorsi (*f*), ad nonæ (*g*), ad decimæ (*h*), ad undecimæ (*i*), ad duodecimæ (*k*); ad colli primæ (*l*), ad secundæ (*m*). Caudæ hæ eo longiores, quo superiores.

Dorsum, finitimamque ei cervicis partem, cum in priora curvata sunt, erigit, & curvat deinde oblique in latus.

SPI-

(*a*) Albin. Tab. Muscul. 15. Fig. 8. a—q.
(*b*) Id. Tab. 15. Fig. 8. a. b.
(*c*) Id. Tab. 15. Fig. 8. c. d.
(*d*) Id. Tab. 15. Fig. 8. e. f.
(*e*) Id. Tab. 15. Fig. 8. g. h.
(*f*) Id. Tab. 15. Fig. 8. k.
(*g*) Id. Tab. 15. Fig. 8. l.
(*h*) Id. Tab. 15. Fig. 8. m.
(*i*) Id. Tab. 15. Fig. 8. n.
(*k*) Id. Tab. 15. Fig. 8. o.
(*l*) Id. Tab. 15. Fig. 8. p.
(*m*) Id. Tab. 15. Fig. 8. q.

SPINALIS CERVICIS (*a*).

Caput tendineum primum oritur a posteriore eademque superiore parte processus transversi vertebræ dorsi septimæ, ad tuberis, in quod desinit, radicem (*b*), secundum eodem modo ab octava (*c*), tertium a nona (*d*), quartum a decima (*e*), quintum ab undecima (*f*), sextum a duodecima (*g*). Quo quodque caput superius est, eo brevius. Findit se in extrema quinque, quæ alia aliis incumbunt, ac sese inserunt lateri imi marginis extremæ spinæ vertebræ colli secundæ (*h*), tertiæ (*i*), quartæ (*k*), quintæ (*l*), sextæ (*m*).

Cervicem in eandem, atque Semispinalis dorsum, partem erigit & curvat; flectit præterea retrorsum.

INTERSPINALES CERVICIS (*a*).

Quinque numero sunt, interjecti spinis colli vertebrarum in-

(*a*) Albin. Tab. Muscul. 16. Fig. 15. a. — r. Eustach. Tab. 39. f.
(*b*) Albin. Tab. 16. Fig. 15. a. b.
(*c*) Id. Tab. 16. Fig. 15. c. d.
(*d*) Id. Tab. 16. Fig. 15. e. f.
(*e*) Id. Tab. 16. Fig. 15. g. h.
(*f*) Id. Tab. 16. Fig. 15. i. k.
(*g*) Id. Tab. 16. Fig. 15. l. m. Eustach. Tab. 39. f. — α. α.
(*h*) Albin. Tab. 16. Fig. 15. n.
(*i*) Id. Tab. 16. Fig. 15. o.
(*k*) Id. Tab. 16. Fig. 13. p. Eustach. Tab. 39. f. — β.
(*l*) Albin. Tab. 16. Fig. 15. q. Eustach. Tab. 39. f. — γ.
(*m*) Albin. Tab. 16. Fig. 15. r. Eustach. Tab. 39. f. — δ.
(*a*) Albin. Tab. Muscul. 16. Fig. 2. a. — k. Fig. 3. a. — g. &c.

inferiorum sex. Primus procedit a latere superioris partis spinæ colli imæ, juxta ejus tumorem extremum; ad inferiorem & eandem interiorem partem cornu secundæ (b); secundus a superiore parte cornu secundæ ad inferiorem & interiorem partem tertiæ (c), sic tertius (d), quartus (e), & quintus (f).

Spinarum aliam ad aliam adducunt, sic cervicem in priora flexam erigunt, curvant deinde in partem posteriorem.

RECTUS CAPITIS POSTICUS MAJOR (a).

Origo huic ab illa parte marginis superioris spinæ vertebræ colli sextæ, quæ pars est juxta radicem cornu, & ab ipso etiam cornu (b), adscendit, prætereunsque atlantem, se inserit ossi occipitis, circa medium, inter illam partem additamenti suturæ lambdiformis, quæ fit ab osse occipitis & mammillari, lateralemque partem foraminis magni, quæ est pone processum coronoïdeum, medio loco inter finem Complexi, Obliqui superioris, & Recti postici minoris (c).

De-

(b) Albin. Tab. 16. Fig. 2. 3. a. b.
(c) Id. Tab. 16. Fig. 2. c. d. Fig. 3. c.
(d) Id. Tab. 16. Fig. 2. e. f. Fig. 3. d.
(e) Id. Tab. 16. Fig. 2. g. h. Fig. 3. e.
(f) Id. Tab. 16. Fig. 2. i. k. Fig. 3. f.
(a) Albin. Tab. Muscul. 17. Fig. 2. a. b. b. Eustach. Tab. 39. b.
(b) Albin. Tab. 17. Fig. 2. a. Eustach. Tab. 39. b. — α.
(c) Albin. Tab. 17. Fig. 2. b. b. Eustach. Tab. 39. b. — β.

Deprimit caput, & partem poſteriorem atlantis; convertit atlantem una cum capite ſuper epiſtrophæum, ad ſimilitudinem obliqui inferioris.

RECTUS CAPITIS POSTICUS MINOR (*a*).

Oritur ab eminentia atlantis, quæ ſpinæ loco eſt, & ab hac origine extrinſecus tendineus eſt (*b*), adſcendit ad os occipitis, & ſeſe inſerit ſcrobi, quæ inter foramen magnum finemque Complexi, juxta mediam ſpinam, a foramine magno in poſteriora porrectam (*c*). Caput ſummamque vertebram ad ſe invicem adducit, nonnihil oblique. Deprimit capitis partem poſteriorem.

OBLIQUUS INFERIOR CAPITIS (*a*).

Incipit a ſuperiore parte lateris ſpinæ epiſtrophæi, per totam ſpinæ longitudinem, magnaque cornu parte, principio tendinoſo (*b*); inſeritur poſteriori amplitudini extremi proceſſus transverſi atlantis (*c*).

Movet atlantem, & cum eo caput. Rotat atlantis trans-

ver-

(*a*) Albin. Tab. Muſcul. 17. Fig. 1. a. b. c. c. Euſtach. Tab. 39. a.
(*b*) Albin. Tab. 17. Fig. 1. a. b. Euſtach. Tab. 39. a. — α.
(*c*) Albin. Tab. 17. Fig. 1. c. c. Euſtach. Tab. 39. a. — β.
(*a*) Albin. Tab. Muſcul. 17. Fig. 4. a. b. Euſtach. Tab. 39. d.
(*b*) Albin. Tab. 17. Fig. 4. a. Euſtach. Tab. 39. d. — α.
(*c*) Albin. Tab. 17. Fig. 4. b. Euſtach. Tab. 39. d. — β.

verſum proceſſum ad ſpinam epiſtrophæi trahens; eoque atlantem etiam in poſteriora parumper detrahit.

OBLIQUUS SUPERIOR CAPITIS (*a*).

Procedit a ſuperiore parte extremi proceſſus transverſi atlantis, a qua origine extrinſecus tendineus eſt (*b*), tendit ad os occipitis, eique inſeritur inter illam partem additamenti ſuturæ lambdiformis, quæ fit ab oſſe occipitis & mammillari, partemque illam, cui inſertus Rectus poſticus major (*c*).

Occiput oblique deprimit, id eſt, in poſteriora & ſimul aliquantum in latus.

MULTIFIDUS SPINÆ (*a*).

Oritur a ſpina tertia oſſis ſacri usque ad tuberculum ejusdem oſſis, quod fit ex concretione proceſſus obliqui deſcendentis quartæ ipſius vertebræ, cum obliquo adſcendente quintæ, & ab ipſo illo tuberculo (*b*); a tuberculis, quæ fiunt

(*a*) Albin. Tab. Muſcul. 17. Fig. 3. a. b. c. c. Euſtach. Tab. 39. c.
(*b*) Albin. Tab. 17. Fig. 3. a. b. Euſtach. Tab. 39. c. — α.
(*c*) Albin. Tab. 17. Fig. 3. c. c. Euſtach. Tab. 39. c. — β.
(*a*) Albin. Tab. Muſcul. 15. Fig. 1. a. — z. α. — ω. Fig. 2. a. — z. α. — γ.
(*b*) Albin. Tab. 15. Fig. 1. a.

fiunt ex concretione processus obliqui descendentis tertiæ ossis sacri vertebræ cum adscendente quartæ, descendentis secundæ cum adscendente tertiæ, descendentis primæ cum adscendente secundæ; ab eminentia, quam os sacrum in dorso suo ad externum latus foraminis sui secundi & tertii habet (*c*); a ligamento, quod ab eminentia modo dicta ad finitimam ossis ilium partem deductum (*d*); ab osse ileo (*); a processu obliquo adscendente vertebræ primæ ossis sacri (*e*), ab adscendente lumborum primæ (*f*), secundæ (*g*), tertiæ (*h*), quartæ (*i*), quintæ (*k*); a superiore parte extremi processus transversi primæ dorsi (*l*), secundæ (*m*), tertiæ (*n*), quartæ (*o*), quintæ (*p*), sextæ (*q*), septi-

(*c*) Albin. Tab. 15. Fig. 1. b.
(*d*) Id. Tab. 15. Fig. 1. c.
(*) Id. Tab. 15. Fig. 1. d. Fig. 2. a.
(*e*) Id. Tab. 15. Fig. 1. e. Fig. 2. b.
(*f*) Id. Tab. 15. Fig. 1. f. Fig. 2. c. d.
(*g*) Id. Tab. 15. Fig. 1. g. Fig. 2. e. f.
(*h*) Id. Tab. 15. Fig. 1. h. Fig. 2. g. h.
(*i*) Id. Tab. 15. Fig. 1. i. Fig. 2. i. k.
(*k*) Id. Tab. 15. Fig. 1. k. Fig. 2. l. m.
(*l*) Id. Tab. 15. Fig. 1. l.
(*m*) Id. Tab. 15. Fig. 1. m.
(*n*) Id. Tab. 15. Fig. 1. n.
(*o*) Id. Tab. 15. Fig. 1. o.
(*p*) Id. Tab. 15. Fig. 1. p.
(*q*) Id. Tab. 15. Fig. 1. q.

feptimæ (*r*), octavæ (*s*), nonæ (*t*), decimæ (*u*), undecimæ (*v*), duodecimæ (*w*); a pofteriore & fuperiore parte proceffus oblique defcendentis colli vertebræ fecundæ (*x*), tertiæ (*y*), quartæ (*z*). Tot principiis enatus, & pofteriorem fpinæ partem tenens multifidus, feriem quandam mufculorum inter fe cohærentium præfentat. Extremum tendinofum fe inferit inferiori margini fpinæ prope extremæ lumborum primæ, fecundæ, tertiæ, quartæ, quintæ (*a*), dorfi etiam omnium (*b*), colli primæ, fecundæ, tertiæ, quartæ, quintæ (*c*), fextæ (*d*). Omnia inde fubtus infe-rere fe pergunt inferiori margini vertebrarum ad earum proceffum obliquum defcendentem usque. Portiones a pluribus uno capitibus ad unam eandemque vertebram pertinent.

Accedunt portiones, quæ aut ad Multifidum referri poffunt, aut pro diftinctis mufculis haberi. Duabus quibusque proximis

(*r*) Albin. Tab. 15. Fig. 1. r.
(*s*) Id. Tab. 15. Fig. 1. s.
(*t*) Id. Tab. 15. Fig. 1. t.
(*u*) Id. Tab. 15. Fig. 1. u.
(*v*) Id. Tab. 15. Fig. 1. v.
(*w*) Id. Tab. 15. Fig. 1. w.
(*x*) Id. Tab. 15. Fig. 1. x.
(*y*) Id. Tab. 15. Fig. 1. y.
(*z*) Id. Tab. 15. Fig. 1. z.
(*a*) Id. Tab. 15. Fig. 1. α. β. γ. δ. ε. Fig. 2. n. o. p. q.
(*b*) Id. Tab. 15. Fig. 1. ζ. η. θ. ι. κ. λ. μ. ν. ο. π. ρ. Fig. 2. r. s.
(*c*) Id. Tab. 15. Fig. 1. σ. τ. υ. φ. χ.
(*d*) Id. Tab. 15. Fig. 1. ψ. ω.

ximis inter ſe, vertebris lumborum inſerta una; ſuprema quintæ lumborum imæque dorſi. Prima oritur ab exteriore parte radicis proceſſus oblique adſcendentis, inſerit ſe inferiori parti radicis tuberculi illius, quod inter proceſſum transverſum & obliquum adſcendentem eminet, porroque inferiori parti marginis ipſius illius obliqui (e); eodemque modo ſecunda (f), tertia (g), quarta (h), & quinta (i), ſe habent.

Spinam continet, regit, in priora flexam retinet, erigit, flectit in poſteriora, torquet.

INTERSPINALES LUMBORUM ET DORSI (a).

A ſpina imæ vertebræ lumborum ad proximam adſcendunt, orti ab eminentia, quæ in inferiore parte lateris ſpinæ a proceſſu obliquo inferiore ad ſpinæ extremum porrecta jacet (b), inſerti inferiori parti lateris ſpinæ infra eminentiam modo dictam (c).

Lum-

(e) Albin. Tab. 15. Fig. 2. u. v.
(f) Id. Tab. 15. Fig. 2. w. x.
(g) Id. Tab. 15. Fig. 2. y. z.
(h) Id. Tab. 15. Fig. 2. α. β.
(i) Id. Tab. 15. Fig. 2. γ.
(a) Albin. Tab. Muſcul. 15. Fig. 11. a. b.
(b) Id. Tab. 15. Fig. 11. a.
(c) Id. Tab. 15. Fig. 11. b.

Lumbos, in priora curvatos, erigunt, poſt flectunt retrorſum, ſpinas adducendo ad ſe mutuo.

Interſpinales dorſi conveniunt ortu, inſertione, uſu.

INTERTRANSVERSARII LUMBORUM (*a*).

A ſuperiore parte proceſſus transverſi cujusque inferioris vertebræ lumborum pertinent ad inferiorem partem proximæ ſuperioris (*b*). Quintus, ſimiliter a ſuperiore parte transverſi quintæ enatus, inſeritur tuberculo, quod ab exteriore ac poſteriore parte transverſi imæ dorſi infra eminet (*c*).

Lumbos in latus flectunt; in oppoſitum latus flexos retinent, erigunt.

INTERTRANSVERSARII DORSI (*a*).

Primus oritur ab anteriore parte proceſſus transverſi primæ dorſi vertebræ, inſeritque ſe inferiori eidemque poſteriori parti proceſſus transverſi ſecundæ (*b*). Secundus incipit a ſuperiore & poſteriore parte proceſſus transverſi ſecun-

(*a*) Albin. Tab. Muſcul. 15. Fig. 10. a. k.
(*b*) Id. Tab. 15. Fig. 10. a. b. &c.
(*c*) Id. Tab. 15. Fig. 10. i. k.
(*a*) Albin. Tab. Muſcul. 15. Fig. 9. a. — l.
(*b*) Id. Tab. 15. Fig. 9. a. b.

cundæ dorſi, inſeritur inferiori & poſteriori transverſi tertiæ (*c*). Tertius, quartus, quintus, ſextus, ſeptimus, octavus, nonus, oriuntur, inſeruntque ſe (*d*), ut ſecundus. Quo ſuperiores eo exiliores. Dorſum in latus flectunt, in oppoſitum latus flexum retinent, erigunt.

LEVATORES BREVIORES COSTARUM (*a*).

Oriuntur a proceſſu transverſo vertebræ illius, quæ eſt ſtatim ſupra illam, cum cujus proceſſu transverſo ipſa coſta commiſſa eſt, fere a tota ejus longitudine, ab inferiore parte (*b*); inſeruntur ſuperiori margini coſtæ proximæ inferioris (*c*), acutæ eminentiæ, quæ ſe ex ea erigit, ubi a corporibus vertebrarum incipit recedere, ultraque eam paulo longius, quam ubi coſta procesſui transverſo innititur, aut juxta extremum ejus incedit, porrectæ ſcrobi inæquabili; itemque exteriori parti marginis ſuperioris, aliquantum ultra proceſſum eundem.

Coſtarum principium firmant, moderantur.

LE-

(*c*) Albin. Tab. 15. Fig. 9. c. d.
(*d*) Id. Tab. 15. Fig. 9. e. f. g. h. i. k. l.
(*a*) Albin. Tab. Muſcul. 17. Fig. 14. a. — c.
(*b*) Id. Tab. 17. Fig. 14. a. a.
(*c*) Id. Tab. 17. Fig. 14. c. c.

LEVATORES LONGIORES COSTARUM (*a*).

Tres, quatuorve, coſtæ inferiores talem nactæ ſunt. Oriuntur ab inferiore parte partis poſterioris proceſſus transverſi vertebræ dorſi (*b*), proximam coſtam prætergrediuntur, ſed poſteriori parti marginis ſuperioris coſtæ ſubſequentis, juxta brevioris externum latus, ubi ſe coſta jam magis deorſum inclinat, inſeruntur (*c*). Aliquando vel omnes, vel nonnulli, ab externo latere dimittunt portionem, ad coſtam, quæ proxima ſupra illam, cujus ſunt; quemadmodum breviores quandoque portione quadam excurrunt longius, ac prætereuntes coſtam, cujus ſunt, ad proximam pertinent.

Attollunt coſtas, duas inferiores eodem tempore trahunt retrorſum.

REGIO XX. SPATIA INTERCOSTALIA.

Intercoſtales externi (*a*), internique (*b*), ſoli hæcce ſpatia adimplent.

I N-

(*a*) Albin. Tab. Muſcul. 17. Fig. 15. a. — d.
(*b*) Id. Tab. 17. Fig. 15. a.
(*c*) Id. Tab. 17. Fig. 15. c.
(*a*) Euſtach. Tab. 39. Fig. 1. i. l. &c. utr. lat. Tab. 33. l. &c. utr. lat.
(*b*) Id. Tab. 38. l. l. &c. utr. lat. Tab. 33. h. i. &c. utr. lat.

INTERCOSTALES EXTERNI (*a*).

Quisque intercoſtalis externus oritur ab exteriore & inferiore parte coſtæ ſuperioris, inde, ubi illa ultra proceſſum, cui innixa, procedere incipit (*b*), tendit oblique verſus anteriora & inſeritur exteriori eidemque ſuperiori parti coſtæ ſubſequentis, inferioris (*c*). Coſtarum longitudinem alii ad earum cartilagines usque tenent, alii propemodum, & ubi deſinunt, aponeuroſis tenuis ab una coſta ad aliam procedere pergit.

Coſtas adducunt ad ſe invicem, pleuram firmant.

INTERCOSTALES INTERNI (*a*).

Oriuntur ab inferiore parte partis interioris coſtæ ſuperioris, & a ſuperiore quidem margine ſulci, cui vaſa intercoſtalia inſident (*b*), oblique verſus poſteriora deſcendunt, coſtarumque longitudinem ab extremis cartilaginibus earum tenent ultra eum locum, ubi ſe è ſpina venientes in priora in-

fig-

(*a*) Albin. Tab. Muſcul. 17. Fig. 9. a. a. b. c. c. c. Fig. 10. a a. a b. b. b Euſtach. Tab. 33. l. l. &c. Tab. 37. g. g. &c. Tab. 39. l. l. &c.

(*b*) Albin. Tab. 17. Fig. 9. a. b. b. Fig. 10. a. a. a.

(*c*) Id. Tab. 17. Fig. 9. c. c. c. Fig. 10. b. b. b.

(*a*) Albin. Tab. Muſcul. 17. Fig. 11. 12. 13. Euſtach. Tab. 38. l. l. &c Tab. 33. h. h. &c.

(*b*) Albin. Tab. 17. Fig. 13. a. a. b. b. b.

ſigniter curvant, deſinuntque ad interiorem partem marginis ſuperioris coſtæ ſubſequentis inferioris (*c*). Noni (aliquando etiam octavi, ſeptimi, ſexti) pars longius deſcendit, coſtam proximam præterlapſa ad ſubſequentem deſinit (*d*).

Eadem, quæ externorum, & horum actio eſt.

REGIO XXI. COLLI SCELETI LATUS CUM PARTE PRIORE.

Præter Scalenum priorem (*a*), medium (*b*), poſticum (*c*), in hac regione inveniuntur, Rectus capitis internus major (*d*), Longus colli (*e*), Rectus capitis internus minor (*f*), Rectus lateralis (*g*), Intertransverſarii priores colli (*h*), Intertransverſarii poſteriores colli (*i*).

SCALENUS PRIOR (*a*).

Oritur a ſummo margine coſtæ primæ, non longe ab ejus car-

(*c*) Albin. Tab. 17. Fig. 13. c. c.
(*d*) Id. Tab. 17. Fig. 13. f. g. h. Euſtach. Tab. 38. m. n., m. n., m. n.
(*a*) Euſtach. Tab. 38. i.
(*b*) Id. Tab. 38. g. dextr. Tab. 39. e.
(*c*) Id. Tab. 39. k.
(*d*) Id. Tab. 41. Fig. 13. Π. Tab. 38. c.
(*e*) Id. Tab. 41. Fig. 13. Σ. Tab. 38. e. f.
(*f*) Id. Tab 41. Fig. 13. Ξ. dextr. Tab. 38. d. dextr.
(*g*) Id. Tab. 41. Fig. 13. Δ. Tab. 38. a.
(*h*) Albin. Tab. Muſcul. 16. Fig. 8. 10.
(*i*) Id. Tab. 16. Fig. 9. 16. 18.
(*a*) Albin. Tab. Muſcul. 16. Fig. 11. a.—g. Euſtach. Tab. 38. i.

cartilagine (*b*), findit ſe in caudas tres, quarum primam inſerit inferiori parti tuberculi prioris proceſſus transverſi vertebræ colli ſecundæ, continuoque imo lunato margini (*c*); ſecundam, anguſtiorem, proceſſui transverſo vertebræ colli tertiæ (*d*); tertiam, rurſus anguſtiorem, imo lunato margini, & proximæ parti tuberculi prioris proceſſus transverſi vertebræ colli quartæ (*e*).

Collum in priora flectit, magis quidem quam cæteri.

SCALENUS MEDIUS (*a*).

Huic origo eſt a coſta prima, ſic ut teneat totam coſtæ altitudinem (*b*). Accedit caput a ſuperiore parte extremi proceſſus transverſi vertebræ colli primæ (*c*); alterum a ſuperiore parte extremi tuberculi poſterioris transverſi proceſſus ſecundæ (*d*). Findit ſe in ſeptem caudas. Prima pertinet ad priorem & inferiorem partem proceſſus transverſi ver-

(*b*) Albin. Tab. 16. Fig. 11. a. Euſtach. Tab. 38. i.—α.
(*c*) Albin. Tab. 16. Fig. 11. b. c.
(*d*) Id. Tab. 16. Fig. 11. d. e.
(*e*) Id. Tab. 16. Fig. 11. f. g.
(*a*) Albin. Tab. Muſcul. 16. Fig. 4. a.—l. Fig. 5. a.—r. Euſtach. Tab. 38. g. dextr. Tab. 39. e.
(*b*) Albin. Tab. 16. Fig. 4. a. a. Fig. 5. a. b. b. Euſtach. Tab. 38. g.—α. Tab. 39. e.—α.
(*c*) Albin. Tab. 16. Fig. 4. b.
(*d*) Id. Tab. 16. Fig. 4. c.

vertebræ colli imæ (*e*); ſecunda ad inferiorem partem extremi tuberculi poſterioris, & ad extremum lunatum marginen proceſſus transverſi colli ſecundæ (*f*); tertia ad extremum lunatum marginem tertiæ (*g*); quarta ad eundem marginem quartæ (*h*); quinta ad extremum lunatum marginem, itemque ad imum tuberculum prius quintæ (*i*); ſexta ad priorem partem proceſſus prope extremi ſextæ (*k*); ſeptima ad priorem partem marginis inferioris proceſſus transverſi atlantis, circa longitudinem ejus mediam (*l*); ſola ſeptima extremum partim carneum partim tendineum (*m*) habet, omnes reliquæ tendineum. Collum flectit in latus, rectius.

SCALENUS POSTICUS (*a*).

Oritur ab exteriore parte marginis ſuperioris coſtæ ſecun-

(*e*) Albin. Tab. 16. Fig. 5. c. d. Fig. 4. d. Euſtach. Tab. 39. e. — β.

(*f*) Albin. Tab. 16. Fig. 5. e. f. Fig. 4. e. Euſtach. Tab. 39. e. — γ.

(*g*) Albin. Tab. 16. Fig. 5. g. h. Fig. 4. f. Euſtach. Tab. 39. e. — δ.

(*h*) Albin. Tab. 16. Fig. 5. i. k. Fig. 4. g. Euſtach. Tab. 39. e. — ε.

(*i*) Albin. Tab. 16. Fig. 5. l. m. Fig. 4. h. Euſtach. Tab. 39. e. — ξ.

(*k*) Albin. Tab. 16. Fig. 5. n. o. Fig 4. i. Euſtach. Tab. 39. e. — η.

(*l*) Albin. Tab. 16. Fig. 5. p. q. r. Fig. 4. k.

(*m*) Id. Tab. 16. Fig. 5. p. q.

(*a*) Albin. Tab. Muſcul. 16. Fig. 12. a. — e. Euſtach. Tab. 39. k.

cundæ, inter illam partem, qua proceſſui transverſo inhæreret, illamque, qua ſe in priora curvatura eſt (*b*); findit ſe in duas caudas, quarum prima inſerta extremo tuberculo poſteriori proceſſus transverſi vertebræ colli ſecundæ (*c*); altera eidem parti tertiæ (*d*). Actione cum medio convenit.

RECTUS CAPITIS INTERNUS MAJOR (*a*).

Capita huic quatuor ſunt: primum oritur a priore & eadem ſuperiore parte tuberculi prioris proceſſus transverſi vertebræ colli ſecundæ (*b*); eodem modo procedunt ſecundum (*c*), tertium (*d*), quartum (*e*), a tertia, quarta, quinta vertebra. Adſcendit ex omnibus nata caro ad caput, & inſeritur imo margini oſſis occipitis, qui reſpicit petroſum, fere ab illo hiatu, quo exit capitis nervus octavus, ad os multiforme ferme usque (*f*).

Capitis priorem partem deprimit in priora ac ſimul nonnihil

(*b*) Albin. Tab. 16. Fig. 12. a. a. Euſtach. Tab. 39. k. — α.
(*c*) Id Tab. 16. Fig. 12. b. c.
(*d*) Id. Tab. 16. Fig. 12. d. e.
(*a*) Albin. Tab. Muſcul. 16. Fig. 19. a. b. c. c. c. Fig. 20. a. -- h. Euſtach. Tab. 41. Fig. 13. π. Tab. 38. c.
(*b*) Albin. Tab. 16. Fig. 19. a. Fig. 20. a. b.
(*c*) Id. Tab. 16. Fig. 20. c. d.
(*d*) Id. Tab. 16. Fig. 20. e. f.
(*e*) Id. Tab. 16. Fig. 23. g. h.
(*f*) Id. Tab. 16. Fig. 19. c. c. Euſtach. Tab. 41. Fig. 13. π. — α.

nihil in latus; eoque & collum flectit in partem eandem; cum vero collum caputque retrorſum flexa ſunt, erigit ea.

LONGUS COLLI (*a*).

Componitur fere ex duobus muſculis, inter ſe nexis. Capita oriuntur a media laterali parte corporis vertebræ dorſi decimæ (*b*), undecimæ (*c*), duodecimæ (*d*), colli primæ (*e*); ſecundæ (*f*), a principio coſtæ primæ (*g*), a ſuperiore & eadem interiore, id eſt corpus vertebræ ſpectante, parte tuberculi prioris proceſſus transverſi vertebræ colli ſecundæ (*h*), tertiæ (*i*), quartæ (*k*), quintæ (*l*). Adſcendit caro, ſed in diverſa, caudasque emittit varias, quæ inſeruntur corpori vertebræ colli tertiæ, priori parti ejus, a latere, non longe a margine inferiore (*m*), eodem modo ver-

(*a*) Albin. Tab. Muſcul. 16. Fig. 6. a.—t. Fig. 7. a.—z. α.—κ. Euſtach. Tab. 41. Fig. 13. Σ. Tab. 38. e. f.
(*b*) Albin. Tab. 16. Fig. 7. a. b. Fig. 6. a. b.
(*c*) Id. Tab. 16. Fig. 7. c. d.
(*d*) Id. Tab. 16. Fig. 7. e. f. Euſtach. Tab. 38. d. & f.
(*e*) Id. Tab. 16. Fig. 7. g. h.
(*f*) Id. Tab. 16. Fig. 7. i. k.
(*g*) Id. Tab. 16. Fig. 7. l. m.
(*h*) Id. Tab. 16. Fig. 7. n. o. Fig. 6. i. k.
(*i*) Id. Tab. 16. Fig. 7. p. q. Fig. 6. l. m.
(*k*) Id. Tab. 16. Fig. 7. r. s. Fig. 6. n. o.
(*l*) Id. Tab. 16. Fig. 7. t. u. Fig. 6. p. q.
(*m*) Id. Tab. 16. Fig. 7. v. w.

vertebræ quartæ (*n*), quintæ (*o*), circa mediam altitudinem prioris partis corporis vertebræ ſextæ, a latere (*p*), inferiori parti tuberculi atlantis, quod is in media priore parte ſua habet (*q*), inferiori parti tuberculi prioris proceſſus transverſi vertebræ colli ſecundæ (*r*), priori parti radicis ſpinæ, quæ eſt juxta priorem partem proceſſus transverſi primæ colli (*s*).

Collum in poſteriora curvatum erigit; curvat deinde in priora, eodemque tempore, modice in latus.

RECTUS CAPITIS INTERNUS MINOR (*a*).

Principio tendinoſo incipit a priore & ſuperiore parte corporis atlantis, juxta radicem proceſſus transverſi, & ab ipſa radice (*b*), adſcendit oblique introrſum, & extremo tendinoſo deſinit ad inferiorem & poſteriorem partem margi-

(*n*) Albin. Tab. 16. Fig. 7. x. y.
(*o*) Id. Tab. 16. Fig. 7. z. α.
(*p*) Id. Tab. 16. Fig. 7. β. γ.
(*q*) Id. Tab. 16. Fig. 7. δ. ε. Fig. 6. t. u.
(*r*) Id. Tab. 16. Fig. 7. ζ. η. θ. Fig. 6. e. f. g.
(*s*) Id. Tab. 16. Fig. 7. ι. κ. Conf. Euſtach. Tab. 41. Fig. 13. Σ. — α. β. γ. δ.

(*a*) Albin. Tab. Muſcul. 17. Fig. 6. a. b. c. d. e. Euſtach. Tab. 41. Fig. 13. Ξ. dextr. & Tab. 38. b. dextr.

(*b*) Albin. Tab. 17. Fig. 6. a. b. b. Euſtach. Tab. 41. Fig. 13. Ξ. — α. α.

ginis ossis occipitis, qui cum petroso leviter connexus, & quidem tuberculo, quod e margine illo, ante processum coronoïdeum, eminet (*c*); juxtaque illud se etiam immiscet materiëi quasi cartilagineæ, quæ implet intervallum, imæ ossis occipitis & petrosi parti ante fissuram, qua exit nervus capitis octavus, interjectum (*d*).

Caput in priora, simulque nonnihil in latus, nutare facit.

RECTUS LATERALIS (*a*).

Oritur a parte priore partis superioris processus transversi atlantis (*b*), oblique versus exteriora adscendit, & extremo extrinsecus tendineo pertinet ad ossis occipitis superficiem inæquabilem, quæ & juxta processum mammillarem est, & juxta posteriorem partem illius marginis ossis occipitis, qui facit posteriorem partem foraminis, quo exit vena jugularis interna (*c*).

Caput in latus & simul nonnihil oblique in priora deprimit.

IN-

(*c*) Albin. Tab. 17. Fig. 6. c. d. Eustach. Tab. 41. Fig. 13 Ξ.--β.β.
(*d*) Albin. Tab. 17. Fig. 6. e.
(*a*) Albin. Tab. Muscul. 17. Fig. 5. a. a. b. c. Eustach. Tab. 41. Fig. 13. Λ. Tab. 38. a.
(*b*) Albin. Tab. 17. Fig. 5. a. a. Eustach. Tab. 41. Fig. 13. Λ.--α.
(*c*) Albin. Tab. 17. Fig. 5. b. c. Eustach. Tab. 41. Fig. 13. Λ.--β.

INTERTRANSVERSARII PRIORES COLLI (*a*).

Primus oritur ab eminentia vertebræ colli primæ, quam illa habet loco radicis prioris processus sui transversi, inferitur inferiori eidemque priori parti tum radicis tuberculi, tum ipsius tuberculi prioris processus transversi secundæ (*b*). Secundi origo est a superiore & posteriore parte tuberculi prioris, radicisque processus transversi vertebræ secundæ, insertio inferiori eidemque priori parti radicis, ipsiusque tuberculi prioris tertiæ (*c*). Tertius oritur, ut secundus, inseritur vertebræ quartæ (*d*). Quarti (*e*), quintique (*f*) origo, ut secundi, inseritur quartus vertebræ quintæ (*g*), quintus inferiori parti radicis processus transversi vertebræ sextæ, marginisque prioris illius partis ejus, qua sustinet atlantem, & proximæ corporis parti, mox infra marginem modo dictum (*h*). Sextus oritur a priore parte radicis prioris

(*a*) Albin. Tab. Muscul. 16. Fig. 8. a.—n.
(*b*) Id. Tab. 16. Fig. 8. a. b.
(*c*) Id. Tab. 16. Fig. 8. c. d.
(*d*) Id. Tab. 16. Fig. 8. e. f.
(*e*) Id. Tab. 16. Fig. 8. g. Fig. 10. a.
(*f*) Id. Tab. 16. Fig. 8. i.
(*g*) Id. Tab. 16. Fig. 8. h.
(*h*) Id. Tab. 16. Fig. 8. k. k.

ris proceſſus transverſi vertebræ ſextæ, inſeritur imo priori margini radicis proceſſus transverſi ſeptimæ (*i*).

Adducunt proceſſus, inter quos intercedunt, ad ſe invicem; ſic collum in latus flectunt, in oppoſitum latus flexum erigunt. Sextus præterea atlantem nonnihil vertit, ideſt, cum is in alterutram partem converſus eſt, reſtituit eum.

INTERTRANSVERSARII POSTERIORES COLLI (*a*).

Primus oritur a parte eadem & ſuperiore & priore proceſſus transverſi primæ colli vertebræ, inſeritur inferiori & poſteriori parti tuberculi poſterioris, vicinoque margini extremo lunato ſecundæ (*b*). Secundus incipit a ſuperiore parte tuberculi poſterioris proceſſus transverſi ſecundæ, deſinit ad inferiorem & poſteriorem partem tuberculi poſterioris, marginisque lunati tertiæ (*c*). Eodem modo oriuntur tertius a vertebra tertia (*d*), quartus a quarta (*e*), ac inſeruntur quartæ (*f*), quintæque (*g*). Quintus pari modo oritur

(*i*) Albin. Tab. 16. Fig. 8. l. m. n.
(*a*) Albin. Tab. Muſcul. 16. Fig. 9. a.—m.
(*b*) Id. Tab. 16. Fig. 9. a. b.
(*c*) Id. Tab. 16. Fig. 9. c. d.
(*d*) Id. Tab. 16. Fig. 9. e.
(*e*) Id. Tab. 16. Fig. 9. g.
(*f*) Id. Tab. 16. Fig. 9. f.
(*g*) Id. Tab. 16. Fig. 9. h.

tur a quinta (*h*), inſeritur autem inferiori ac poſteriori parti proceſſus transverſi ſextæ (*i*). Sextus oritur a ſuperiore parte extremi proceſſus transverſi ſextæ, inſeritur ſeptimæ proceſſus transverſi extremi parti inferiori juxta partem priorem (*k*).

Eorum actio, quæ priorum.

REGIO XXII. SCAPULA CUM SUPERIORE PARTE HUMERI.

In hac regione dantur Deltoïdes (*a*), Supraſpinatus (*b*), Infraſpinatus (*c*) Teres minor (*d*), Teres major (*e*), Subſcapularis (*f*). Muſculos hos extrinſecus ſub communibus corporis totius integumentis veſtit aponeuroſis tenuis, contegens Deltoïdem, nudamque partem Infraſpinati, & Teretis minoris, & inter eos quoque immittit propagines, quibus reliqua eorum obducta. Similis ab interiore parte ſcapulæ veſtit Subſcapularem, Teretem minorem, majorisque par-

(*h*) Albin. Tab. 16. Fig. 9. i.
(*i*) Id. Tab. 16. Fig. 9. k.
(*k*) Id. Tab. 16. Fig. 9. l. m. Fig. 18. q. r.
(*a*) Euſtach. Tab. 34. V. Tab. 35. z.
(*b*) Id. Tab. 37. A. Tab. 38. D.
(*c*) Id. Tab. 37. B. Tab. 39. u.
(*d*) Id. Tab. 37. C.
(*e*) Id. Tab. 36. V. Tab. 38. D.
(*f*) Id. Tab. 38. E.

partim interiorem una cum tendine Latiſſimi dorſi, pariterque propagines inter eos immittit.

DELTOIDES (*a*).

Muſculus hic ex ſeptem portionibus conſtat, in duos ordines diſpoſitis. Portionum primi ordinis prima oritur principio tendineo a parte priore claviculæ (*), qua pars illa concava eſt, & alias quoque a mucrone proceſſus ſuperioris ſcapulæ (*b*); ſecunda, eademque poſterior, principio tendineo, aliquamdiu per exteriora excurrente, incipit a margine inferiore ſpinæ, magnæque partis proceſſus ſuperioris ſcapulæ (*c*); tertia initio tendineo, quod cum principio tendineo portionum, quibus interſertum, conjunctum, incipit ab extremo proceſſus ſuperioris ſcapulæ (*d*); quarta principio tendineo, cum principio ſimili portionum, quibus interſertum, conjuncto, oritur a cubito flectentis ſe proceſſus ſuperioris (*e*). —— Secundi ordinis portio prior principio, quod, ut præcedentia ſic & ſubſequentia, cum prin-

(*a*) Albin. Tab. Muſcul. 18. Fig. 11. a. — n. Fig. 12. a. — o. Euſtach. Tab. 34. V. Tab. 35. z.
(*) Euſtach. Tab. 35. z. — α. α.
(*b*) Albin. Tab. 18. Fig. 11. a. b. b. c. c. Euſtach. Tab. 34. V. -- α. β.
(*c*) Albin. Tab. 18. Fig. 12. a. b. b. c. c.
(*d*) Id. Tab. 18. Fig. 11. g. h. i.
(*e*) Id. Tab. 18. Fig. 12. g. h. i. i.

principio tendineo portionum, quibus interfertum, conjungitur, oritur a mucrone proceffus fuperioris fcapulæ (*f*); media a proceffu fuperiore fcapulæ (*g*); hæc pertinet ad locum medium inter duo tubera oblonga, quæ os humeri ftatim fupra medium longitudinis fuæ habet, & cohæret in fine cum Brachiali interno (*h*); pofterior a margine inferiore fuperioris fcapulæ (*i*). Confluunt portiones omnes, feu ad fe invicem accedunt, & triangularem mufculum formant. Definunt primi ordinis portionum prima, & fecundi ordinis prior ad prius dictorum tuberum offis humeri (*k*); primi ordinis portionum fecunda, & fecundi ordinis pofterior terminantur ad pofterius dictorum tuberum offis humeri oblongorum (*l*), & huic fe etiam primi ordinis portio quarta inferit (*m*).

Subjecta huic mufculo circa proceffum fuperiorem fcapulæ burfa infignis, qualis Iliaco interno cum Pfoa magno.

Os humeri recte attollit in exteriora; oblique autem in priora, fi pars ejus prior prævaleat; in pofteriora, fi pofterior.

S U-

(*f*) Albin. Tab. 18. Fig. 11. d. e. f.
(*g*) Id. Tab. 18. Fig. 11. k. l. Fig. 12. k. l.
(*h*) Id. Tab. 18. Fig. 11. m.
(*i*) Id. Tab. 18. Fig. 12. d. e. f.
(*k*) Id. Tab. 18. Fig. 12. a. d. n.
(*l*) Id. Tab. 18. Fig. 12. a. d. m. m.
(*m*) Id. Tab. 18. Fig. 12. g. Euftach. Tab. 34. V.—γ. Tab. 35. z.—β.

SUPRASPINATUS (*a*).

Insidens cavo, quod supra spinam est (*b*), oritur a posteriore parte dicti cavi, indeque usque ad lunulam, quæ ad radicem processus coracoïdei est (*c*); abit in tendinem, insertum vertici tuberis inæquabilis majoris capitis superioris ossis humeri (*d*), & huic tendini ad postremum accreta capsa est, continens humeri articulum. Attollit os humeri in priora, simulque oblique in exteriora, humerum quoque attrahit ad brachii summa. Cum autem tendini accreta capsa est, una cum Infraspinato, Terete minore, Subscapulari, quibus eadem pariter adhæret, capsam retrahit, ne remanens corrugaretur.

INFRASPINATUS (*a*).

Oritur a dorso scapulæ secundum basem (*b*), ab inferio-re

(*a*) Albin. Tab. Muscul. 18. Fig. 16. a. c. Fig. 17. a. c. Eustach, Tab. 37. A. Tab. 38. D.

(*b*) Albin. Tab. 18. Fig. 16. a.

(*c*) Id. Tab. 18. Fig. 16. b. b. b. Eustach. Tab. 37. A. — α.

(*d*) Albin. Tab. 18. Fig. 16. c. d. Fig. 17. a. b. Eustach. Tab. 37. A. — β. Tab. 38. D. — α.

(*a*) Albin. Tab. Muscul. 18. Fig. 6. a. — h. Eustach. Tab. 37. B. Tab. 39. u.

(*b*) Albin. Tab. 18. Fig. 6. a. b. Eustach. Tab. 37. B. — α. α,

re parte ſpinæ (*c*), ac ſubtus oriri pergit usque ad radicem proceſſus ſuperioris, & infra etiam ex illo ſinu, qui ſecundum oram priorem eandemque inferiorem porrectus. Tendo extus primum incipit apparere (*d*), & ad eum accedunt contrahentis ſeſe muſculi partes carneæ, ſuperior, quæ a ſpina procedit (*e*), inferior, quæ ab angulo inferiore (*f*). Extremum tendineum inſeritur ſuperiori & eidem poſteriori parti tuberis inæquabilis majoris capitis ſuperioris oſſis humeri (*g*).

Brachii partem priorem convertit in exteriora.

TERES MINOR (*a*).

Origo huic eſt a margine ſcapulæ & priore & inferiore, & quidem ab ejus exteriore parte tota, ab angulo inferiore ſcapulæ usque ad cervicem (*b*). Secundum oram illam in latus & in priora adſcendit, pertinetque ad inferiorem eandemque poſteriorem partem tuberis inæquabilis majoris capitis ſuperioris oſſis humeri, finitimæque inferiori parti cervicis,

(*c*) Albin. Tab. 18. Fig. 6. b. c.
(*d*) Id. Tab. 18. Fig. 6. d. Euſtach. Tab. 37. B. — β.
(*e*) Id. Tab. 18. Fig. 6. e.
(*f*) Id. Tab. 18. Fig. 6. f.
(*g*) Id. Tab. 18. Fig. 6. g h.
(*a*) Albin. Tab. Muſcul. 18. Fig. 13. a. — e. Fig. 14. a. a. b. b. Euſtach. Tab. 37. C.
(*b*) Albin. Tab. 18. Fig. 13. a. a. Fig. 14. a. a. b. b.

vicis, partim tendine (*c*), partim portionibus carneis, altera a parte ſuperiore, altera ab inferiore (*d*).

Eadem hujus, quæ præcedentis, cum quo a principio cohæret, actio.

TERES MAJOR (*a*).

Incipit ab exteriore parte anguli inferioris ſcapulæ, ac finitimæ partis oræ prioris (*b*). Longus, craſſus, teres, ad os humeri adſcendit, extremum tendineum format (*c*), inſertum eminentiæ oblongæ oſſis humeri, quæ eſt aliquantum infra tuber capitis ejus ſuperioris inæquabile minus (*d*). Extremo accreta burſula, inter illud atque humeri os. Cum Latiſſimo, Subſcapulari, Infraſpinato, Terete minore cohæret.

Attollit os humeri pone tergum, idem, extrorſum ſua priore parte converſum, vertit modice in contrarium.

SUB-

(*c*) Albin. Tab. 18. Fig. 13. b. c.

(*d*) Id. Tab. 18. Fig. 13. d. e. Euſtach. Tab. 37. C. — β. δ. γ.

(*a*) Albin. Tab. Muſcul. 18. Fig. 9. a. b. b. c. c. Fig. 10. a. a. b. Euſtach. Tab. 36. V. Tab. 37. D.

(*b*) Albin. Tab. 18. Fig. 10. a. a. Euſtach. Tab. 36. V. — α. Tab. 37. D. — α.

(*c*) Albin. Tab. 18. Fig. 10. b. Fig. 9. a. Euſtach. Tab. 38. F. -- α.

(*d*) Albin. Tab. 18. Fig. 9. b. b. c. c. Euſtach. Tab. 38. F. — α.

SUBSCAPULARIS (a).

Fafciculorum, è quibus conftat, primi ordinis quinque oriuntur ab eminentiis, quæ in cava fcapulæ parte juxta bafem ejus funt (b), primus (c), mox infra angulum fuperiorem, quintus (d) ad radicem anguli inferioris, tres reliqui medio loco; omnes principiis tendineis (e). Quinque fafciculorum fecundi ordinis quatuor inferiores (f) interjecti funt primi ordinis quinque, fuperior (g) fupra eorundem fuperiorem; oriuntur ab interiore parte fcapulæ (h). Ordo tertius adeft in intervallis fafciculorum fecundi ordinis, fubjectus primo. Tres hi ordines ortu fuo occupant interiorem amplitudinem fcapulæ, a pofteriore ejus parte fere usque ad cervicem, & prope totam inferiorem marginis rotunduli oræ prioris ejusdemque inferioris. Omnibus extremum commune, tendineum (i), infertum tuberi inæquabili minori capitis fuperioris offis humeri à fummo ad imum

(a) Albin. Tab. Mufcul. 18. Fig. 15. a.--q. Euftach. Tab. 38. E.
(b) Albin. Tab. 18. Fig. 15. a. b. c. d. e.
(c) Id. Tab. 18. Fig. 15. a.
(d) Id. Tab 18. Fig. 15. e.
(e) Id. Tab. 18. Fig. 15. f. f. f. f. f.
(f) Id. Tab. 18. Fig. 15. h. i. k. l.
(g) Id. Tab. 18. Fig. 15. g.
(h) Id. Tab. 18. Fig. 15. m. m. m. m. m. m.
(i) Id. Tab. 18. Fig. 15. n. n. o.

imum (*k*). Infra tendineam hancce partem carnea inferitur offi humero infra tuber modo dictum (*l*).

Os humeri introrfum infigniter vertit, contrario modo atque Infrafpinatus & Teres minor.

REGIO XXIII. HUMERUS.

Humerum occupant Biceps brachii (*a*), Coraco-brachialis (*b*), Brachialis internus (*c*), Triceps brachii, quem Longum (*d*), Brevem (*e*), Brachialem externum (*f*) vocant. Aponeurofes, de quibus in enumeratione mufculorum, præcedenti in Regione fitorum, dictum eft, conjunctæ circa brachium, vaginam efformant, quæ brachium ad cubitum usque circumcirca complectitur, partemque accipit ab inferiore parte tendinis Latiffimi dorfi, itemque a Pectoralis & Serrati antici, qua fecundum axillam decurrunt. Hæc quoque propagines interferit mufculis offi humeri circumpofitis. Procurritque ad cubitum, ubi rurfus por-

(*k*) Albin. Tab. 18. Fig. 15. p. p.
(*l*) Id. Tab. 18. Fig. 15. q. Euftach. Tab. 38. E.—α.
(*a*) Euftach. Tab. 35. T. V.
(*b*) Id. Tab. 33. num. 36.
(*c*) Id. Tab. 38. G. Tab. 37. E. E.
(*d*) Id. Tab. 36. N.
(*e*) Id. Tab. 36. M.
(*f*) Id. Tab. 36. W.

portiones accipit a Bicipite brachii, Brachiali interno, tendine Tricipitis brachii.

BICEPS BRACHII (*a*).

Capita habet duo. Alterum brevius principio extrinfecus tendinofo, cohærente cum Coraco-brachiali (*), oritur a fuperiore parte extremi proceffus coracoïdei fcapulæ (*b*), &, aliquamdiu tendineum, in ventrem abit fatis craffum (*c*). Alterum longius tendine fuo oritur a parte eadem & fuperiore & exteriore marginis finus illius fcapulæ, cum quo caput humeri commiffum (*d*), ubi & continuus tendo ille ligamento, quo augetur ora finus. Inde decurrit per capfam, quæ articulum dictum complectitur, fuper caput offis humeri (*e*), dein per finum, qui eft inter capitis illius duo tubera inæqualia (*f*), retineturque ligamento tendineo, lato, tenui, fic ut in quacunque humeri pofitura nunquam elabi ex canali poffit. Hoc caput pariter in ventrem tranfit

(*a*) Albin. Tab. Mufcul. 19. Fig. 3. a. — k. Fig. 4. a. a. Euftach. Tab. 35. T. V.

(*) Euftach. Tab. 35. R.

(*b*) Albin. Tab. 19. Fig. 3. a. b. Euftach. Tab. 35. V. Tab. 33. n. 31.

(*c*) Albin. Tab. 19. Fig. 3. c.

(*d*) Id. Tab. 19. Fig. 3. d. Euftach. Tab. 35. T. — α. β.

(*e*) Albin. Tab. 19. Fig. 3. d. — e. Euftach. Tab. 35. T. — α.

(*f*) Albin. Tab. 19. Fig. 3. e. — f. Euftach. Tab. 35. T. — β.

ſit (g), amboque in communem confluunt (h), qui vertitur in tendinem craſſum, longum (i). Hic, mox ſupra flexum cubiti, aponeuroſem vaginæ tendineæ cubiti dat (k), ac dein inſeritur tuberculi, quod è radio infra cervicem ejus eminet, parti poſteriori, per longitudinem ejus totam (l); prior pars lævis eſt, ad eam ſe tendo, cum prona manus, inflectit, interjectaque burſa tenuis & parva, veſtiens ab una parte tuberculum, ab altera tendinem, utrique accreta, ut & finitimæ parti Supinatoris brevis.

Radium, circa ulnam converſum, vertit in contrarium, manum ergo ſupinam reddit. Flectit articulum cubiti, cum radius vel juxta ulnam rectus eſt, vel circa eam converſus retinetur, ne ab eo convertatur.

CORACO-BRACHIALIS (a).

Communis huic ortus cum capite breviore Bicipitis brachii, a proceſſu coracoïdeo ſcapulæ (b); poſtquam pars dicti

(g) Albin. Tab. 19. Fig. 3. g. Euſtach. Tab. 35. T.

(h) Albin. Tab. 19. Fig. 3. h. Euſtach. Tab. 35. T. V. — γ.

(i) Albin. Tab. 19. Fig. 3. i. Euſtach. Tab. 35. T. V. — δ.

(k) Albin. Tab. 19. Fig. 3. k.

(l) Id. Tab. 19. Fig. 4. a. a. Euſtach. Tab. 35. T. V. — ε.

(a) Albin. Tab. Muſcul. 18. Fig. 7. a.—g. Fig. 8. a. b. c. d. Euſtach. Tab. 33. n. 36.

(b) Albin. Tab. 18. Fig. 7. b. Fig. 8. a. Euſtach. Tab. 35. R. Tab. 33. n 31.

dicti Bicipitis Coraco-brachialem reliquit, excurſus tendinoſus per carnem Coraco-brachialis pergit (*c*). Deſcendit juxta os humeri, ſeſeque inſerit poſteriori parti amplitudinis interioris oſſis humeri, infra mediam illius oſſis longitudinem (*d*).

Admovet humeri os ad latus corporis rectius, quam Biceps; introrſus converſum vertit ſimul extrorſum. Os humeri ſcapulamque attrahit ad ſe mutuo.

BRACHIALIS INTERNUS (*a*).

Bicorne principium eſt, quo ab oſſe humeri oritur, ambiens inferiorem partem tuberum, quibus Deltoïdes inſertus (*b*). Unde porro oritur ab amplitudine oſſis illius, quæ infra tubera illa, inde fere usque ad condylos; ad priorem usque. Senſim intumeſcens ad cubiti articulum pertingit, tum detumeſcit, extrinſecus tendineus fit (*c*), aponeuroſem, ut Biceps, demittit, ſed tenuiorem, per interiora cubiti deſcendentem, dein ſeſe inſerit interiori parti capitis ſuperioris ulnæ (*d*).

Fle-

(*c*) Albin. Tab. 18. Fig. 7. c. d. d. e.

(*d*) Id. Tab. 18. Fig. 7. g. Euſtach. Tab. 33. n. 36. *α*.

(*a*) Albin. Tab. Muſcul. 19. Fig. 1. a.—f. Fig. 2. a. b. b. c. c. Euſtach. Tab. 38. G. Tab. 37. E. E.

(*b*) Albin. Tab. 19. Fig. 1. a. b. cornu prius Fig. 2. a. b. b. cornu poſterius Fig. 1. c. c. c. Euſtach. Tab. 38. G.— *α*. *α*.

(*c*) Albin. Tab. 19. Fig. 1. e.

(*d*) Id. Tab. 19. Fig. 1. f.

Flectit cubitum, movendo ulnam, aut &, firmata ea quantum ſatis, humeri os.

TRICEPS BRACHII.

Diſtinguunt hunc in Longum, Brevem, & Brachialem externum.

Longus (*a*) tendine ſuo oritur ab imo cervicis ſcapulæ, finitimæque partis oræ, quæ infra cervicem eſt (*b*). Brevis (*c*) procedit ab exteriore parte oſſis humeri, à radice cervicis caput ſuperius ſuſtinentis, per longitudinem humeri; primo leniter incurvo ductu usque ad poſteriorem partem finis Deltoïdis, dein ſecundum eum, ſecundumque poſteriorem partem cornu prioris Brachialis interni, ipſiusque deinde Brachialis, usque ad humeri marginem priorem (*d*), relictoque in medio longitudinis humeri intervallo (*e*), per quod inſignis nervus cum arteria & vena procedit, rurſus deinde aliquamdiu ſecundum marginem eundem. Brachialis externus (*f*) incipit ab exteriore parte oſſis hu-

(*a*) Albin. Tab. Muſcul. 19. Fig. 6. e. f. g. h. Euſtach. Tab. 36. N.
(*b*) Albin. Tab. 19. Fig. 6. e. f. g. Euſtach. Tab. 36. N. — α.
(*c*) Albin. Tab. Muſcul. 19. Fig. 6. a. b. c. c. c. d. Fig. 5. l. m. Euſtach. Tab. 36. M.
(*d*) Albin. Tab. 19. Fig. 6. c. c. c. Euſtach. Tab. 36. M. — α.
(*e*) Albin. Tab. 19. Fig. 5. n.
(*f*) Albin. Tab. Muſcul. 19. Fig. 5. c. d. e. e. f. f. Euſtach. Tab. 36. W.

humeri, ſummo quidem initio ſuo juxta inferiorem partem illius, cui Teres major inſertus; inde hoc margine ſuo priore, obliquo ductu usque ad marginem priorem humeri, poſt a margine illo usque ad radicem condyli; porroque ab exteriore parte radicis illius, per altitudinem ejus totam (g). Initio ſuo occupat amplitudinem oſſis, quæ priore ortus margine, & poſteriore (h), ubi a margine oſſis humeri etiam procedit, continetur. Tres hi tendinem communem (i) formant, in quem Brevis jam cito tranſit, & juxta Longum, quam alibi, citius; eique ſe Longi fibræ carneæ continua per longitudinem ſerie adjungunt, & inferiore quoque parte extrinſecus tendinea pars, quam Longus efficit (k). Ab interiore parte Longus tendinem latum a parte Brevis efficit, & ad eum Brevis fibræ, ut extrinſecus Longi ad Brevem, accedunt. Adjungit etiam partem tendineam tendini communi Brachialis internus (l), qui etiam ſua ſe carne partim jungit carni Brevis & Longi, partim tendinibus eorum. Emittit hic Brachialis externus partem tendineam, ad condylum humeri majorem pertinentem

(g) Albin. Tab. Muſcul. 19. Fig. 7. d. e. f. f. f. g. Euſtach. Tab. 36. W. — a.

(h) Albin. Tab. 19. Fig. 5. e. e.

(i) Id. Tab. 19. Fig. 6. k. Fig. 7. l.

(k) Id. Tab. 19. Fig. 6. l.

(l) Id. Tab. 19. Fig. 6. m. Fig. 7. n.

tem (*m*). Tendo communis inſeritur præcipue exteriori parti verticis olecrani (*n*), mucro ejus tenuior definit ad priorem partem olecrani, & ad ſpinam, quæ continuo ab ea ex ulna eminet (*o*).

Cubitum extendit Triceps, movens ulnam, eaque ſatis firmata os humeri. Longus brachium ad corporis latus, modiceque ad tergum, trahit.

REGIO XXIV. CUBITUS.

In cubito dantur Supinator longus (*a*), Radialis externus longior (*b*), Radialis externus brevior (*c*), Extenſor communis digitorum manus (*d*), Extenſor proprius digiti minimi manus (*e*), Ulnaris externus (*f*), Anconeus (*g*), Supinator brevis (*h*), Abductor longus pollicis manus (*i*), Extenſor minor pollicis manus (*k*), Ex-

(*m*) Albin. Tab. 19. Fig. 6. n. o. Fig. 5. i. k.
(*n*) Id. Tab. 19. Fig. 6. p. q. Fig. 7. o. o. Euſtach. Tab. 36. M. N. — δ.
(*o*) Albin. Tab. 19. Fig. 6. r. Euſtach. Tab. 36. M. N. — ε.
(*a*) Euſtach. Tab. 35. W. Tab. 28. n. 30.
(*b*) Id. Tab. 36. Z. Tab. 33. n. 52.
(*c*) Id. Tab. 37. F.
(*d*) Id. Tab. 29. n. 28. Tab. 34. W. X. Y.
(*e*) Id. Tab. 29. n. 27. Tab. 34. a.
(*f*) Id. Tab. 29. n. 26. Tab. 34. Z.
(*g*) Id. Tab. 37. G.
(*h*) Id. Tab. 39. Fig. 1. w. dextr. & w. w. ſin.
(*i*) Id. Tab. 36. O. Tab. 29. n. 32. Tab. 33. n. 59.
(*k*) Id. Tab. 36. P. Tab. 29. n. 35. Tab. 33. n. 60.

Extenſor major pollicis manus (*l*), Indicator (*m*), Ulnaris internus (*n*), Palmaris longus (*o*), Radialis internus (*p*), Pronator teres (*q*), Sublimis (*r*), Profundus (*s*), Flexor longus pollicis manus (*t*), Pronator quadratus (*u*).

Quæ muſculos, oſſi humeri circumpoſitos, complectitur, & propagines illis interſerit, vagina, acceptis portionibus a Bicipite brachii, Brachiali interno, tendine Tricipitis brachii, ad cubitum procurrens, veſtit in illo vaginam tendineam, quam producit commune caput, quod a condylo priore oſſis humeri oritur, atque originem præbet Radiali externo breviori, Extenſori communi digitorum manus, Extenſori proprio auricularis, Ulnari externo, quæque vagina, tendinea, craſſa, conſtat e faſciculis tendineis deſcendentibus inſignibus, præterea tenſa arcte complectitur muſculos, qui in exteriore cubiti parte, a Radiali externo breviore, usque ad poſteriora ulnæ, donec ſpinæ ejus illi, quæ infra olecranon porrecta, adhæreat, & muſculis, ſe-

(*l*) Albin. Tab. 34. q. Tab. 29. n. 36.
(*m*) Id. Tab. 34. r. Tab. 29. n. 37.
(*n*) Id. Tab. 35. Θ. Tab. 37. H. Tab. 37. H. Tab. 30. Ψ.
(*o*) Id. Tab. 35. Δ.
(*p*) Id. Tab. 35. Γ.
(*q*) Id. Tab. 32. n. 29. Tab. 33. n. 51.
(*r*) Id. Tab. 33. n. 53.
(*s*) Id. Tab. 38. L.
(*t*) Id. Tab. 38. K. Tab. 33. n. 55.
(*u*) Id. Tab. 38. V.

ſepimentorum inſtar, propagines interſerit. Veſtit præterea ſupra dicta, muſculos oſſi humeri circumpoſitos complectens, vagina etiam illam, quam producit caput commune, a condylo poſteriore oſſis humeri enaſcens, & originem præbens Ulnari interno, Palmari longo, Radiali interno, Pronatori tereti, Sublimi; hæc aponeuroſis muſculos cubiti extrinſecus obducit, & portiones inter muſculos dimittit, craſſa eſt, ſenſimque dum deſcendit, ſe dilatat. Ad eam accedit alia; quæ a poſteriore parte olecrani, & poſtea a ſpina ulnæ procedit, ſic ut ex duabus his fiat una vagina, quæ ad inferiora cubiti deſcendens muſculos continet (ν). Veſtit denique muſculos, qui inter fines duarum illarum vaginarum in interiore parte cubiti nudi ab iis ſunt, atque ibi tenues propagines eis interſerit.

SUPINATOR LONGUS (a).

Oritur principio tendineo ab inferiore parte marginis prioris oſſis humeri, mox ſupra ortum Radialis externi longioris (b), juxta cubitum deſcendit, in media fere ejus longitudine abit in tendinem, ab ea parte, qua adjacet Radiali

ex-

(ν) Conf. de his aponeuroſibus Albin. Hiſt. Muſcul. Lib. 3. pag. 449. 469.

(a) Albin. Tab. Muſcul. 19. Fig. 16. a.—g. Euſtach. Tab. 35. W. Tab. 28. n. 30.

(b) Albin. Tab. 19. Fig. 16. a. b. c. d. d.

externo, citius incipientem, & infertum priori parti capitis inferioris radii, ad principium illius finus, per quem fe a cubito ad manum demittunt tendines pollicis Abductoris longi, & Extenforis minoris (*c*).

Radium circa ulnam in utramque partem convertit, ficque manum non modo ex prona facit fupinam, fed ex fupina pronam. Flectit quoque articulum cubiti, quem præterit.

RADIALIS EXTERNUS LONGIOR (*a*).

Oritur a margine priore offis humeri, & a condylo priore (*b*), conjungit fe, communemque ortum habet cum Extenfore communi digitorum manus, & Ulnari externo (*c*). Per cubitum defcendit ad dorfum manus per priorem partem finus fecundi capitis inferioris radii, qui prior exteriorum, & retinetur ligamento armillari exteriore (*d*). Tendo, in quem abit, inferitur parti & exteriori & priori radicis capitis fuperioris offis metacarpi indicis (*e*).

Car-

(*c*) Albin. Tab. 19. Fig. 16. f. g. Euftach. Tab. 35. W. — α. β.

(*a*) Albin. Tab. Mufcul. 19. Fig. 13. a. — g. Fig. 14. a. — h. Euftach. Tab. 36. Z. Tab. 33. n. 52.

(*b*) Albin. Tab. 19. Fig. 13. a. a b. Fig. 14. a.

(*c*) Id. Tab. 5. C. in cubito. Tab. 19. Fig. 13. c.

(*d*) Id. Tab. 19. Fig. 13. æ. Fig. 14. h. Tab. 5. n. 16. in manu dextra. Tab. 9. ζ. in manu finiftra. Tab. 1. e. in brachio finiftro.

(*e*) Id. Tab. 19. Fig. 13. e. f. Fig. 14. f. g. Euftach. Tab. 36. Z. -- γ.

Carpum extrorſum, ſimulque oblique in priora flectit; cubitum quoque flectit, præſertim ſi is non ſit, quantum poteſt, extenſus.

RADIALIS EXTERNUS BREVIOR (*a*).

Incipit a condylo priore oſſis humeri, communi capite tendineo cum Extenſore digitorum communi, auricularis proprio, Ulnari externo (*b*). Ita autem muſculi illi a principio cohærent, ut aut dici poſſint communi tendine ab oſſe humeri oriri, qui deinde propagines, ſepimentorum inſtar, iis interſerat, a quibus fibræ eorum porro procedant, quorumque cohæreant interventu: aut propagines illæ alterutri duorum, quibus interſertæ ſunt, muſculorum accenſeri, & pro tendinoſo principii excurſu haberi, a quo alterius fibræ procedant. Quamvis ad ſingulos potius pars & principii tendinei communis, & ſepimenti pertineat, ſed quæ partes ita ſtricte connexæ & conjunctæ ſunt inter ſe, ut commune omnibus tendineum principium, communesque ejus propagines, quibus duo quique inter ſe proximi conjuncti ſint, & referant, & ſint.

Sic

(*a*) Albin. Tab. Muſcul. 19. Fig. 11. l.—r. Fig. 12. a.—e. Euſtach. Tab. 37. F.

(*b*) Albin. Tab. 19. Fig. 11. l. m. n. n. Fig. 12. a. Conf. Hiſt. Muſcul. Lib. 3. pag. 449. Euſtach. Tab. 37. F.—α.

Sic ortus per cubitum descendit ad dorsum manus per posteriorem partem sinus secundi capitis inferioris radii, qui prior exteriorum, retineturque ligamento armillari exteriore (c). Tendo, in quem abit, inseritur præcipue priori, eidemque exteriori, parti radicis capitis superioris ossis metacarpi digiti medii; itemque proximo capiti superiori metacarpi indicis (d). Tendo a principio diu excurrit per musculum: pars interior tendinosa est (e).

Manum flectit, magis in exteriora, quam longior; in priora minus.

EXTENSOR COMMUNIS DIGITORUM MANUS (a).

Oritur ab extremo condylo priore ossis humeri, capite communi, in præcedentis musculi descriptione exposito (b). Caro, inde nata, modice intumescit, dein findit se in tres portiones graciles (c), in gracilem tendinem abeuntes (d), qui

(c) Albin. Tab. 19. Fig. 11. r. Fig. 12. d. Tab. 5. n. 16. in manu dextra. Tab. 9. ζ. in manu sinistra. Tab. 1. e. in brachio sinistro.

(d) Id. Tab. 19. Fig. 11. p. q. Fig. 12. b. c.

(e) Id. Tab. 19. Fig. 11. n. n. o.

(a) Albin. Tab. Muscul. 20. Fig. 1. a. — z. Eustach. Tab. 29. n. 28. Tab. 34. W. X. Y.

(b) Albin. Tab. 20. Fig. 1. a. b. c.

(c) Id. Tab. 20. Fig. 1. f. g. i. l.

(d) Id. Tab. 20. Fig. 1. g. i. k. m. n.

qui per finum tertium capitis inferioris radii, qui eft exteriorum pofterior, procedunt, ubi ligamento armillari exteriori retinentur (*e*), & ad indicem, medium, atque annularem pertinent. Qui ad indicem pertinet (*f*), cum Indicatoris tendine (*g*), tendinem communem format (*h*), per indicem incedit, conjunctus cum tendinibus & aponeurofibus Interoffei pofterioris indicis (*i*) & Lumbricalis primi (*k*), dein ab iis relictus (*l*) extremo fuo inferitur tuberculo oblongo transverfoque, quod in fuperiore capite offis ordinis fecundi, a parte externa (*m*). Tendo, ad digitum medium pertinens (*n*), qua per manum incedit, incifuram (*o*) habet, qua per digitum, conjungitur cum tendine, Interoffeo priori digiti medii cum Lumbricali fecundo communi (*p*), & cum tendine Interoffei pofterioris digiti medii (*q*), dein ab iis relictus eodem modo, ac tendo indi-

(*e*) Albin. Tab. 5. n. 16. in manu dextra. Tab. 1. e. in brachio finiftro. Tab. 9. ζ. in manu finiftra.

(*f*) Id. Tab. 20. Fig. 1. f. g.

(*g*) Id. Tab. 20. Fig. 1. V.

(*h*) Id. Tab. 20. Fig. 1. h.

(*i*) Id. Tab. 20. Fig. 1. ψ. ξ.

(*k*) Id. Tab. 20. Fig. 1. φ. ɼ.

(*l*) Id. Tab. 20. Fig. 1. λ.

(*m*) Id. Tab. 20. Fig. 1. μ.

(*n*) Id. Tab. 20. Fig. 1. i.

(*o*) Id. Tab. 20. Fig. 1. k.

(*p*) Id. Tab. 20. Fig. 1. C. ν.

(*q*) Id. Tab. 20. Fig. 1. E. π.

dicis, definit (r). Qui ad annularem pertinet tendo (s), in progreſſu ſuo per dorſum manus inciſuram (t) habet; ejus ramus quandoque adjungit ſe tendini digiti medii (u), alius ramus (v) ſe findit in duos, quorum alter, non tamen ſemper inventus, adjungit ſe tendini Auricularis (w); alter (x) rurſus in duos ſe dividit, alteroque (y) pariter accedit ad tendinem auricularis (z), immo potius ad tendinem (a), cum tendine auricularis conjunctum; altero (b) ad truncum tendinis annularis (c): abſcedit porro a tendine annularis (d), accedens ad tendinem auricularis (e), ſeu potius ad tendinem (f), qui cum tendine auricularis conjungitur. Qua per digitum ſuum incedit tendo annularis (g) conjungitur cum tendine, Interoſſeo prio-

ri

(r) Albin. Tab. 20. Fig. 1. ι. λ. μ.
(s) Id. Tab. 20. Fig. 1. l. m.
(t) Id. Tab. 20. Fig. 1. n.
(u) Id. Tab. 20. Fig. 1. o.
(v) Id. Tab. 20. Fig. 1. p.
(w) Id. Tab. 20. Fig. 1. q. ε.
(x) Id. Tab. 20. Fig. 1. r.
(y) Id. Tab. 20. Fig. 1. s.
(z) Id. Tab. 20. Fig. 1. ε. ζ.
(a) Id. Tab. 20. Fig. 1. q.
(b) Id. Tab. 20. Fig. 1. t.
(c) Id. Tab. 20. Fig. 1. m. n.
(d) Id. Tab. 20. Fig. 1. u. n.
(e) Id. Tab. 20. Fig. 1. ε. ζ.
(f) Id. Tab. 20 Fig. 1. q.
(g) Id. Tab. 20. Fig. 1. θ.

ri annularis cum Lumbricali tertio communi (*h*), & cum tendine Interoſſei poſterioris digiti annularis (*i*), dein, ab iis relictus eodem modo, ut tendines indicis & medii, deſinit (*k*).

Truncus tendinis, ad annularem pertinentis (*l*), cum tendine auricularis (*m*) conjungitur ad initia digitorum, portione tendinea (*n*), & infra hanc aponeuroſi (*o*). Præterea truncus tendinis, ad annularem pertinentis, conjungitur cum tendine medii (*p*) juxta digitorum radices, portione tendinea (*q*). Inter tendinem denique medii, & tendinem indicis (*r*) aponeuroſis (*s*) datur, quæ eosdem juxta digitorum initia conjungit inter ſe.

Extendit oſſa digitorum ſecundi ordinis, illa etiam primi, ac dein in exteriora flectit. Cum totus agit, diducit digitos. Carpum, ni obſirmetur, in exteriorem partem flectit.

EX-

(*h*) Albin. Tab. 20. Fig. 1. I. ϱ.
(*i*) Id. Tab. 20. Fig. 1. L. σ.
(*k*) Id. Tab. 20. Fig. 1. θ. λ. μ.
(*l*) Id. Tab. 20. Fig. 1. m. n.
(*m*) Id. Tab. 20. Fig. 1. ε. ζ.
(*n*) Id. Tab. 20. Fig. 1. v.
(*o*) Id. Tab. 20. Fig. 1. w.
(*p*) Id. Tab. 20. Fig. 1. i.
(*q*) Id. Tab. 20. Fig. 1. x.
(*r*) Id. Tab. 20. Fig. 1. g.
(*s*) Id. Tab. 20. Fig. 1. z. Conf. Hiſt. Muſcul. Icon. 4.

EXTENSOR PROPRIUS AURICULARIS (*a*).

Communi cum præcedenti capite producitur ab extremo condylo priore oſſis humeri (*b*), deſcendit, tendinemque format, quem ſubjicit ligamento armillari exteriori (*c*), qui ſub eo per ſingularem, ſibique proprium, canalem, ubi cum ulna radius commiſſus, ſe demittit; qua per dorſum manus decurrit, leviter fiſſus eſt (*d*); qua per digitum, conjungitur cum tendine, qui Interoſſeo priori auricularis & Lumbricali quarto communis eſt (*e*), ac cum tendine communi Abductoris Flexoriſque parvi digiti auricularis (*f*); ab iis porro recedens deſinit (*g*), ut tendines Extenſoris communis digitorum, cum quorum ultimo, ut dictum, in dorſo manus, cohæret. Præſtat eadem auriculari, quæ Extenſor communis reliquis digitis.

U L-

(*a*) Albin. Tab. Muſcul. 20. Fig. 1. α. ζ. Euſtach. Tab. 29. n. 27. Tab. 34. a.

(*b*) Albin. Tab. 20. Fig. 1. β.

(*c*) Id. Tab. 5. n. 16. in manu dextra. Tab. 1. e. in brachio ſiniſtro. Tab. 9. ζ. in manu ſiniſtra.

(*d*) Id Tab. 20. Fig. 1. ζ. Euſtach. Tab. 29. n. 27.

(*e*) Albin. Tab. 20. Fig. 1. τ. P. Hiſt. Muſcul. Icon. 4. b. t.

(*f*) Id. Tab. 20. Fig. 1. υ. R. Hiſt. Muſcul. Icon. 4. w.

(*g*) Id. Tab. 20. Fig. 1. π. λ. μ. Hiſt. Muſcul. Icon. 4. z. in digito minimo.

ULNARIS EXTERNUS (a).

Incipit principio tendineo, quod pariter ad commune caput, fupra dictum, pertinet, ab exteriore parte condyli prioris offis humeri (b). Pars præterea tenuis, fatisque lata, fe circa mediam ulnæ longitudinem, infra finem Anconei, à margine ulnæ eodem & priore & exteriore ad hunc mufculum demittit. Præterea oritur a vagina tendinea, quæ, poft integumenta communia, complectitur mufculos, qui in exteriore cubiti parte fiti funt (c). Ubi ulnæ longitudinis medium fuperavit, ab exteriore parte migrat in tendinem (d), qui procedit per finum eundem & priorem & exteriorem extremæ ulnæ (e), ibique retinetur ligamento (f), ac dein inferitur fuperiori parti eminentiæ, quæ ad pofticam partem capitis fuperioris offis metacarpi manus quarti eft (g).

Flectit carpum in pofteriorem, & aliquantum in exteriorem, partem, in quam idcirco manum attollit. Manum ex

(a) Albin. Tab. Mufcul. 19. Fig. 15. a.—g. Euftach. Tab. 29. n. 26. Tab. 34. Z.

(b) Albin. Tab. 19. Fig. 15. a — b.

(c) Id. Tab. 19. Fig. 15. c.

(d) Id. Tab. 19. Fig. 15. e. Euftach. Tab. 34. Z.—β.

(e) Albin. Tab. 19. Fig. 15. f.

(f) Id. Tab. 5. n. 14. 15. 17. in manu dextra, quod & in manu finiftra γ. α. Tab. 9. ζ. in manu finiftra.

(g) Id. Tab. 19. Fig. 15. g. Euftach. Tab. 34. Z.—γ.

ex ſupina cogit aliquantum in pronum, ex prona in ſupinum.

ANCONEUS (a).

Oritur tendine anguſto, ſatis craſſo, ab exteriore & eadem inferiore parte condyli minoris humeri (b), pergit ad ulnam, & inſeritur priori parti olecrani, ſtatim infra Brachialem externum; porroque margini exteriori ulnæ infra modo dictam olecrani partem (c).

Cubitum extendit.

SUPINATOR BREVIS (a).

Mox infra ortum capitis tendinei communis modo dicti, oritur a parte inferiore extremi condyli prioris humeri (b); ab exteriore parte capſæ articulum radii cum humero & ulna continentis (c); ab eminentia, quæ in priore parte ulnæ infra ſinum ejus, cum quo radii caput commiſſum, incipiens, deorſum aliquantum exporrecta (d). Tendit in priora

(a) Albin. Tab. Muſcul. 19. Fig. 8. a. b. c. c. Euſtach. Tab. 37. G.
(b) Albin. Tab. 19. Fig. 8. a. b. Euſtach. Tab. 37. G.—α.
(c) Albin. Tab. 19. Fig. 8. c. c. Euſtach. Tab. 37. G.—γ. γ.
(a) Albin. Tab. Muſcul. 19. Fig. 17. a.—g. Fig. 18. a.—e. Euſtach. Tab. 39. Fig. 1. w. dextr. & w. w. ſin.
(b) Albin. Tab. 19. Fig. 17. a. b.
(c) Id. Tab. 19. Fig. 17. c. c. d. e.
(d) Id. Tab. 19. Fig. 17. e. f. Euſtach. Tab. 39. Fig. 1. w.—α. α.

ra deorſum, recta primum petens radium, &, cum eum attigit, ſe circum eum flectit, imprimis ſuperiore parte ſua, qua ſe ei lunato ductu inſerit, juxta ſuperiora eminentiæ radii, cui inſertus Biceps brachii (*e*), porro ſecundum ambitum tuberculi, quod eſt proxime ante dictam eminentiam, a ſuperiore parte ejus per priorem ad inferiorem (*f*); poſt fere usque ad mediam radii longitudinem, per internam radii partem oblique in priorem, perque hanc in exteriorem (*g*).

Radium circa ulnam converſum, in contrarium vertit; quo ſimul manum pronam reddit ſupinam.

ABDUCTOR LONGUS POLLICIS MANUS (*a*).

Procedit ab ulnæ ſpina, ſtatim ſupra ulnæ medium, ab exteriore parte, juxta inferiorem partem Supinatoris brevis (*b*), a radii amplitudine exteriore, juxta inferiorem partem ejusdem Supinatoris, è regione ortus ab ulna (*c*), & ſubtus quoque a parte exteriore ligamenti, quod

(*e*) Albin. Tab. 19. Fig. 18. b. Euſtach. Tab. 39. Fig. 1. w. -- γ. γ.
(*f*) Albin. Tab. 19. Fig. 18. c. c. c.
(*g*) Id. Tab. 19. Fig. 18. d. d.
(*a*) Albin. Tab. Muſcul. 20. Fig. 18. a. — h. Fig. 19. a. — f. Euſtach. Tab. 36. O. Tab. 29. n. 32. Tab. 33. n. 59.
(*b*) Albin. Tab. 20. Fig. 18. a. a. b. b. Euſtach. Tab. 36. O. -- α. α.
(*c*) Albin. Tab. 20. Fig. 18. d e. e.

quod inter ulnam radiumque interjectum intermedium, inter duas ab offibus origines media. Defcendit, circum radium fe flectit (*). Pars fuperior abit in tendinem (*d*), cujus pars inferta internæ parti offis multanguli majoris, juxta pollicem (*e*), portio accedit ad Abductorem brevem (*f*). Pars inferior pariter in tendinem abit (*g*), infertum tuberculo, quod eft in priore & eadem interna parte capitis fuperioris offis metacarpi pollicis, fupra marginem ejus internum (*h*). Delabuntur autem, ut loca illa attingere poffent, tendines per finum priorem capitis inferioris radii, fub ligamento (*i*).

Pollicem, fi metacarpus ejus in volam flexus fuerit, à manu in priora fimul & interiora abducit. Si pergat, metacarpum flectit rectius in priora, poft in priora extrorfum.

EXTENSOR MINOR POLLICIS MANUS (*a*).

Incipit mox infra præcedentem ab exteriore parte fpinæ ul-

(*) Euftach. Tab. 29. m. 32. Tab. 33. n. 59.
(*d*) Albin. Tab. 20. Fig. 18. g. Fig. 19. b. c.
(*e*) Id. Tab. 20. Fig. 19. d.
(*f*) Id. Tab. 20. Fig. 19. e. Fig. 16. e.
(*g*) Id. Tab. 20. Fig. 18. h. Fig. 19. f. g.
(*h*) Id. Tab. 20. Fig. 19. h.
(*i*) Id. Tab. 5. n. 20. in manu dextra. Tab. 9. *n*. in manu finiftra. Tab. 1. *v*. in brachio.
(*a*) Albin. Tab. Mufcul. 20. Fig. 23. a. — f. Euftach. Tab. 36. P. Tab. 29. n. 35. Tab. 33. n. 60.

ulnæ, cui adnexum ligamentum, quod inter cubiti oſſa intercedit (*b*), infraque illam originem à modo dicto ligamento; acceditad ſinum priorem capitis inferioris radii (*c*), ſub ligamento quodam (*d*). Tendo (*e*), in quem abit, ex interiore carnis parte primum exoritur, a poſteriore dein & ab exteriore carnem accipiens, forma pennata. Hujus extremum ſe dilatat, extenuat, & cum interiore margine tendinis Extenſoris majoris ſe conjungit (*f*). Extremum autem commune inſeritur tuberculo oblongo & transverſo, è priore eademque ſuperiore parte pollicis oſſis ultimi eminenti (*g*).

Extendit utrumque os pollicis, flectitque in priora. Solummodo agit in primum os, quando ad id pertinet.

EXTENSOR MAJOR POLLICIS MANUS (*a*).

Hujus ortus eſt ab exteriore parte ulnæ, fere in medio longitudinis ejus, & infra quoque a ligamento, quod ab ulna

(*b*) Albin. Tab. 20. Fig. 23. a. b. Euſtach. Tab. 36. P. — α. α.
(*c*) Id. Tab. 20. Fig. 23. c.
(*d*) Id. Tab. 5. n. 20. in manu dextra. Tab. 1. υ. in brachio. Tab. 9. κ. in manu ſiniſtra.
(*e*) Euſtach. Tab. 33. n. 60.
(*f*) Albin. Tab. 20. Fig. 23. e. Euſtach. Tab. 33. n. 60. — 65.
(*g*) Albin. Tab. 20. Fig 23. f.
(*a*) Albin. Tab. Muſcul. 20. Fig. 22. a. — f. Euſtach. Tab. 34. q. Tab. 29. n. 36.

ulna ad radium deductum (*b*). Cum modice descendit, in tendinem satis crassum (*c*) abit, qui, accedentibus ad eundem per longitudinem fibris, ut ad pennam plumæ, increscit, ac decurrit per eum parvum radii sinum, qui est mox pone illum, per quem Radialium externorum tendines transeunt, sub carpi ligamento armillari exteriore (*d*), pergit, ad dorsum pollicis se flectit, cum tendine Extensoris minoris pollicis se conjungit (*e*), & extremo communi desinit ad tuberculum oblongum & transversum, è priore eademque superiore parte pollicis ultimi ossis eminenti (*f*). Adjungit se tendini communi Extensorum pollicis aponeurosis (*g*), cujus pars ambit capsam articuli pollicis cum metacarpo suo, innexa capsæ illi; pars procedit à cauda posteriore Flexoris brevis pollicis (*h*). Ab altero latere accipit aponeurosem ab Abductore brevi pollicis (*i*). Extendit, & in priora flectit ultimum os pollicis, primum quoque.

I N.

(*b*) Albin. Tab. 20. Fig. 22. a. a. b. Eustach. Tab. 34. q. — α.
(*c*) Albin. Tab. 20. Fig. 22. d. Eustach. Tab. 34. q. — β.
(*d*) Id. Tab. 5. n. 16. in manu dextra.
(*e*) Id. Tab. 20. Fig. 22. e. Fig. 23. c. Hist. Muscul. Icon. 4. I. Eustach. Tab. 34. r. Tab. 33. n. 68.
(*f*) Albin. Tab. 20. Fig. 22. f. g. Fig. 23. e. f. Hist. Muscul. Icon. 4. K. Eustach. Tab. 34. r. α.
(*g*) Albin. Tab. 20. Fig. 22. h. Fig. 23. g. Hist. Muscul. Icon. 4. L.
(*h*) Albin. Tab. 6. n. 4. 5. in manu dextra. Hist. Muscul. Icon. 4. M. Eustach. Tab. 33. n. 66.
(*i*) Id. Tab. 20. Fig. 16. d. Hist. Muscul. Icon. 1. k.

INDICATOR (*a*).

Oritur juxta poſteriorem partem Extenſoris majoris pollicis ab exteriore parte ſpinæ ulnæ, circa mediam ulnæ longitudinem incipiens; poſt & infra Extenſoris modo dicti ab ulna ortum; a ligamento, cubiti oſſibus interjecto, juxta ulnam (*b*). Tendo ejus cum Extenſore digitorum communi ſub ligamento manus armillari exteriore (*c*), per communem cum Extenſore illo ſinum decurrit; comes tendini ejus, indicem petenti (*d*), cum eo ſe conjungit, efficitque communem tendinem (*e*), qui ad os ſecundi ordinis pertinet.

Extendit indicis os primum, ſecundum, tertium; primum in exteriora quoque flectit, & ſimul etiam modice retrorſum, medium digitum verſus.

ULNARIS INTERNUS (*a*).

Ut a condylo priore humeri varii muſculi communi principio

(*a*) Albin. Tab. Muſcul. 20. Fig. 12. a. — f. Euſtach. Tab. 34. r. Tab. 39. n. 37.

(*b*) Albin. Tab. 20. Fig. 12. a. b. b. Euſtach. Tab. 34. r. — α.

(*c*) Albin. Tab. 5. n. 16. in manu dextra. Euſtach. Tab. 34. r. — β.

(*d*) Euſtach. Tab. 39. n. 37. 37.

(*e*) Albin. Tab. 20. Fig. 12. d. e. f. Fig. 1. V. b. κ. λ. μ. ν. ξ.

(*a*) Albin. Tab. Muſcul. 19. Fig. 10. 11. a. — h. Euſtach. Tab. 35. Θ. Tab. 37. H. Tab. 30. Ψ.

cipio oriuntur, ſic a condylo poſteriore Ulnaris internus, Palmaris longus, Radialis internus, Sublimis, communi capite tendineo incipiunt, cum quo Pronatoris teretis principium cohæret. Caputque illud propagines, ſepimentorum inſtar, demittit inter eos, quibus illi propaginibus a principio cohæreant, ſive potius, quarum partes ad ſingulos pertineant. Cohærentque omnes cum vagina tendinea cubiti.

Oritur ergo Ulnaris internus ex dicto capite a condylo poſteriore humeri (*b*); a poſteriore margine olecrani, non multum infra finem tendinis Tricipitis brachii (*c*). Continuatio quædam principii hujus abſcedit a vagina tendinea cubiti (*d*), ſeu potius principio tendineo tenui, cum vagina illa conjuncto in unum, oritur cum ea, ab ulnæ ſpina, quæ continuo ab olecrani poſteriore parte eminet (*e*). Tendo, in quem abit, inſeritur gibbæ parti oſſis ſubrotundi carpi, qua parte illud maxime in interiora eminet (*f*).

Manum flectit, introrſum ac ſimul oblique retrorſum attollit.

PAL-

(*b*) Albin. Tab. 19. Fig. 10. a. b. Fig. 11. a. b.
(*c*) Id. Tab. 19. Fig. 11. c. Fig. 10. d.
(*d*) Id. Tab. 19. Fig. 10. e. e. f. f. g.
(*e*) Id. Tab. 19. Fig. 11. d. d. e. e. k. k.
(*f*) Id. Tab. 19. Fig. 10. h. i. Fig. 11. h. Euſtach. Tab. 35. Θ. — β. γ.

PALMARIS LONGUS (*a*).

Principium hujus tendineum oritur ab extrema interiore parte condyli poſterioris oſſis humeri (*b*), quod principium deinde per eum excurrit (*c*); pertinetque ad caput tendineum commune, quo cum aliis ab hoc condylo oritur. Abit mox in ventrem tumidulum, dein in tendinem (*d*) longum, planum, tenuem, qui deſcendit ad medium volæ initium, ligamento carpi accreſcit; poſt per volam procedit, & in aponeuroſem (*e*) dilateſcit, partem accipientem a ligamento carpi interiore. Ea aponeuroſis primum leviter diſtinguitur in quatuor portiones (*f*), ad digitos procedentes, deinde magis, ut non niſi filis tendineis transverſis (*g*) cohæreant. Portio quæque, ad digitum pertinens, abit in extrema bicornia (*h*); eaque, Sublimis & Profundi tendinem ambientia, ſe adnectunt ligamento transverſo, quod eſt ad radices digitorum, cujusque tum illam partem, quæ inter duo

(*a*) Albin. Tab. Muſcul. 20. Fig. 26. a. — o. Euſtach. Tab. 35. Δ.

(*b*) Albin. Tab. 20. Fig. 26. a. b.

(*c*) Id. Tab. 20. Fig. 26. c.

(*d*) Id. Tab. 20. Fig. 26. d. Euſtach. Tab. 35. Δ. — β.

(*e*) Albin. Tab. 20. Fig. 26. e. Euſtach. Tab. 35. Δ. — γ.

(*f*) Albin. Tab. 20. Fig. 26. f. g. h. i. Euſtach. Tab. 25. Δ. -- δ. ε. ζ. η.

(*g*) Id. Tab. 20. Fig. 26. k. k. k.

(*h*) Id. Tab. 20. Fig. 26. l. l., l. l., l. l., l. l. Euſtach. Tab. 32. n. 47.

duo cujusque portionis cornua (*i*), tum illam, quæ inter cornua duarum inter ſe proximarum portionum (*k*), veſtit. Et ad ſuperiorem quoque ejus ligamenti partem exigua ſe portione affigunt mediæ latitudini partis internæ oſſium metacarpi. In principio volæ abſcedit aponeuroſis ad principium Abductoris brevis pollicis (*l*). Sæpe ventre ac tendine Palmaris caret (*m*), ſolaque tum adeſt aponeuroſis (*n*).

Cutem volæ leniter contrahit, percutit. Carpum flectit in partem internam.

RADIALIS INTERNUS (*a*).

Oritur communi ſupradicto principio ab extremo condyli poſterioris oſſis humeri (*b*); quandoque una cum Sublimi etiam a radio. Per cubitum oblique deſcendit. Tendo, in quem abit (*c*), tranſit per ſingularem canalem membranaceum, qui eſt ad priorem partem ligamenti, quo tendines a cubito ad manum decurrentes ab interiore carpi parte ob-

(*i*) Albin. Tab. 20. Fig. 26. m. m. m. m.
(*k*) Id. Tab. 20. Fig. 26. n. n. n.
(*l*) Euſtach. Tab. 35. Δ. — θ.
(*m*) Euſtach. Tab. 30. in brachio dextro.
(*n*) Id. Tab. 30. n. 12.
(*a*) Albin. Tab. Muſcul. 19. Fig. 9. a. b. c. d. e. Euſt. Tab. 35. r.
(*b*) Albin. Tab. 19. Fig. 9. a. b.
(*c*) Id. Tab. 19. Fig. 9. c. Euſtach. Tab. 35. r. — β.

obducti (*d*); dein per sinum oblongum, qui est in interna parte ossis multanguli majoris (*e*), & ad postremum inseritur mediæ internæ eidemque superiori parti capitis primi metacarpi indicis (*f*).

Flectit carpum, convertit radium cum manu. Manum retrorsum flexam, retento interim radio, primo modicum attollit in priora introrsum, deinde in internam partem fere recta; post introrsum in posteriora surgere facit; radio libero, eum simul convertit per priora introrsum, cum eoque manum in pronum.

PRONATOR TERES (*a*).

Oritur ab interiore & eadem superiore parte condyli posterioris ossis humeri (*b*), proxime ante caput tendineum commune; partim a sepimento, quod inter eum & Radialem internum, partim a parte tendinea, quæ per exteriora Sublimis decurrit. Descendit obliquius, petitque radium. Tendinem circa medium longitudinis incipit efficere

(*d*) Albin. Tab. 1. Ω. W. in manu dextra. Tab. 2. p. in manu dextra. Tab. 3. S. in manu dextra. Hist. Muscul. Icon. 1. a. B.

(*e*) Id. Tab. 19. Fig. 9. d.

(*f*) Id. Tab. 19. Fig. 9. e.

(*a*) Albin. Tab. Muscul. 19. Fig. 19. a. a. b. c. Fig. 20. a. b. b. Eustach. Tab. 32. n. 29. Tab. 33. n. 51.

(*b*) Albin. Tab. 19. Fig. 19. a. a.

cere (c), qui in latam tenuitatem deſinit, inſertam ſuperficiei inæquabili, quæ ejus cauſſa in media gibba parte radii eſt (d).

Convertit radium circum ulnam, unde radium ſequens manus prona fit. Radio ſic converſo, aut, ne convertatur, retento, cubitum flectere poteſt, præſertim ſi is jam modice ſit flexus.

S U B L I M I S (a).

Praeterquam quod cum capite communi, jam deſcripto, cohæreat, oritur ab interiore parte condyli majoris humeri, principio tendineo, a dicto capite ſeparato (b); a ligamento, quod ab inferiore parte condyli poſterioris humeri ad poſticam capitis ſuperioris ulnæ, juxtá imam ſinus ejus lunati, pertinet (c); a priore parte ulnæ eminentiæ, cui Brachialis internus inſertus, juxta finem Brachialis illius (d); capite amplo & tenui ab interna parte longitudinis fere mediæ radii, juxta finem Supinatoris brevis & Pronatoris teretis

(c) Albin. Tab. 19. Fig. 19. b.

(d) Id. Tab. 19. Fig. 20. a. b. b. b.

(a) Albin. Tab. Muſcul. 20. Fig. 4. a. — w. Fig. 5. a. b. c. c. Euſtach. Tab. 33. n. 53.

(b) Albin. Tab. 20. Fig. 4. a. b.

(c) Id. Tab. 20. Fig. 5. a. c. c.

(d) Id. Tab. 20. Fig. 4. c. d.

tis (*e*). Per cubitum incedens venter finditur in quatuor tendines (*f*), qui, non omnes æque cito orti, procedunt per interiorem concavam carpi partem, ſub ligamento carpi interiore (*g*), & divergentes (*) per volam, per internam dein digitorum partem incedunt (†). In dicto canali & inter ſe & cum tendinibus Profundi, Flexoriſque longi pollicis, & cum canali, conjunguntur natura membranea, tendinoſa, laxa. Idem locum habet in cubito, in vola, ubi, laxioribus vinculis, cum tendinibus Profundi cohærent, & in vola etiam cum Lumbricalibus. Qua incedunt ſecundum articulos digitorum cum metacarpo (*h*), & dein per ipſos digitos (*i*), quisque una cum Profundi tendine vaginas ſibi obductas habet, quibus retinentur. Hæ vaginæ, ſemiorbiculatæ, craſſæ, duræ, naturæ quaſi inter tendineam & cartilagineam mediæ, ab utroque oſſis margine oriuntur, cumque ipſo oſſe canalem efficiunt, qui tendine Profundi & Sublimis impletur, ſic ut in eo liberri-me

(*e*) Albin. Tab. 20. Fig. 4. e. f. g. g. Euſtach. Tab. 33. n. 53. — β.

(*f*) Albin. Tab. 20. Fig. 4. i. k., l. m., n. o., p. q. Euſtach. Tab. 33. n. 53.

(*g*) Albin. Tab. 2. l. in manu dextra. Euſtach. Tab. 33. n. 70.

(*) Euſtach. Tab 33. n. 73. 73. 73. 73.

(†) Albin. Hiſt. Muſcul. Icon. 1. Π. Σ. Φ. Icon. 2. V. W. X. Icon. 3. M. N. O. P. Q. R.

(*h*) Id. Tab. 1. n. 4. 4. 4. &c.

(*i*) Id. Tab. 1. n. 3. &c. in manu dextra. Hiſt. Muſcul. Icon. 1. Λ. Ψ.

me mobiles ſint, nec tamen, flectendo digitos, recedere quicquam poſſint (‡). Quæ circa articulos dantur vaginæ, tenuiores, laxiores, molliores ſunt.

Omnes tendines, per longitudinem fiſſi (*), in cornua duo deſinunt (*k*), inſerta interiori parti mediæ longitudinis marginum oſſis ſecundi ordinis, alterum priori, alterum poſteriori (*l*); tranſit tendo Profundi (*m*), & ſub eo cornua parte tenuiore cohærent inter ſe (*n*), & vaginulam extremis ſuis ſubeunt, quæ ad interiorem partem oſſiculi ſecundi eſt (*o*).

Flectit digitorum oſſa, tum ſecundi tum primi ordinis, in partem internam; & dum flectit digitos, adducit eos ad ſe mutuo. Manum, ſi eo tempore mox firmetur, in partem internam flectit, & convertit in pronum.

PROFUNDUS (*a*).

Oritur a tota illa ulnæ amplitudine, quæ eſt infra radicem

(‡) Albin. Hiſt. Muſcul. Icon. 1. Λ. Ψ.

(*) Id. Hiſt. Muſcul. Icon. 2. W. X. Euſtach. Tab. 32. n. 55. 55. 55. 55.

(*k*) Albin. Tab. 20. Fig. 4. s. t. Hiſt. Muſcul. Icon. 2. W. X.

(*l*) Id. Tab. 20. Fig. 4. u. v. Hiſt. Muſcul. Icon. 2. α. β. Icon. 3. t. u.

(*m*) Id. Hiſt. Muſcul. Icon. 2. W. X.

(*n*) Id. Tab. 20. Fig. 4. w. Hiſt. Muſcul. Icon. 3. P.

(*o*) Id. Tab. 1. n. 5. &c. Hiſt. Muſcul. Icon. 1. Σ. Φ. Ψ.

(*a*) Albin. Tab. Muſcul. 20. Fig. 2. a. a. Fig. 3. a.—p. Euſtach. Tab. 38. L.

cem olecrani, & infra ſuperficiem inæqualem, cui affixus Brachialis internus (*b*), infra quam porro ortu ſuo occupat partem plusquam dimidiam ſuperiorem ulnæ amplitudinis internæ. Procedit etiam a vicina parte ligamenti, quod intercedit ulnam inter radiumque, ex parte è vagina tendinea, quæ extrinſecus datur, & ſepimentis, inde demiſſis. Findit ſe vel in quatuor craſſos tendines, vel in tres (*c*), quorum primus tunc abit in tendinem indicis (*d*), ſecundus in tendinem medii (*e*), tertius (*f*) in duos (*g*), quorum alter digiti annularis eſt (*h*), alter auricularis (*i*). Tendines hi per carpi ſinum interiorem ſe trajiciunt (*k*), ſub ligamento carpi interiore (*l*). Qua per volam digitosque decurrunt, per longitudinem quodammodo fiſſi, & quaſi e duobus inter ſe connexis conſtructi ſunt (*m*). Qua ſecundum articulos digitorum cum metacarpo incedunt, una cum

(*b*) Albin. Tab. 20. Fig. 3. b.b.b. Fig. 2. a. a.
(*c*) Id. Tab. 20. Fig. 3. d.e.f. Euſtach. Tab. 38. L. α. β. γ. δ.
(*d*) Albin. Tab. 20. Fig. 3. d. g. h.
(*e*) Id. Tab. 20. Fig. 3. e. i. k.
(*f*) Id. Tab. 20. Fig. 3. f.
(*g*) Id. Tab. 20. Fig. 3. l. m., n. o.
(*h*) Id. Tab. 20. Fig. 3. l. m.
(*i*) Id. Tab. 20. Fig. 3. n. o.
(*k*) Id. Tab. 20. Fig. 3. g. i. l. n.
(*l*) Id. Tab. 3. N. in manu dextra. Euſtach. Tab. 32. n. 36.
(*m*) Albin. Tab. 20. Fig. 3. h. k. m. o. Hiſt. Muſcul. Icon. 2. γ. γ.

cum Sublimi tendinibus vagina quadam obducuntur (n), qua fecundum offa digitorum primi ordinis, ut & fecundi, alia vagina, craffa, dura, continentur (o), ut in defcriptione Sublimis dictum eft. Transeunt per tendines Sublimis (p), ad poftremum inferuntur afperæ fuperficiëi, quæ in interiore parte offium tertii ordinis, ad radicem capitis eorum fuperioris (q). Ubi per carpum, vaginasque incedunt, cohærent eodem modo & inter fe, & cum vicinis partibus, ut Sublimis.

Flectit, & convertit manum, ut Sublimis.

FLEXOR LONGUS POLLICIS MANUS (a).

Prima huic origo eft a radio; cujus amplitudinem internam, prope a tuberculo, cui infertus Biceps brachii, fere ad Pronatorem quadratum usque, fuo occupat initio (b). Oritur & a ligamento interjecto ulnæ radioque. Accedit rarius portio, exili tendine oriens, a condylo majore humeri, quæ in tendinem abit, ad carnem Flexoris fefe adjun-

(n) Albin. Tab. 1. n. 4. 4. 4. &c. in manu dextra.
(o) Id. Tab. 1. n. 3. 5. &c. in manu dextra.
(p) Id. Hift. Mufcul. Icon. 2. Y. Y. W. X.
(q) Id. Tab. Mufcul. 20. Fig. 4. p. p. p. p. Hift. Mufcul. Icon. 1. γ.
(a) Albin. Tab. Mufcul. 20. Fig. 21. a. — k. Euftach. Tab. 38. K. Tab. 33. n. 55.
(b) Albin. Tab. Mufcul. 20. Fig. 21. a. a. Euftach. Tab. 38. K. Tab. 33. n. 55. — α. α.

jungentem (*c*). Venter jam ante medium longitudinis ſuæ producit tendinem (*), qui tranſit per ſinum carpi interiorem, ſub ligamento (*d*), porro ad pollicem inter oſſa ſeſamoïdea incedit (*e*), ſecundum os primum pollicis ligamento coërcetur (*f*), & denique oſſis ultimi pollicis parti poſticæ fere mediæ, quæ eminet aſperula, inſeritur (*g*). Qua ſecundum metacarpum pollicis, pollicemque incedit, per longitudinem quodammodo fiſſus eſt (*h*).

Flectit pollicis os ultimum primumque in volam.

PRONATOR QUADRATUS (*a*).

Incipit ab oblonga eminentia, quæ eſt in inferiore & eadem poſteriore ulnæ parte, non multum ſupra caput ejus inferius (*b*), per transverſum incedit, & mox inſeritur inferio-

(*c*) Albin. Tab. 20. Fig. 21. c. d. e. f.
(*) Euſtach. Tab. 38. K. — β.
(*d*) Albin. Tab. 3. N. in manu dextra. Euſtach. Tab. 32. n. 37. Tab. 33. n. 55.
(*e*) Id. Tab. 20. Fig. 21. h.
(*f*) Id. Tab. 1. Σ. in manu dextra.
(*g*) Id. Tab. 20. Fig. 21. k. Euſtach. Tab. 38. K. — γ.
(*h*) Albin. Tab. 20. Fig. 21. i.
(*a*) Albin. Tab. Muſcul. 19. Fig. 21. a. — c. Fig. 22. a. a. b. b. Euſtach. Tab. 38. V.
(*b*) Albin. Tab. 19. Fig. 21. b. b. Fig. 22. b. b. Euſtach. Tab. 38. V. — α. α.

feriori parti radii, tum amplitudini ejus interiori, tum margini, qui ex adverso ulnæ est (c).

Manum convertit in pronum, radium convertens circum ulnam.

REGIO XXV. MANUS.

Manui appositi sunt Lumbricales (a), Abductor brevis pollicis manus (b), Abductor brevis alter pollicis (b. b), Opponens pollicis (c), Flexor brevis pollicis (d), Adductor pollicis (e), Palmaris brevis (f), Abductor digiti minimi (g), Flexor parvus digiti minimi (h), Adductor metacarpi digiti minimi (i), Interossei manus interni (k), Interossei manus externi (l), Abductor indicis

(c) Albin. Tab. 19. Fig. 20. c. c. Eustach. Tab. 38. V.—β.

(a) Eustach. Tab. 38. M. N. O. P.

(b) Id. Tab. 32. n. 33. dextr. Albin. Hist. Muscul. Icon. 1. F.

(b.b) Albin. Tab. Muscul. 20. Fig. 17. a. b. c.

(c) Eustach. Tab. 33. n. 69. Albin. Hist. Muscul. Icon. 2. E.

(d) Eustach. Tab. 38. Π. Σ. Albin. Hist. Muscul. Icon. 1. K, L.

(e) Eustach. Tab. 38. Ξ. Albin. Hist. Muscul. Icon. 1. M.

(f) Eustach. Tab. 35. Z. Tab. 32. n. 49.

(g) Eustach. Tab. 33. n. 72. Tab. 36. Q. Hist. Muscul. Icon. 1. C. Icon. 4. Ω.

(h) Alb. Tab. Muscul. 20. Fig. 10. a. b. c. Hist. Muscul. Icon. 1. D.

(i) Id. Tab. 20. Fig. 25. a. b. c. c. Hist. Muscul. Icon. 2. D. Icon. 1. E. E.

(k) Prior indicis Eustach. Tab. 39. Fig. 1. x. Albin. Hist. Muscul. Icon. 3. & 2. G. Icon. 4. Δ. Posterior indicis Eustach. Tab. 39. Fig. 1. y. Albin. Hist. Muscul. Icon. 2. H. Prior annularis Eustach. Tab. 39. Fig. 1. B. Albin. Hist. Muscul. Icon. 1. P. Icon. 2. L. Prior auricularis Eust. Tab. 39. Fig. 1. D. Albin. Hist. Musc. Icon. 3. A. Icon. 1. 2. N.

cis (*m*). Ut ſub integumentis volæ manus aponeuroſis datur, de qua in deſcriptione Palmaris longi (*n*) dictum eſt, ſic a cubito per dorſum manus digitorumque procurrit tenuis aponeuroſis, quæ quadam vaginularum ſpecie complectitur tendines.

LUMBRICALES (*a*).

Quatuor numero ſunt. Primus oritur a crasſiore parte duarum illarum, in quas tendo Profundi, ad indicem pertinens, per longitudinem fiſſus quodammodo eſt; et ab illa tendinis parte procedit, quæ obverſa aponeuroſi Palmaris longi (*b*). Tendo ſe conjungit cum communi tendine Extenſorum indicis, & deinde ad indicis os tertium pertinet (*c*). Conjungit aponeuroſem cum aponeuroſi Abductoris indicis, unaque cum ea adjungit communi tendini Extenſorum indicis (*d*). — Secundus incipit inſigniore par-

(*l*) Prior medii Euſtach. Tab. 39. Fig. 1. z. Albin. Hiſt. Muſcul. Icon. 3. E. F. Icon. 4. Θ. Λ. Poſterior medii Euſtach. Tab. 39. Fig. 1. A. Albin. Hiſt. Muſcul. Icon. 3. C. D. Icon. 4. Ξ. Π. Poſterior annularis Euſtach. Tab. 39. Fig. 1. C. Albin. Hiſt. Muſcul. Icon. 3. B. Icon. 4. Σ. Φ.

(*m*) Euſtach. Tab. 56. r. Tab. 33. n. 64.

(*n*) Vide pag. 253.

(*a*) Albin. Tab. Muſcul. 20. Fig. 3. q.—t. u.—y. z.—δ. ε.—ω. Euſtach. Tab. 38. M. N. O. P.

(*b*) Albin. Tab. 20. Fig. 3. r. r.

(*c*) Albin. Tab. 20. Fig. 3. s. Fig. 1. φ. Fig. 6. β.

(*d*) Id. Tab. 20. Fig. 3. t.

parte a crasſiore parte earum, in quas tendo Profundi, ad digitum medium pertinens, per longitudinem fiſſus quodammodo eſt; & ab illa quidem partis illius parte, quæ obverſa aponeuroſi Palmaris longi (e); dein minus inſigni a tendine ad indicem pertinente, tenuiore autem parte ejus, & ab illa quidem præcipue partis hujus parte oritur, quæ ſpectat profunda volæ (f). Tendo (g) conjunctus cum tendine Interoſſei prioris digiti medii, communem cum eo tendinem (h), efficit, conjungentem ſe cum tendine Extenſoris communis, & ad os tertium digiti medii pertinentem. —— Tertius, ad ſimilitudinem ſecundi, inſigniore parte oritur a crasſiore parte earum, in quas tendo Profundi, ad digitum annularem pertinens, per longitudinem fiſſus quodammodo oſt (i); & minus inſigni a tendine ad digitum medium pertinente, tenuiore autem parte ejus (k). Tendo (l), conjunctus cum tendine Interoſſei prioris digiti annularis, communem cum eo tendinem efficit (m), conjungentem ſe cum tendine Extenſoris communis, & ad os

(e) Albin. Tab. 20. Fig. 3. v. v.
(f) Id. Tab. 20. Fig. 3. w.
(g) Id. Tab. 20. Fig. 3. x.
(h) Id. Tab. 20. Fig. 3. y. Fig. 8. e. Fig. 1. C.
(i) Id. Tab. 20. Fig 3. z. α. α.
(k) Id. Tab. 20. Fig. 3. z. β.
(l) Id. Tab. 20. Fig. 3. γ.
(m) Id. Tab. 20. Fig. 3. δ. Fig. 7. l. Fig. 1. I.

os tertium digiti annularis pertinentem (*n*). — Quartus ad ſimilitudinem ſecundi inſigniore parte procedit a craſſiore parte earum, in quas tendo Profundi, ad digitum auricularem pertinens, per longitudinem fiſſus quodammodo eſt (*o*); & minus inſigni a tenuiore parte tendinis ad annularem pertinentis (*p*). Tendo, conjunctus cum tendine Interoſſei prioris digiti auricularis, communem cum eo tendinem efficit (*q*), conjungentem ſe cum tendine Extenſoris auricularis, & ad os tertium digiti illius pertinentem.

Oſſa primi ordinis in volam flectunt, ac ſimul oblique in priora.

ABDUCTOR BREVIS POLLICIS MANUS (*a*).

Oritur a ligamento carpi interiore (*b*). Recta decurrit ad caput ſuperius primi oſſis pollicis, format tendinem, qui partim inſeritur internæ, eidemque priori, parti capitis ſupe-

(*n*) Albin. Tab. 20. Fig. 3. ε. ζ. ζ.
(*o*) Id. Tab. 20. Fig. 3. ε. η.
(*p*) Id. Tab. 20. Fig. 3. θ.
(*q*) Id. Tab. 20. Fig. 3. ι. Fig. 7. q. Fig. 1. P.
(*a*) Albin. Tab. Muſcul. 20. Fig. 16. a.—e. Hiſt. Muſcul. Icon. 1. F. Euſtach. Tab. 32. n. 43. dextr.
(*b*) Albin. Tab. 20. Fig. 16. a. Hiſt. Muſcul. Icon. 1. h. Euſtach. Tab. 32. n. 43. dextr.

ſuperioris oſſis primi pollicis (*c*), partim conſcendit dorſum pollicis, & coit cum priore parte tendinum Extenſorum pollicis, & ſe porro per exteriora eorundem tendinum continuat ſimili aponeuroſi Flexoris brevis pollicis (*d*). Tendo partis ſuperioris Abductoris longi pollicis dat portionem huic Abductori brevi (*e*).

Totum pollicem a reliqua manu abducit in interiora ſimul & aliquantum in poſteriora.

ABDUCTOR BREVIS ALTER POLLICIS MANUS (*a*).

Ortus ejus eſt ab inferiore eademque exteriore parte ligamenti carpi interioris (*b*); extremo autem tendineo inſeritur internæ, eidemque priori, parti capitis ſuperioris osſis primi pollicis (*c*).

OPPONENS POLLICIS MANUS (*a*).

Oritur ab oſſis multanguli majoris eminentia priore earum, quæ

(*c*) Albin. Tab. 20. Fig. 16. b. c. Hiſt. Muſcul. Icon. 1. i.
(*d*) Id. Tab. 20. Fig. 16. d. Hiſt. Muſcul. Icon. 3. k.
(*e*) Id. Tab. 20. Fig. 16. e. Fig. 19. e.
(*a*) Albin. Tab. Muſcul. 20. Fig. 17. a. b. c.
(*b*) Id. Tab. 20. Fig. 17. a.
(*c*) Id. Tab. 20. Fig. 17. b. c.
(*a*) Albin. Tab. Muſcul. 20. Fig. 15. a.—e. Hiſt. Muſcul. Icon. 2. E. Euſtach. Tab. 33. n. 69.

quæ faciunt finum, per quem decurrit tendo Radialis interni (*b*), & a ligamento carpi (*c*). Procedit ad pollicis metacarpum, & inferitur ejus internæ amplitudini, ad caput ejus inferius, & præterea amplitudinis illius margini priori toti (*d*).

Flectit ita pollicem, ut eum primo introrfum fimulque retrorfum abducat a manu, dein convertat, internamque ejus partem volæ manus, digitisque opponat, fere directo.

FLEXOR BREVIS POLLICIS MANUS (*a*).

Ab interiore parte inferioris partis offis multanguli minoris, capitati, cuneiformis oritur (*b*); ut & ab eminentia interna multanguli majoris. Infraque ortum ab offibus illis, etiam incipit a capitibus vicinis offium metacarpi indicis & medii digiti, fæpe & annularis & pollicis; a ligamento carpi interiore (*c*). Findit fe in caudas duas (*d*), quarum altera inferitur fuperiori parti illius offium fefamoïdeorum, quæ appo-

(*b*) Albin. Tab. 20. Fig. 15. a. Hift. Mufcul. Icon. 2. k.

(*c*) Id. Tab. 20. Fig. 15. b. b. b. Hift. Mufcul. Icon. 2. i. i. Euftach. Tab. 33. n. 69.

(*d*) Albin. Tab. 20. Fig. 15. c. d. d. Hift. Mufcul. Icon. 2. m.

(*a*) Albin. Tab. Mufcul. 20. Fig. 20. a. — k. Hift. Mufcul. Icon. 1. K. L. Euftach. Tab. 38. Π. Σ.

(*b*) Albin. Tab. 20. Fig. 20. a. b. c. Euftach. Tab. 38. Π. Σ. α. β. γ. δ.

(*c*) Id. Hift. Mufcul. Icon. 1. l.

appofita ad articulum pollicis cum metacarpo ejus, quod ab indice remotius (e); altera offi fefamoïdeo, quod indici propius; & fuperiori quidem ejus parti, illique, quæ indici propior (f); dein & mox infra illud proximæ parti laterali capitis fuperioris osfis primi pollicis (g). Cauda, quæ indici propior, producit aponeurofem, quæ fe cum aponeurofi, ambiente capfam articuli pollicis cum metacarpo fuo, conjungit, unaque cum ea adjungit extremo communi tendinum Extenforum pollicis (h).

Flectit os primum pollicis in volam; ejusdem metacarpum in pofteriorem partem, ac fimul, pro vario ejus fitu vel ad volam, vel fecundum eam, vel ab ea modice introrfum.

ADDUCTOR POLLICIS MANUS (a).

Incipit ab interiore parte capitis fuperioris offis metacarpi digiti annularis, juxta os metacarpi digiti medii (b); indeque ab interna amplitudine offis metacarpi digiti medii (c).

Infe-

(d) Albin. Tab. 20. Fig. 20. d. e. f., g. h. i. k. Hift. Mufcul. Icon 2. K. L.

(e) Id. Tab. 20. Fig. 20. e. f. Hift. Mufcul. Icon. 1. m.

(f) Id. Tab. 20. Fig. 20. h. i. Hift. Mufcul. Icon. 1. n.

(g) Id. Tab. 20. Fig. 20. k. Hift. Mufcul. Icon. 1. o.

(h) Id. Tab. 4. r. in manu finiftra. Hift. Mufcul. Icon. 4. N. M. L.

(a) Albin. Tab. Mufcul. 20. Fig. 24. a.—d. Hift. Mufcul Icon. 1. M. Euftach. Tab. 38. Ξ.

(b) Albin. Tab. 20. Fig. 24. a.

(c) Id. Tab. 20. Fig. 24. b. b. Hift. Mufcul. Icon. 1. p.

Inferitur extremum tendineum ei parti capitis fuperioris offis primi pollicis, quæ fpectat indicem (*d*).

Adducit pollicem ad mediam volam.

PALMARIS BREVIS (*a*).

Hic, in fafciculos inæqualiter diftinctus, abfcedit a principio aponeurofis Palmaris longi, & ab exteriore parte ligamenti carpi interioris juxta pollicem (*b*); extrema abeunt in tendineum manus, poft integumenta fequens, & ad os metacarpi manus quartum pertinens, involucrum (*c*).

Principium volæ ex transverfo contrahit, eoque fimul in interiora idem furgit.

ABDUCTOR DIGITI MINIMI MANUS (*a*).

Incipit ab interiore & a pofteriore parte eminentis rotundæ partis offis fubrotundi (*b*), & a proxima ligamenti carpi inte-

(*d*) Albin. Tab. 20. Fig. 24. c. d. Hift. Mufcul. Icon. 4. P.

(*a*) Albin. Tab. Mufcul. 20. Fig. 26. p. p. q. q. r. r. Euftach. Tab. 35. Z. Tab. 32. n. 49.

(*b*) Albin. Tab. 20. Fig. 26. q. q. Euftach. Tab. 35. Z.

(*c*) Albin. Tab. 20. Fig. 26. r. r.

(*a*) Albin. Tab. Mufcul. 20. Fig. 11. a.--g. Hift. Mufcul. Icon. 1. C. Icon. 4. Ω. Euftach. Tab. 33. n. 72. Tab. 36. Q. Tab. 38. W.

(*b*) Albin. Tab. 20. Fig. 11. a. Hift. Mufcul. Icon. 1. D. d. Euftach. Tab. 38. W. —α.

interioris (*c*). Deſcendit rectius, definitque in duos tendines, quorum alter (*d*) inſeritur poſteriori parti capitis ſuperioris oſſis primi digiti minimi, mox infra ſummum ejus marginem (*e*); alter (*f*) ſe conjungit cum tendine Flexoris parvi (*g*); communisque ex eo factus tendo, ſubtus ſe ſtatim infra extremum tendineum ſupradictum (*h*), eidem capiti, ubi id inæquabiliter eminet, inſerit; dein adjungit ſe tendini Extenſoris proprii auricularis (*i*), eique aponeuroſem dat (*k*).

Abducit digitum minimum ab annulari, poſt flectit in volam.

FLEXOR PARVUS DIGITI MINIMI MANUS (*a*).

Origo ei ab exteriore parte ligamenti carpi (*b*); e media parte extremi proceſſus incurvi oſſis cuneiformis carpi (*c*). Ex

(*c*) Albin. Tab. 20. Fig. 11. b.
(*d*) Id. Tab. 20. Fig. 11. c.
(*e*) Id. Tab. 20. Fig. 11. d.
(*f*) Id. Tab. 20. Fig. 11. e.
(*g*) Id. Tab. 20. Fig. 11. f. Fig. 6. i.
(*h*) Id. Tab. 20. Fig. 11. d.
(*i*) Id. Tab. 20. Fig. 11. g. Fig. 10. d. Fig. 1. R. Hiſt. Muſcul. Icon. 1. g. Icon. 4. x. Euſtach. Tab. 36. Q. — α.
(*k*) Albin. Tab. 5. e. Tab. 6. k. Tab. 7. l. in manu dextra.
(*a*) Albin. Tab. Muſcul. 20. Fig. 10. a. b. c. Hiſt. Muſcul. Icon. 1. D.
(*b*) Id. Tab. 20. Fig. 10. a. Hiſt. Muſcul. Icon. 1. f.
(*c*) Id. Tab. 20. Fig. 10. b.

Ex tendine, conjuncto cum tendine Abductoris, fit tendo communis (*d*), qui se conjungit cum tendine Extenſoris auricularis proprio, acceptaque ab eo portione auctus, decurrit ad os tertium hujus digiti (*e*).

Os minimi primi ordinis, totumque adeo digitum illum, flectit in volam, pollicem verſus.

ADDUCTOR OSSIS METACARPI DIGITI MINIMI (*a*).

Procedit à poſteriore eademque paulo infra mediam parte extremi ferme proceſſus incurvi oſſis cuneiformis carpi (*b*); & a proxima exteriore ligamenti carpi interioris infra proceſſum illum (*c*), inſeritur oſſi metacarpi minimi, juxta capita ejus; & inter ea etiam per totam longitudinem; poſteriori ſcilicet & eidem interiori parti oſſis illius (*d*).

Attollit os metacarpi auricularis in partem internam manus, trahitque ſimul aliquantum verſus pollicem, ſequente etiam metacarpi tertio; quo volam facit ab ea parte magis concavam, dorſum manus rotundum.

IN-

(*d*) Albin. Tab. 20. Fig. 10. c. d.
(*e*) Id. Tab. 20. Fig. 1. R. *v*. S. T. U.
(*a*) Albin. Tab. Muſcul. 20. Fig. 25. a. b. c. c. Hiſt. Muſcul. Icon. 2. D. icon. E. E.
(*b*) Id. Tab. 20. Fig. 25. a. Hiſt. Muſcul. Icon. 2. f.
(*c*) Id. Tab. 20. Fig. 25. b. Hiſt. Muſcul. Icon. 2. g.
(*d*) Id. Tab. 20. Fig. 25. c. c. Hiſt. Muſcul. Icon. 2. h. h. Icon. 4. *v*.

INTEROSSEI INTERNI MANUS. PRIOR (a) ET POSTERIOR (b) INDICIS. PRIOR ANNULARIS (c). PRIOR AURICULARIS (d).

Prior indicis oritur ab amplitudine priore oſſis metacarpi indicis; & quidem ab ejus longitudinis ſuperiore plus quam dimidia parte, mox a radice capitis ſuperioris (e). Extremum tendineum ejus inſeritur priori parti capitis ſuperioris oſſis primi indicis (f). —— Poſterior indicis incipit ab amplitudine illa osſis metacarpi indicis, quæ ſpectat os metacarpi medii (g), & quidem ab ejus longitudinis plus quam dimidia parte, mox a radice capitis ſuperioris; præter amplitudinis illius marginem, qui eſt propter dorſum manus; ut a quo caput tenuius oritur Interoſſei prioris medii (h). Ten-

(a) Albin. Tab. Muſcul. 20. Fig. 6. γ. δ. δ. ε. ζ. Fig. 7. a. b. b. b. c. d. Hiſt. Muſcul. Icon. 3. & 2. G. Icon. 4. Δ. Euſtach. Tab. 39. Fig. 1. x.

(b) Albin. Tab. Muſcul. 20. Fig. 6. t. u. u. v. Fig. 7. e. f. f. g. g. Hiſt. Muſcul. Icon. 2. H. Euſtach. Tab. 39. Fig. 1. y.

(c) Albin. Tab. Muſcul. 20. Fig. 6. k. l. l. m. Fig. 7. h. i. i. k. Hiſt. Muſcul. Icon. 1. P. Icon. 2. L. Euſtach. Tab. 39. Fig. 1. B.

(d) Albin. Tab. Muſcul. 20. Fig. 6. a. b. c. d. e. Fig. 7. n. o. o. p. q. r. Hiſt. Muſcul. Icon. 3. A. Icon. 1. 2. N. Euſtach. Tab. 39. Fig. 1. D.

(e) Albin. Tab. 20. Fig 6. γ. δ. δ. Fig. 7. a. b. b. b. Hiſt. Muſcul. Icon. 3. n. o. Icon. 4. β. γ.

(f) Id. Tab. 20. Fig. 6. ε. ζ. Fig. 7. c. d. Hiſt. Muſcul. Icon. 3. q.

(g) Id. Tab. 20. Fig. 6. t. u. u. Fig. 7. e. f. f. Hiſt. Muſcul. Icon. 2. q.

(h) Id. Tab. 20. Fig. 6. x.

Tendo ejus ſe conjungit cum tendine Extenſoris indicis; acceptaque ab eo portione auctus decurrit ad os tertii ordinis (*i*). Tendo ille ſe etiam ſubtilibus fibris innectit capſæ, quæ continet articulum hujus digiti cum metacarpo, qua ſecundum eam a parte volæ incedit. Aponeuroſem emittit tenuem, quæ accedit ad tendinem extenſorem indicis (*k*), antequam ſe cum eodem conjungat. —— Prior annularis oritur, ut præcedens, ſed ab amplitudine illa oſſis metacarpi digiti illius, quæ ſpectat os metacarpi medii (*l*). Tendo ejus (*m*), accepto ab interiore parte tendine Lumbricalis tertii (*n*), conjungit ſe cum tendine Extenſoris communis ad hunc digitum pertinente (*o*), acceptaque ab eo portione auctus, decurrit ad os tertium digiti hujus (*p*), cum tendine poſterioris annularis confluens. Ab eodem tendine pro parte procedit aponeuroſis, quæ accedit ad tendinem Extenſoris (*q*). — Prior auricularis eodem ac præcedentes modo, oritur, ſed ab amplitudine illa oſſis meta-

carpi

(*i*) Albin. Tab. 20. Fig. 6. v. x. Fig. 7. g. Conf. Hiſt. Muſcul. Icon. 2. q. 4. f. B. A. E. F. v. indicis.

(*k*) Id. Tab. 20. Fig. 6. v. y.

(*l*) Id. Tab. 20. Fig. 6. k. l. l. Fig. 7. h. i. i. Hiſt. Muſc. icon. 2. L. w.

(*m*) Id. Tab. 20. Fig. 6. m. Fig. 7. k.

(*n*) Id. Tab. 20. Fig. 3. Z. γ. δ. Hiſt. Muſcul. icon. 4. d. w. w. w.

(*o*) Id. Tab. 20. Fig. 6. n. Fig. 7. m.

(*p*) Id. Tab. 20. Fig. 6. o.

(*q*) Id. Tab. 20. Fig. 6. p. q.

carpi digiti illius, quæ spectat os metacarpi annularis (r). Tendo (s), accepto ab interiore parte tendine Lumbricalis quarti (t), conjungit se cum tendine Extensoris proprii auricularis (u), acceptaque ab eo portione auctus, decurrit ad os tertium auricularis (v). Ab eodem tendine partim procedit aponeurosis ad tendinem Extensoris (w), quæ, ut & supra dictæ, altera parte venit e capsa articuli hujus digiti cum suo metacarpo.

INTEROSSEI EXTERNI MANUS. PRIOR (a) ET POSTERIOR (b) MEDII. POSTERIOR ANNULARIS (c).

Prior digiti medii capite tenuiore oritur ab osse metacarpi indicis (d), crassiore a longitudine paulo plus quam dimi-

(r) Albin. Tab. 20. Fig. 6. a. b. b. Fig. 7. r. o. o. Hist. Muscul. icon. 3. A. a. b.
(s) Id. Tab. 20. Fig. 6. c. Fig. 7. n. Hist. Muscul. icon. 3. A. c.
(t) Id. Tab. 20. Fig. 3. ε. θ. ι. Hist. Muscul. icon. 4. b.
(u) Id. Tab. 20. Fig. 6. d. Fig. 7. r.
(v) Id. Tab. 20. Fig. 6. e.
(w) Id. Tab. 20. Fig. 6. f. c.
(a) Albin. Tab. Muscul. 20. Fig. 8. a. — f. Fig. 9. V. — ε. Hist. Muscul. Icon. 3. E. F. Icon. 4. Θ. Λ. Eustach. Tab. 39. Fig. 1. z.
(b) Albin. Tab. Muscul. 20. Fig. 8. g. — k. Fig. 9. m. — t. Hist. Muscul. Icon. 3. C. D. Icon. 4. Ξ. Π. Eustach. Tab. 39. Fig. 1. A.
(c) Albin. Tab. Muscul. 20. Fig. 8. l. — o. Fig. 9. a. — h. Hist. Muscul. Icon. 3. B. Icon. 4. Σ. Φ. Eustach. Tab. 39. Fig. 1. C.
(d) Albin. Tab. Muscul. 20. Fig. 8. a. Fig. 9. x. y. y. Hist. Muscul. Icon. 4. Θ. ϑ. ε. Icon. 3. F.

dimidia superiore illius amplitudinis ossis metacarpi digiti medii, quæ spectat os metacarpi indicis (e). Tendo (f) se adjungit tendini Lumbricalis secundi (g), communisque ex iis factus tendo (h), accepta a tendine Extensoris communis, ad hunc digitum pertinente, portione auctus, decurrit una cum posteriore medii ad os tertium digiti hujus (h.h). Solet quoque extremum, præcedenti subjacens, affigere eminentiæ, quæ est mox infra caput primum ossis primi. Sic & posterior medii, posteriorque annularis. Ab hoc tendine etiam aponeurosis accedit ad tendinem Extensoris communis ad digitum medium pertinentem (*), partim proveniens ex capsa articuli hujus digiti cum suo metacarpo.— Posterior medii eodem modo ab osse metacarpi annularis, & medii procedit (i), eodemque modo desinit (k), confluens cum prioris tendine. Sic & posterior annula-

(e) Albin. Tab. 20. Fig. 8. b. c. c. Fig. 9. v. w. w. Hist. Muscul. Icon. 3. E. k. l. Icon. 4. Δ. ζ. ν.

(f) Id. Tab. 20. Fig. 8. d. Fig. 9. z. Hist. Muscul. Icon. 3. m. Icon. 4. κ. w. C.

(g) Id. Tab. 20. Fig. 3. u. x. y. Hist. Muscul. Icon. 3. H. Icon. 2. S.

(h) Id. Tab. 20. Fig. 8. f.

(h.h) Id. Tab. 20. Fig. 9. α. β. Hist. Muscul. Icon. 4. F.

(*) Id. Tab. 20. Fig. 9. z. ε. ζ.

(i) Id. Tab. 20. Fig. 8. g. h. i. i. Fig. 9. m. n. n. o. p. p. Hist. Muscul. Icon. 3. D. g. h. C. Icon. 4. Ξ. λ. μ. Π. ν. ξ.

(k) Id. Tab. 20. Fig. 8. k. Fig. 8. k. Fig. 9. t. r. s. Hist. Muscul. Icon. 3. i. Icon. 4. ϱ. ν. B. E.

nularis ab offe metacarpi auricularis; & annularis incipit (*l*), nec disfimili ratione inferitur (*m*), cum priore digiti ejusdem cohærens. Præterea ab iis aponeurofes etiam ad tendines Extenforis communis procedunt (*n*).

Omnes, externi & interni, flectunt digitum fuum; priores in priora pollicem verfus, pofteriores in pofteriora, fimulque modice in interiora, in oppofitum fibi latus fimul aliquantum convertentes partem ejus internam: digitum, in volam flexum, in eandem magis flectunt, fed oblique in fuum latus.

ABDUCTOR INDICIS MANUS (*a*).

Oritur a dorfo osfis multanguli majoris (*b*), a fuperiore parte marginis osfis metacarpi pollicis, quo id indicem refpicit (*c*), ab interiore & eadem fuperiore parte osfis metacarpi indicis (*d*). Procedit ad priorem partem indicis, fe- feque

(*l*) Albin. Tab. 20. Fig. 8. l. m. n. n. Fig. 9. a. b. b. c. d. d. Hift. Mufcul. Icon. 3. B. d. e. Icon. 4. Σ. σ. ς. Φ. τ. υ.

(*m*) Id. Tab. 20. Fig. 8. o. Fig. 9. e. f. g. Hift. Mufcul. Icon. 3. f. Icon. 4. Ψ. v. B. E. C. F.

(*n*) Id. Tab. 20. Fig. 9. q. t. u., e. h. i.

(*a*) Albin. Tab. Mufcul. 20. Fig. 13. a. b. c. d. e. Fig. 4. a. b. c. Hift. Mufcul. Icon. 4. r. Icon. 2. F. Euftach. Tab. 56. r. Tab. 33. n. 64.

(*b*) Albin. Tab. 20. Fig 13. a. b.

(*c*) Id. Tab. 20. Fig. 13. c.

(*d*) Id. Tab. 20. Fig. 13. d. Conf. Hift. Mufcul. Icon. 4. r. — α.

feque inferit capiti fuperiori osfis primi (*e*). Ab exteriore parte in tenuem aponeurofem dilatefcit (*f*), dorfum ejusdem osfis, capfamque articuli ejus cum metacarpo confcendentem, fefeque conjungentem cum tendine Lumbricalis primi, & adjungentem communi tendini Extenforis indicis (*g*).

Ducit a reliquis digitis indicem ad pollicem, vicisfimque pollicis metacarpum ad indicem. Indicem modice in volam flectit.

REGIO XXVI. NATIS.

In nate dantur Gluteus magnus (*a*), Gluteus medius (*b*), Gluteus minor (*c*), Pyriformis (*d*), Gemini (*e*), Obturator internus (*f*), Quadratus femoris (*g*). Hos mufculos, ut & illos, qui Femori appofiti funt, vagina amplectitur tendinea, quæ fe continuo per ambitum ductu demittit a crifta ilium, fecundum ortum Gluteorum, offe facro & coc-

(*e*) Albin. Tab. 20. Fig. 14. b. c. Hift. Mufcul. Icon. 2. n. o.
(*f*) Id. Tab. 20. Fig. 13. e.
(*g*) Id. Tab. 20. Fig. 1. h. Euftach. Tab. 36. r. — β.
(*a*) Euftach. Tab. 34. I. Tab. 29. X.
(*b*) Id. Tab. 34. H. Tab. 32. W.
(*c*) Id. Tab. 36. u. Tab. 33. y.
(*d*) Id. Tab. 36. m. Tab. 38. w.
(*e*) Id. Tab. 37. s. t.
(*f*) Id. Tab. 37. w. Tab. 29. i.
(*g*) Id. Tab. 27. u.

coccyge, ſecundum ortum magni; oſſe iſchii & pubis, ſecundum ortum Semitendinoſi, Adductoris magni, Gracilis, Adductoris longi, Pectinei; imo tendineo margine Obliqui externi abdominis; tendine Pſoæ parvi, conſtans majorem partem ex faſciculis transverſis, rectisque. Qua Gluteum magnum integit, valde tenuis, qua medium ante magnum craſſior, eoque craſſior, quo remotior a magno; ab externo femoris latere valde craſſa, de cætero tenuis. Craſſa pars inſeritur externo lateri capitis ſuperioris tibiæ, & a priore parte conjungitur cum tendine Vaſti externi. Tenuiore parte genu laxe ambit, & ad crus procurrit. Propagines etiam inter muſculos demittit.

GLUTEUS MAGNUS (*a*).

Incipit ab oſſe ilium, ad exteriorem marginem partis poſterioris criſtæ, qua hoc os ultra ſacrum retrorſus porrectum (*b*), quin & tam pertinaciter adhæret ligamento, quod ab oſſe ſacro ad criſtam ilium, illique quod ab eodem oſſe ad iſchion deductum; itemque vaginæ tendinoſæ, qua extrinſecus obductus, ut ab iis etiam oriri videatur. Et a prin-

(*a*) Albin. Tab. Muſcul. 21. Fig. 1. a.—g. Euſtach. Tab. 34. I. Tab. 29. X.

(*b*) Albin. Tab. 21. Fig. 1. a.a.

principio continuatus eſt tendineo principio Latiſſimi dorſi, communisque capitis Longiſſimi dorſi & Sacrolumbalis (*c*). Pergit oriri a margine externo oſſis ſacri (*d*); a tuberculo primo eorum, quæ ſunt a latere hiatus, in quem ſpinæ dorſi canalis, medullam ſpinalem continens, exit (*e*); ab articulo proceſſuum obliquorum oſſis ſacri, coccygisque (*f*), a latere coccygis (*g*). Caro in faſciculos, laxius inter ſe cohærentes, congeſta eſt (*). Ab initio tenuis, ſenſim increscit. Oblique in latus deſcendit, & ad poſtremum abit in tendinem craſſum, ſatisque latum, qui ſe inſerit eminentiæ femoris, quæ per poſteriorem ejus partem à radice trochanteris majoris deorſum porrecta; & ſuperiori quidem parti ejus, quoad illa maxime eminere & inæquabilis eſſe ſolet (*h*). Conjungit ſe quoque cum vagina tendinea, quæ femori adjacentes muſculos complectitur, ut & cum Vaſto externo (*i*). Integit ergo trochanterem majorem, ad cujus dorſum ſuo ſe tendine flectit; interjectaque ibi burſa, te-

(*c*) Albin.. Tab. 5. δ. δ. in nate.
(*d*) Id. Tab. 21. Fig. 1. b.
(*e*) Id. Tab. 21. Fig. 1. c.
(*f*) Id. Tab. 21. Fig. 1. d.
(*g*) Id. Tab. 21. Fig. 1. e.
(*) Euſtach. Tab. 29. X.
(*h*) Albin. Tab. 21. Fig. 1. f. Euſtach. Tab. 34. I. — 1.
(*i*) Albin. Tab. 21. Fig. 1. g.

tenuis, magna, parva parte ſtricte adnexa trochanteris dorſo, ſtatim infra finem Glutei medii; reliquo trochanteris, & Glutei magni tendini laxe.

Attollit femur in poſteriorem partem, ſpinam dorſi verſus, ac ſimul etiam aliquantum per exteriorem partem retrorſum convertit. Flexum in priora femur abducit a femore altero.

GLUTEUS MEDIUS (*a*).

Oritur a dorſi oſſis ilium latitudine tota, juxta criſtam ejus (*b*); & ab aponeuroſi, qua extrinſecus obductus eſt. Seſe paulatim anguſtat, & ad trochanterem majorem tendit, cui ſe oblique adfigit, a radice ad ſummum verticem (*c*), extremo tendineo. A priore parte, ab extremo criſtæ ilium ad finem ſuum usque, cum minore conjungitur in unum. Pars prior brevior eſt, magisque ex transverſo incedit. Inter finem tendinis, illumque, quo Pyriformis deſinit, interjecta burſa parva, utrique accreta.

Abducit femur alterum ab altero. Sublato in priora femore, id convertit, ita autem, ut partem ejus, quæ tunc eſt ſuperior, aliquantum dirigat ad alterum femur.

GLU-

(*a*) Albin. Tab. Muſcul. 21. Fig. 2. a.—d. Fig. 3. a d. Euſtach. Tab. 34. H. Tab. 32. W.

(*b*) Albin. Tab. 21. Fig. 2. a. a. a. Fig. 3. c. c. Euſtach. Tab. 34. H. — α. β. γ. Tab. 32. W.

(*c*) Albin. Tab. 21. Fig. 2. b. c. c. Euſtach. Tab. 34. H. — δ.

GLUTEUS MINOR (*a*).

Demittit ſe ab oſſis ilium amplitudine illa tota, quæ eſt inter ortum Glutei medii iſchiique principium, & ab ipſius iſchii oræ poſterioris ſuperiore parte (*b*). A primo initio tenuis, paulatim craſſescit, ſed dein ita detumescit, ut extremum tendineum non valde craſſum ſit, ad quod formandum jam circa medium pars tendinea conſpicitur (*c*). Dictum extremum deſinit ad eam prioris partis trochanteris majoris partem, quæ eſt juxta latus ejus externum, a radice ejus usque ad partem ſuperiorem (*d*). Ante finem ſuum adnectit ſe capſæ articuli coxæ; poſteaque juxta finem burſa parva, tenuis, interjecta, accreta tendini & trochanteri majori. Actio eadem, quæ præcedentis.

PYRIFORMIS (*a*).

Oritur ab exteriore parte oræ poſterioris ejusdemque infe-

(*a*) Albin. Tab. Muſcul. 21. Fig. 4. a. a. a. b. Fig. 5. a. a. b. c. d. Euſtach. Tab. 36. u. Tab. 33. y.

(*b*) Albin. Tab. 21. Fig. 4. a. a. a. Fig. 5. a. a. Euſtach. Tab. 36. u. — α. α.

(*c*) Albin. Tab. 21. Fig. 4. b.

(*d*) Id Tab. 21. Fig. 5. d. Tab. 3. ϱ. in trunco. Euſtach. Tab. 33. y. — α. Tab. 36. u. — β.

(*a*) Albin. Tab. Muſcul. 21. Fig. 6. a. b. Fig. 7. a. — i. Euſtach. Tab. 36. n. Tab. 38. w.

ferioris offis ilium, juxta facrum (*b*); portionibus tribus a priore parte offis facri; quarum fuperior incipit a priore parte corporis fecundi ejus offis, mox fupra foramen fecundum (*c*); media a priore parte illius proceffus, qui inter foramen fecundum & tertium eft (*d*); inferior a priore parte proceffus, qui inter foramen tertium & quartum (*e*). Ab initio latus, fatisque craffus, procedendo fe in anguftum cogit, ac tendine, longo, gracili, ovato, pertinet ad internam partem medii cacuminis trochanteris majoris (*f*).

Vertit os femoris, in priora converfum, per exteriora retrorfum. Flexum in priora abducit ab altero.

G E M I N I (*a*).

Geminorum fuperior oritur ab exteriore parte extremi proceffus acuti ifchii, juxta finum, per quem Obturator internus fe flectit (*b*). Inferior incipit ab exteriore parte tuberis ifchii, juxta inferiorem partem finus, per quem Obturator internus fe flectit (*c*); hujus pars interior aliquando pro-

(*b*) Albin. Tab. 21. Fig. 6. a.
(*c*) Id. Tab. 21. Fig. 7. a. b. Euftach. Tab. 38. w. — *α. α.*
(*d*) Albin. Tab. 21. Fig. 7. c. d.
(*e*) Id. Tab. 21. Fig. 7. e. f.
(*f*) Id. Tab. 21. Fig. 6. b. Euftach. Tab. 36. n. — *α. β.*
(*a*) Albin. Tab. Mufcul. 21. Fig. 11. a. — h. Euftach. Tab. 37. s. t.
(*b*) Albin. Tab. 21. Fig. 11. a. b.
(*c*) Id. Tab. 21. Fig 11. d. e. e.

procedit extrinſecus ab iſchio, a lunato termino illius ſinus; per quem Obturator internus ſe flectit (*d*). Modice lati, ſenſim anguſtiores fiunt, & porro gracilescunt, conjungunt ſe cum cauda Obturatoris interni (*e*), & cum hujus tendine ſe inſerunt internæ eidemque priori parti cacuminis trochanteris majoris (*f*). Inter Geminos, caudamque Obturatoris burſa parva eſt.

Vertit una cum Obturatore femur, ut Pyriformis; abducit flexum in priora.

OBTURATOR INTERNUS (*a*).

Oritur a priore parte, eaque plus quam dimidia, ambitus foraminis magni oſſis coxæ, principio tendinoſo (*b*); unde primum per latus pelvis procedit retrorſum; deinde ſe circum iſchii marginem flectit (*c*) per ſinum, qui inter ejus acutum proceſſum imumque tuber eſt; poſteaque decurrit per dorſum iſchii; & tendo, qui ex interiore parte carnis, ubi ad iſchion accedit, minimis initiis oritur (*d*), una cum Gemi-

(*d*) Albin. Tab. 21. Fig. 11. f. g. g.
(*e*) Euſtach. Tab. 29. h. i. k.
(*f*) Albin. Tab. 21. Fig. 10. c.
(*a*) Albin. Tab. Muſcul. 21. Fig. 10. a. — c. Euſtach. Tab. 37. w. Tab. 29. i.
(*b*) Albin. Tab. 21. Fig. 10. a. a. a.
(*c*) Id. Tab. 21. Fig. 10. b.
(*d*) Euſtach. Tab. 37. w. — α. α. β.

Geminis, pertinet ad internam eandemque priorem partem cacuminis trochanteris majoris (*e*).

Idem præstat, quod præcedentes.

QUADRATUS FEMORIS (*a*).

Origo huic ab exteriore margine tuberis ischii (*b*), ex transverso procedit ad oblongam eminentiam ossis femoris, quæ partim e posteriore parte radicis trochanteris majoris, partim infra eam eminet, eique sese inserit (*c*).

Vertit femur, ut Obturator internus & Gemini. Femur in latus sublatum deprimit, & ad alterum adducit.

REGIO XXVII. FEMUR.

Adpositi femori sunt Biceps cruris (*a*), Semitendinosus (*b*), Semimembranosus (*c*), Tensor vaginæ femoris (*d*), Rectus cruris (*e*), Sartorius (*f*), Vastus externus

(*e*) Albin. Tab. 21. Fig. 10. c. Eustach. Tab. 29. i.

(*a*) Albin. Tab. Muscul. 21. Fig. 8. a. b. b. Fig. 9. a. a. Eustach. Tab. 37. u.

(*b*) Albin. Tab. 21. Fig. 9. a. a.

(*c*) Id. Tab. 21. Fig. 8. b. b. Eustach. Tab. 37. u. — α.

(*a*) Eustach. Tab. 31. b. a.

(*b*) Id. Tab. 34. L. Tab. 35. M. N. Tab. 30. V.

(*c*) Id. Tab. 36. D. Tab. 30. W.

(*d*) Id. Tab. 28. R. Tab. 30. M.

(*e*) Id. Tab. 35. D.

(*f*) Id. Tab. 35. O.

nus (*g*), Vaſtus internus (*h*), Cruralis (*i*), Pectineus (*k*), Adductor longus femoris (*l*), Gracilis (*n*), Obturator externus (*o*), Adductor magnus femoris (*p*).

BICEPS CRURIS (*a*).

Biceps, & bicorpor, hicce oritur capite longiore fere a medio partis ſuperioris dorſi tuberis iſchii, a principio conjunctus cum principio Semitendinoſi (*b*); capite breviore, fere in media longitudine femoris, ab inferiore parte aſperæ eminentiæ, quæ per longitudinem poſticæ partis femoris porrecta (*c*); & a ſepimento tendineo, quod ipſi Vaſtoque externo interjectum. Longior ex tendine brevi, craſſo, fit venter longus, craſſus, rotundulus, infra medium rurſus decreſcens. Per illum ab ea parte, quæ femur alterum reſpi-

(*g*) Euſtach. Tab. 33. Ψ. Tab. 36. F.
(*h*) Id. Tab. 33. Σ. Tab. 36. E. E.
(*i*) Id. Tab. 33. Φ. Tab. 36. x.
(*k*) Id. Tab. 33. Λ.
(*l*) Id. Tab. 33. Ξ.
(*m*) Id. Tab. 34. K. Tab. 35. L.
(*n*) Id. Tab. 38. y.
(*o*) Id. Tab. 38. x.
(*p*) Id. Tab. 38. Z. A. dextr. Tab. 36. w.
(*a*) Albin. Tab. Muſcul. 22. Fig. 10. h. &c. Fig. 11. g. &c. Fig. 12. a. g. Euſtach. Tab. 31. b. a.
(*b*) Albin. Tab. 22. Fig. 11. g. h. i. Fig. 12. a. b. Euſtach. Tab. 34. M. — α. Tab. 36. n.
(*c*) Albin. Tab. 22. Fig. 10. h. i. Euſtach. Tab. 36. G.

ſpicit, tendineum caput diu excurrit. Ex parte oppoſita tendo cito naſcitur, in quem totus muſculus ad poſtremum abit (*d*). Brevior, qua ad femur adhæret, ſubtendineus, tenuis, paulatim craſſior, paulatim anguſtior, poſtremo ſe adjungit parti illi extremi tendinei, quod muſculus longus efficit, quæ priora ſpectat (*e*); ſic tendo ſenſim communis producitur, qui extrorſum deſcendit, & brevi extremo pertinet ad exteriorem partem capitis ſuperioris fibulæ (*f*); pars ad tibiam pertinet, ad exteriorem partem ejus, ante caput fibulæ (*g*). Extremo tendinis ſubjecta burſa, inter eum & ligamentum genu laterale externum intercepta, & utrique accreta. Firmatur tendo aponeuroſi, quam juxta condylum a poſteriore parte ſua emittit, per poſteriora cruris deſcendentem, & ad vaginam ejus accedentem. A priore parte aliam producit, ad vaginam femoris accedentem.

Flectit genu in partem poſteriorem; flexo genu crus, introrſum ſua priore parte converſum, vertit extrorſum.

SE-

(*d*) Albin. Tab. 22. Fig. 11. l. Euſtach. Tab. 34. M. — β.
(*e*) Albin. Tab. 22. Fig. 11. m.
(*f*) Id. Tab. 22. Fig. 11. l. n. o. Fig. 12. d. e. f. Fig. 10. m. n. Euſtach. Tab. 36. I. — α.
(*g*) Id. Tab. 22. Fig. 12. g.

SEMITENDINOSUS (a).

Parte tendinea oritur a dorſo tuberis iſchii, cum capite longiore Bicipitis cruris (b), & deinde conjungitur cum principio tendineo capitis illius (c); parte carnea, aliis etiam tendinea, a dorſo tuberis iſchii (d). Venter cito increscit, ſed ante medium rurſus decrescit, exitque in tendinem longum, craſſum (e), qui inſeritur lateri interno tibiæ, mox infra Gracilem (f). Ut hunc locum adtingat, per poſteriorem femoris partem recte deſcendit, usque ad poſteriorem condyli ejus interni, ultraque pone caput ſuperius tibiæ, ad cujus radicem ſe in priora ſecundum tibiam flectit. Ne a condylo femoris in priora deflectat, retinetur a poſteriore parte aponeuroſi, quam juxta poplitem a poſteriore parte ſua exigit, & ad vaginam cruris retrorſum demittit.

Flectit genu in partem poſteriorem. Flexo genu crus, extrorſum ſua priore parte converſum, vertit introrſum.

S E-

(a) Albin. Tab. Muſcul. 22. Fig. 11. a. — f. Fig. 12. h. — m. Euſtach. Tab. 34. L. Tab. 35. M. N. Tab. 30. V.

(b) Albin. Tab. 22. Fig. 11. a. b. Euſtach. Tab. 34. L. — α. Tab. 36. o.

(c) Albin. Tab. 22. Fig. 11. c. c. Fig. 12. i. k. k.

(d) Id. Tab. 22. Fig. 11. d.

(e) Id. Tab. 22. Fig. 11. e. Fig. 12. l l. Euſtach. Tab. 34. L. — β.

(f) Albin. Tab. 22. Fig. 12. m. Euſtach. Tab. 35. N. — α.

SEMIMEMBRANOSUS (a).

Tendo ejus incipit a ſuperiore parte dorſi tuberis iſchii, juxta externum latus (b). Ex hoc tendine venter, carneus, craſſus, producitur (c), qui ſat cito iterum in caudam tendineam deſinit (d), quæ præcipue inſeritur capiti ſuperiori tibiæ, mox ſub ſummo rotundulo margine ejus, ab interno latere, juxta partem poſteriorem (e); porro aponeuroſem poſteriorem emittit, quam inſerit eminentiæ obliquæ & inæquabili, quæ infra poſteriorem partem radicis capitis ſuperioris tibiæ, qua id ſuſtinet condylum internum femoris (f), aliamque priorem, quam inſerit margini interno tibiæ (g). Qua cauda pone caput ſuperius tibiæ incedit, ibi inter eam & capſam genu burſa parva eſt. Qua pone condylum incedit, (aponeuroſi, a parte poplitis ab eo emiſſa, & per exteriora capſæ articuli genu excurrente condylum externum verſus, inſerente ſe partim femori ſtatim ſupra condylum externum, alias ipſi condylo, partim in cap-

(a) Albin. Tab Muſcul. 22. Fig. 9. a.—e. Fig. 10. a.—g. Euſtach. Tab. 36. D. Tab. 30. W.
(b) Albin. Tab. 22. Fig. 10. a. b. Fig. 9. a. Euſtach. Tab. 36. D. -- α.
(c) Albin. Tab. 22. Fig. 10. c.
(d) Id. Tab. 22. Fig. 9. b. Fig. 10. d.
(e) Id. Tab. 22. Fig. 9. c. Fig. 10. e. Euſtach. Tab. 36. D. -- γ.
(f) Albin. Tab. 22. Fig. 10. f.
(g) Id. Tab. 22. Fig. 10. g.

capſam genu evanescente) retinetur, & ſimul capſa, cum agit muſculus, retrahitur.

Præſtat idem, quod præcedens.

TENSOR VAGINÆ FEMORIS (*a*).

Oritur ab exteriore parte extremi prioris criſtæ ilium (*b*), deſcendendo tendit modice retrorſum. Ex principio tendineo fit carneus, latior, primo craſſior, dein tenuior, & denique in vaginam tendineam femoris evanescit (*c*).

Vertit femur introrſum, eo verſus dirigens partem ejus priorem. Cum vero vagina ad crus deſinit, in hoc etiam agere poteſt.

RECTUS CRURIS (*a*).

Oritur a ſuperiore parte tuberculi, quod in ora priore oſſis ilium, tendine præcipuo (*b*); altero principio, pariter tendineo, a ſuperiore & eadem poſteriore parte marginis ace-

(*a*) Albin. Tab. Muſcul. 23. Fig. 8. a. b. c. Euſtach. Tab. 28. R. Tab. 30. M.

(*b*) Albin. Tab. 23. Fig. 8. a. b. Euſtach. Tab. 38. R.

(*c*) Albin. Tab. 23. Fig. 8. c. Euſtach. Tab. 30. N.

(*a*) Albin. Tab. Muſcul. 23. Fig. 2. a. — f. Fig. 3. a. — h. Euſtach. Tab. 35. D.

(*b*) Albin. Tab. 23. Fig. 2. a. b. b. Fig. 3. a. b. b. Euſtach. Tab. 35. D. — α. β.

acetabuli, & a vicina parte capſæ, articulum coxæ continentis (c). Ab his principiis venter extrinſecus aliquamdiu tendinoſus eſt (d). Fibræ ventris, quæ in ſuperficie ſunt, a latitudine media in utrumque latus oblique deorſum vergunt (e). Tendo ex interiore parte muſculi cito naſci incipit (f), ſeſeque, cum Vaſtis conjunctus, inſerit patellæ (g), per cujus priora a tendine Recti aponeuroſis excurrit, poſtea ſe priori parti ligamenti adjungens, quod a patella ad tibiam pertinet (h).

Genu, ſi flexum ſit, extendit.

SARTORIUS (a).

Principio extrinſecus tendinoſo oritur ab extremo priore criſtæ ilium, proximaque parte oræ prioris (b). Per femur oblique introrſum deſcendit, tum rectius, modiceque retrorſum, ad internam genu partem, qua condylo femoris adjacet, tendinem exſerit, qui inſeritur interno lateri tibiæ juxta inferiorem partem tuberis, cui annexum ligamentum, a pa-

(c) Albin. Tab. 23. Fig. 2. c. d. d.
(d) Id. Tab. 23. Fig. 2. e.
(e) Id. Tab. 23. Fig. 3. e. e.
(f) Id. Tab. 23. Fig. 2. f. g. Euſtach. Tab. 37. D. — γ.
(g) Albin. Tab. 23. Fig. 3. f. g. g.
(h) Id. Tab. 23. Fig. 3. h.
(a) Albin. Tab. Muſcul. 23. Fig. 4. a. -- d. Euſtach. Tab. 35. O.
(b) Albin. Tab. 23. Fig. 4. a. b. Euſtach. Tab. 35. O. — α.

a patella procedens (*c*). Ne tendo a condylo in priora recedat, impedit aponeurosis, quam, priusquam tibiam attingat, a posteriore parte sua exigit, quæque in latus externum per posteriorem cruris partem se demittit, abitque in vaginam tendineam cruris.

Genu curvat in posteriora, ac crus convertit, ut Gracilis.

VASTUS EXTERNUS (*a*).

Oritur ab eminentia obliqua, quæ in priore parte femoris ad radicem colli inter trochanteres est (*b*); ab externa parte radicis trochanteris majoris, & secundum exteriora spinæ totius, quæ a trochantere majore fere usque ad condylum externum eminet (*c*); partim quoque abscedit a sepimento tendineo, quo distinguitur a Bicipitis parte breviore. Descendit ad patellam & crus, oblique in priora, fere dimidium femoris ab externo latere complexus. Lato crasso & brevi tendine se affigit margini patellæ a parte externa, eique finitima superiore (*d*), tum & priori parti capitis

(*c*) Albin. Tab. 23. Fig. 4. c. d. d. Eustach. Tab. 35. O. — β. γ.

(*a*) Albin. Tab. Muscul. 23. Fig. 6. c. c. d. e. Fig. 7. a. — i. Eustach. Tab. 33. Ψ. Tab. 36. F.

(*b*) Albin. Tab. 23. Fig. 7. b. c. Eustach. Tab. 33. Ψ. — z. Tab. 36. F. — α. sup.

(*c*) Albin. Tab. 23. Fig. 7. c. d. Fig. 6. c. c. Eustach. Tab. 36. F. — α. α.

(*d*) Albin. Tab. 23. Fig. 7. g. h. i. i. Eustach. Tab. 33. Ψ.

pitis ſuperioris tibiæ, inter fibulæ caput, & ligamentum patellæ. Adhæret ligamento illi, & poſteriore parte ſe vaginæ femoris continuat. Cum Crurali ſe pro parte conjungit. Tendinem cum poſteriore parte tendinis Recti connectit, ut & cum illo Vaſti interni.

Extendit genu.

VASTUS INTERNUS (*a*).

Incipit ab obliqua eminentia, quæ, infra trochanterem minorem porrecta, ab ima radice colli femoris ad longam illam poſteriorem femoris ſpinam pertinet; & deinde ſecundum hujus longitudinem totam, a parte ejus interiore (*b*). Pars a tota principii latitudine diu tendinoſa eſt (*c*). Carnem adjungit ad tendinem Cruralis (*d*), tendinemque ſuum inferit margini patellæ, a parte interna (*e*); ſupra autem, pone tendinem Vaſti externi, connexus cum eo, procedit ad patellæ marginem. Cohæret cum dicto ligamento; aponeuroſem retrorſum mittit ad cruris vaginam.

Extendit genu.

CRU-

(*a*) Albin. Tab. Muſcul. 23. Fig. 6. a. a. b. Fig. 7. k. — p. Euſtach. Tab. 33. Σ. Tab. 36. E. E.

(*b*) Albin. Tab. 23. Fig. 6. a. a. Fig. 7. m. Euſtach. Tab. 36. E. — α. σ.

(*c*) Albin. Tab. 23. Fig. 6. b.

(*d*) Id. Tab. 23. Fig. 7. n. n.

(*e*) Id. Tab. 23. Fig. 7. o. p. p. Euſtach. Tab. 33. Σ.

CRURALIS (*a*).

Ab eminentia obliqua, quæ in priore parte femoris ad radicem colli inter trochanteres eſt, incipit (*b*). Porro oriri pergit a ſuperiore plus quam dimidia parte longitudinis femoris, a priore & exteriore ejus parte (*c*). Tendo a priore parte carnis naſcitur (*d*), ſeque non multum ſupra genu Vaſtorum tendinibus adjungit, ac dein poſt eos inſerit ſuperiori parti patellæ. Poſt tendines Vaſtorum & Cruralis burſa, magna, tenuis datur, tum illis, tum capſæ articuli accreta.

Extendit genu.

PECTINEUS (*a*).

Procedit ab oblonga eminentia, quam ſuperior pars oſſis pubis per longitudinem ſuam exigit usque ad tuberculum, quod in priore parte juxta ſynchondroſem habet (*b*), & ab illo

(*a*) Albin. Tab. Muſcul. 23. Fig. 7. q. r. s. Euſtach. Tab. 33. Φ. Tab. 36. x.

(*b*) Albin. Tab. 23. Fig. 7. s.

(*c*) Euſtach. Tab. 33. Φ. Tab. 36. x. — α. α.

(*d*) Albin. Tab. 23. Fig. 7. r.

(*a*) Albin. Tab. Muſcul. 22. Fig. 5. a. — c. Fig. 6. a. — c. Euſtach. Tab. 33. Λ.

(*b*) Albin. Tab. 22. Fig. 5. a. a.

illo ipſo tuberculo (*c*). Inde deorſum, extrorſum, & retrorſum incedit ad femur, atque extremo tendineo (*d*) inſeritur aſperæ oſſis femoris lineæ, a trochantere minore aliquantum deorſum ductæ (*e*).

Femur alterum ad alterum adducit: attollit in priora, & convertit, ſic ut priorem ejus partem vertat in exteriora.

ADDUCTOR LONGUS FEMORIS (*a*).

Incipit principio tendineo è ligamento, quo ſynchondroſis oſſium pubis ab exteriore parte conſtricta, ſtatim juxta internam partem tuberculi, quod in pubis oſſis priore eademque ſuperiore parte eſt (*b*), & ab ipſo illo tuberculo (*c*); deſcendit ad femur, & inſeritur, extremo tendinoſo (*d*), mediæ fere longitudini femoris, ibique aſperæ eminentiæ, quæ longitudinem illam a poſteriore parte diſcernit (*e*).

Adducit, attollit, convertit femur, ut præcedens.

GRA-

(*c*) Albin. Tab. 22. Fig. 5. b.
(*d*) Id. Tab. 22. Fig. 5. c. Fig. 6. b.
(*e*) Id. Tab. 22. Fig. 6. c. c.
(*a*) Albin. Tab. Muſcul. 22. Fig. 1. a. — d. Fig. 2. a. b. Euſtach. Tab. 33. Ξ.
(*b*) Albin. Tab. 22. Fig. 1. a. b.
(*c*) Id. Tab. 22. Fig. 1. c.
(*d*) Id. Tab. 22. Fig. 1. d. Fig. 2. b.
(*e*) Id. Tab. 22. Fig. 2. c. c.

GRACILIS (a).

Principio tendineo juxta fynchondrofem pubis oritur a ligamento, fynchondrofem illam conftringente (b), & infra eam a margine offis pubis (c). Defcendit totus tenuis & anguftus ad tibiam, & tendinem inferit tibiæ (d), mox fub infertione tendinis Sartorii; ad cujus exemplum tendo juxta cruris principium emittit aponeurofem, in vaginam tendineam cruris abeuntem. Extremo hujus, ut & Sartorii atque Semitendinofi, fubjecta burfa magna, accreta iis, & ab altera parte ligamento laterali interno genu, quo latus internum tibiæ obductum.

Flectit genu in partem pofteriorem. Flexo genu, crus convertit, fic ut prior pars pedis extremi ad alterum pedem convertatur.

ADDUCTOR BREVIS FEMORIS (a).

Capiti, extrinfecus tendinofo, oritur a priore parte offis pubis juxta fynchondrofem, infra ortum Adductoris longi

(a) Albin. Tab. Mufcul. 23. Fig. 5. a. — e. Euftach. Tab. 34. K. Tab. 35. L.

(b) Albin. Tab. 23. Fig 5. a. b.

(c) Euftach. Tab. 35. L. — α.

(d) Albin. Tab. 23. Fig. 5. d. e. Euftach. Tab. 35. L. — β. γ.

(a) Albin. Tab. Mufcul. 22. Fig. 3. a. — h. Fig. 4. a. — d. Euftach. Tab. 38. y.

gi (*b*), & e ligamento, ſynchondroſem illam continente (*c*). Decurrit ad femur, & extremo, tripartito (*d*), inſeritur aſperæ eminentiæ, quæ longitudinem femoris a poſteriore parte diſcernit, & ſuperiori quidem ejus parti, quæ mox infra trochanterem minorem eſt (*e*).

Adducit femur alterum ad alterum.

OBTURATOR EXTERNUS (*a*).

Procedit a priore parte oſſis pubis & iſchii, ab iisque, qua dimidiam, eamque priorem, partem ambitus foraminis magni oſſis coxæ faciunt, a ſuperiore foraminis parte ad ima usque oritur (*b*); ex parte ab interiore margine foraminis dicti (*c*). Formatt tendinem longum, anguſtum, planum, quem inſerit poſteriori parti lateris interni radicis trochanteris majoris (*d*); ante finem ſe capſæ articuli coxæ adnectens.

Addu-

(*b*) Albin. Tab. 22. Fig. 4. a. b. Euſtach. Tab. 38. y. — α.
(*c*) Albin. Tab. 22. Fig. 4. c.
(*d*) Id. Tab. 22. Fig. 3. b. c. d.
(*e*) Id. Tab. 22. Fig. 3. f. g. h. h.
(*a*) Albin. Tab. Muſcul. 22. Fig. 7. a. — e. Fig. 8. a. a. b. b. b. Euſtach. Tab. 38. x.
(*b*) Albin. Tab. 22. Fig. 8. a. a. b. b. b. Euſtach. Tab. 38. x. — α. dextr.
(*c*) Id. Tab. 22. Fig. 7. a. b. b.
(*d*) Id. Tab. 22. Fig. 7. e.

Adducit femur alterum ad alterum, ſimulque convertit extrorſum.

ADDUCTOR MAGNUS FEMORIS (a).

Oritur ab exteriore parte marginis extremi oſſis pubis, juxta ſynchondroſem usque ad tuber iſchii (b); ab exteriore parte tuberis illius, ad imum ejus usque (c). In latitudinem ſeſe effundit, ad femur tendit, & extrema habet duo, quorum alterum, latum, fine aliquantum tendinoſo, oſſi femoris inſeritur (d); aſperæ lineæ, quæ eſt in ejus poſtica parte, totam lineæ illius tenens longitudinem; alterum, inferius, in tendinem abit, inſertum mediæ ſuperiori parti lateris interni condyli interni femoris (e).

Adducit femur alterum ad alterum, attollit quoque & convertit, ſic ut partem ejus priorem vertat in externum latus.

RE-

(a) Albin. Tab. Muſcul. 21. Fig. 16. a.—f. Fig. 17. a.—l. Euſtach. Tab. 38. Z. A. dextr. Tab. 36. w.

(b) Albin. Tab. 21. Fig. 16. a. a. Euſtach. Tab. 38. z. -- α. dextr. & Tab. 36. w. — α.

(c) Albin. Tab. 21. Fig. 17. a. b. Euſtach. Tab. 36. w. — β.

(d) Albin. Tab. 21. Fig. 16. b. c. d. Fig. 17. e. e. f. f. Euſtach. Tab. 36. w. — γ. γ.

(e) Albin. Tab. 21. Fig. 16. e. f. Fig. 17. g. h. i. Euſtach. Tab. 38. A. — α. Tab. 36. w. — ε.

REGIO XXVIII. CRUS.

Mufculi, qui in crure dantur, funt Gemellus (*a*), Plantaris (*b*), Soleus (*c*), Popliteus (*d*), Flexor longus digitorum pedis (*e*), Flexor longus pollicis pedis (*f*), Tibialis pofticus (*g*), Peroneus longus (*h*), Peroneus brevis (*i*), Extenfor longus digitorum pedis (*k*), Peroneus tertius (*m*), Extenfor proprius pollicis pedis (*n*). Vagina natis atque femoris ad crus decurrit, augetur portionibus, a Bicipite cruris, Vafto interno, Sartorio, Gracili, Semitendinofo, fefeque adjungit vaginæ craffæ, quæ externam cruris partem ambit inter priorem tibiæ fpinam & fibulam, atque incipit & ab exteriore parte partis inferioris capitis fuperioris fibulæ, & a tibia, mox fupra ortum Exten-

(*a*) Euftach. Tab. 34. Q. R. Tab. 31. i. k.
(*b*) Id. Tab. 34. N.
(*c*) Id. Tab. 34. O.
(*d*) Id. Tab. 36. y.
(*e*) Id. Tab. 36. L.
(*f*) Id. Tab. 36. K.
(*g*) Id. Tab. 37. x.
(*h*) Id. Tab. 36. z.
(*i*) Id. Tab. 37. y.
(*k*) Id. Tab. 35. H. Tab. 32. n. 5.
(*l*) Id. Tab. 35. I. Tab. 32. n. 9. Tab. 29. Ψ. fin. Tab. 30. π. π.
(*m*) Id. Tab. 35. P.
(*n*) Id. Tab. 33. n. 12.

tenſoris longi digitorum & Tibialis antici, porro per longitudinem fibulæ tibiæque pergit oriri, a fibulæ ſpina exteriore, a capite ſuperiore usque ad extremum fibulæ; a tibiæ priore ad malleolum usque. Tendinea, craſſa, hæc vagina, tenuior tamen eſt ab externa parte cruris, qua ambit Peroneos; totaque deorſum verſus extenuatur: propagines quoque muſculis interſerit (o). Ambit porro vagina femoris poſteriora atque interiora cruris, adhærens tibiæ lateri interno, juxta ſpinam priorem. Soleo, tendinique achillis ſubjecta etiam aponeuroſis, conveſtiens ſubjectos muſculos, propaginesque inter eos immittens.

GEMELLUS (a).

Capita duo habet, alterum interius (b), alterum exterius (c). Interius principiis duobus, iisque tendinoſis, incipit; quorum inferius (d) craſſus tendo eſt, oriturque mox ſupra poſteriorem partem condyli interni femoris, juxta latus internum (e); ſuperius, tenue (f), oritur a mar-

(o) Conferatur porro Albin. Hiſt. Muſcul. Lib. 3. pag. 579. 580.

(a) Albin. Tab. Muſcul. 24. Fig. 10. a. — q. Euſtach. Tab. 34. Q. R. Tab. 31. i. k.

(b) Albin. Tab. 24. Fig. 10. a. b. c. c. d. e. e. f. Euſtach. Tab. 34. Q.

(c) Albin. Tab. 24. Fig. 10. g. h. i. i. k. Euſtach. Tab. 34. R.

(d) Albin. Tab. 24. Fig. 10. b.

(e) Id. Tab. 24. Fig. 10. c. c.

(f) Id. Tab. 24. Fig. 10. d.

margine partis poſterioris femoris, juxta latus internum, mox ſupra principium inferius (g). Caput exterius principio tendineo oritur ab eminentia oblonga, quæ in latere externo femoris, juxta partem poſteriorem, mox ſupra ſinum, e quo naſcitur Popliteus (h). Ab utroque capite tendinoſo ſuperficies ſimilis decurrrit (i). Utriusque capitis caro, craſſa admodum, in mucronem (k) definit, tendoque enascitur communis (l), qui ſe tendini Solei (m) adjungit, & cum eo ita dictum tendinem Achillis (n) producit, inſertum poſticæ eidemque inferiori parti prominentis tuberis calcanei, quod calcem efficit (o). Capiti ejus interiori ſubjacet burſa magna, accreta tendineæ parti illius capitis, extremo Semitendinoſi, & capſæ genu juxta condylum interiorem, cui capita etiam pertinaciter accrescunt.

Attollit calcem, plantamque in poſteriora dirigit: genu præterea curvare poteſt in poſteriora.

PLAN-

(g) Albin. Tab. 24. Fig. 10. e. e.
(h) Id. Tab 24. Fig. 10 h. i. i.
(i) Id. Tab. 24. Fig. 10. f. k.
(k) Id. Tab. 24. Fig. 10. l. m.
(l) Id. Tab. 24. Fig. 10. n. Euſtach. Tab. 34. S.
(m) Albin. Tab. 24. Fig. 10. o. p.
(n) Id. Tab. 24. Fig. 10. q. Euſtach. Tab. 34. T. Tab. 30. 2.
(o) Albin. Tab. 24. Fig. 10. r. r.

PLANTARIS (a).

Oritur a radice condyli externi femoris, mox juxta internam partem ortus Gemelli (*b*), pertinaciter capſæ genu adhærens. Venter brevis in tendinem prælongum (*c*) deſinit, qui inter Soleum & Gemellos oblique deſcendit, & inſeritur interno lateri calcanei juxta finem tendinis Achillis (*d*). Actio eadem, quæ Gemelli.

SOLEUS (a).

Incipit a capite ſuperiore fibulæ, magnaque portione ſpinæ, quæ infra caput illud a poſteriore parte eminet (*b*); ab eminentia tibiæ, quæ in ejus poſteriore parte, non longe a capite ſuperiore, obliqua jacet (*c*); &, ubi illa deſinit, continuo a margine poſteriore ſpinæ interioris tibiæ, ul-

(*a*) Albin. Tab. Muſcul. 24. Fig. 11. a. a. b. Euſtach. Tab. 34. N.
(*b*) Albin. Tab. 24. Fig. 11. a. a.
(*c*) Id. Tab. 24. Fig. 11. b. Euſtach. Tab. 34. N. — α.
(*d*) Albin. Tab. 9. Ξ. in pede dextro.
(*a*) Albin. Tab. Muſcul. 24. Fig. 8. a. — p. Fig. 9. a. — i. Euſtach. Tab. 34. O.
(*b*) Albin. Tab. 24. Fig. 8. a. a. b. b. c. c. Fig. 9. a. Euſtach. Tab. 34. O. — α.
(*c*) Albin. Tab. 24. Fig. 8. d. e. Fig. 9. b. c. c. Euſtach. Tab. 34. O. — β.

ultra mediam osfis hujus longitudinem (*d*). Superficies tendinofæ longe excurrunt (*e*), & pars tendinea carnem bifariam fepti modo diftinguit (*f*); intus autem in carne fere in ipfo fummo initio mufculi incipit. Carnes ex utroque latere defcendendo convergunt (*g*), acceduntque ad feptum tendineum (*h*). Caro ab utroque latere in mucrones abit (*i*), quorum interior (*k*), crasfior, infignior, longius excurrit. Abit denique in tendinem (*l*), qui, conjunctus cum tendine Gemelli (*m*), format tendinem Achillis (*n*), infertum pofticæ eidemque inferiori parti prominentis tuberis calcanei, quod calcem efficit (*o*); præterit fuperiorem, ad quam fe applicat, quoties in priora pes extremus flectitur; eoque æquabilis effecta eft, & inter eam tendinemque interjecta burfa notabilis, accreta utrique: eminet intra eam glandulofi quid, implens intervallum, quod in-

(*d*) Albin. Tab. 24. Fig. 8. e.f.f.
(*e*) Id. Tab. 24. Fig. 8. g. h.
(*f*) Id. Tab. 24. Fig. 8. i. i. Fig. 9. e. e.
(*g*) Id. Tab. 24. Fig. 8. k. k. l. l.
(*h*) Id. Tab. 24. Fig. 8. i. i.
(*i*) Id. Tab. 24. Fig. 8. m. n.
(*k*) Id. Tab 24. Fig. 8. n.
(*l*) Id. Tab. 24. Fig 8. o.
(*m*) Id. Tab. 24. Fig. 9. g. g.
(*n*) Id. Tab. 24. Fig. 9. h. Euftach. Tab. 34. T.
(*o*) Albin. Tab. 24. Fig. 9. i. i.

inter tendinem ſuperioremque tuberis partem eo tempore intercedit, quo crus in pede extremo recte inſiſtit, preſſum autem cum pes in priora flectitur, exſudansque humorem lubricum, unde liberior mobilitas.

Commiſſuram pedis extremi cum crure recte flectit in partem poſteriorem, attollit ergo calcem, plantamque in poſteriora dirigit, crus inclinat in poſteriora.

POPLITEUS (*a*).

Tendo, quo incipit, oritur e ſinu, qui eſt in medio partis inferioris lateris externi condyli exterioris femoris, mox ſupra marginem, quo is in tibia innititur (*b*); pars oriri ſolet aut a genu cartilagine ſemilunari exteriore, aut a ligamento lato genu articuli. Deſcendit oblique ad tibiam, & inſerit ſe illi parti amplitudinis poſterioris tibiæ, quæ eſt inter radicem capitis ejus ſuperioris, eminentiamque oblongam, unde Solei origo; totaque ultimi extremi latitudine pertinet ad internum marginem tibiæ, qui nempe ſpectat alterum crus (*c*). Tendini pertinaciter accreta capſa articuli genu.

Crus, flexo genu, ſic convertit, ut priorem pedis extremi partem dirigat ad pedem alterum.

FLE-

(*a*) Albin. Tab. Muſcul. 23. Fig. 1. a.— d. Euſtach. Tab. 36. y.
(*b*) Albin. Tab. 23. Fig. 1. a. b. Euſtach. Tab. 36. y.— β.
(*c*) Albin. Tab. 23. Fig. 1. d. d.

FLEXOR LONGUS DIGITORUM PEDIS (*a*).

Oritur a pofteriore parte tibiæ, infra longitudinem prope mediam illius eminentiæ, a qua Soleus oritur (*b*), porro pergit oriri a pofteriore parte tibiæ (*c*), & a parte proxima ligamenti, quod inter tibiam & fibulam intermedium (*d*); hæc autem pars tendinea, una cum proxima carnea, fubjecta Tibiali poftico. Tendo, ex carne oriens (*e*), per latus pedis extremi internum decurrit ad plantam (*f*); juxta malleolum, & ad eam eminentiam calcanei, quæ tali caput fuftinet, fub qua in latere pedis extremi procedit, ligamento retinetur (*g*). Ubi fe ad calcaneum atterit, nodum habet (*h*), porro tendini Flexoris longi pollicis portionem adjungit (*i*); ipfe vero caput accipit (*k*), quod e dua-

bus

(*a*) Albin. Tab. Mufcul. 25. Fig. 6. a.—g. Fig. 7. a.—d. Fig. 8. a.—n. Euftach. Tab. 36. L.

(*b*) Albin. Tab. 25. Fig. 6. a. b. Euftach. Tab. 36. L.—α. α.

(*c*) Albin. Tab. 25. Fig. 6. c. d. d.

(*d*) Id. Tab. 25. Fig. 6. e.

(*e*) Id. Tab. 25. Fig. 7. b.

(*f*) Id. Tab. 25. Fig. 7. c. Euftach. Tab. 36. L.—β.

(*g*) Albin. Tab. 5. e. in crure & pede extremo. Tab. 1. u. in crure & pede extremo. Tab. 9. δ. in pede dextro. Euftach. Tab. 30. ϱ.

(*h*) Albin. Tab. 25. Fig. 8. b.

(*i*) Id. Tab. 25. Fig. 8. c.

(*k*) Id. Tab. 25. Fig. 8. d. e. f. g. g. h. i.

bus a principio conſtat portionibus, quarum altera (*l*) oritur ab imo calcaneo, ante partem interiorem eandemque inferiorem tuberis, quod calcem efficit (*m*), altera tenui tendine incipit (*n*), & oritur ab inferiore parte calcanei, ante inferiorem eandemque exteriorem partem tuberis, quod calcem efficit (*o*). Tendo dein, una cum capite, quod ad eum accedit, abit in tendines quatuor (*p*), qui ad digitos quatuor parvos pertinent (*q*), per longitudinem quodammodo fiſſi, ligamentis retinentur (*r*), & oſſibus tertiis inſeruntur (*s*). Habet ſe eodem modo ut Profundus in manu, & tendines per fiſſuras tendinum Flexoris brevis transeunt.

Flectit tertii ordinis oſſa digitorum minorum in terram; in eandem partem & illa ſecundi, primique.

FLEXOR LONGUS POLLICIS PEDIS (*a*).

Origo huic eſt a fibulæ planitie poſteriore, ante tertiam partem longitudinis ejus incipiens, indeque a duabus ſequen-

(*l*) Albin. Tab. 25. Fig. 8. e.
(*m*) Id. Tab. 25. Fig. 8. g. g. Fig. 7. d. e. e.
(*n*) Id. Tab. 25. Fig. 8. f. h.
(*o*) Id. Tab. 25. Fig. 8. i.
(*p*) Id. Tab. 25. Fig. 8. k. l. m. n.
(*q*) Id. Tab. 25. Fig. 8. o. p. q. r.
(*r*) Id. Tab. 10. Fig. 18. s. t. u.
(*s*) Id. Tab. 25. Fig. 8. s. s. s. s.
(*a*) Albin. Tab. Muſcul. 25. Fig. 10. a.—d. Fig. 8. ε.—θ. Euſtach. Tab. 36. K.

quentibus fere ad malleolum usque pergens (*b*). Fibræ ab utroque latere defcendentes convergunt (*c*). Tendo, fat cito a latere, quod fpectat crus alterum, enafcens (*), circa cruris imum, carnem deferit, eadem obliquitate defcendere pergit, primo pone tibiam extremam, dein per finum lævem in parte pofteriore tali, dein per calcanei latus internum, finuatum, læve, infra finum, qui, fub fuftentaculo tali, tendini Flexoris longi digitorum paratus eft. In hoc decurfu ligamento retinetur (*d*), quod a marginibus tali finus fupra dicti & a calcaneo procedit, huicque canali membranis obfequiofis laxe adnectitur tendo. Pergit per plantam, &, accepta a tendine Flexoris longi digitorum portione auctus (*e*), dein per longitudinem quodammodo fiffus (*f*), inter offa fefamoïdea procedens, ad poftremum infertus eft osfi ultimo pollicis, & afperæ quidem eminentiæ, quam ab inferiore parte juxta caput primum habet (*g*), hoc in decurfu ligamentis contentus (*h*).

Pollicem flectit deorfum. Juvat digitorum Flexorem, ab eo vicisfim adjutus. TI-

(*b*) Albin. Tab. 25. Fig. 10. a. a. b. b. Euftach. Tab. 36. K.—α. α.
(*c*) Albin. Tab. 25. Fig. 10. c. c.
(*) Euftach. Tab. 36. K.—β.
(*d*) Albin. Tab. 9. Φ. in pede dextro. Euftach. Tab. 30. ę.
(*e*) Albin. Tab. 25. Fig. 8. ζ.
(*f*) Id. Tab. 25. Fig. 8. η.
(*g*) Id. Tab. 25. Fig. 8. θ.
(*h*) Id. Tab. 10. Fig. 18. c. d. d.

TIBIALIS POSTICUS (*a*).

Extrinsecus tendinosus oritur a tibiæ planitie, quæ mox a radice illius partis, cui fibula innixa, deorsum per eam partem, qua fibulam spectat, aliquantum porrecta (*b*); porro a fibula (*c*); a cujus deinde planitie illa tota oriri pergit, quæ a superiore capite ejus per plus, quam duas tertias partes longitudinis, qua tibiæ obversa, se extendit (*d*); ex parte etiam ex ligamento incipit, quod inter cruris ossa, qua dehiscunt, medium. Hæc pars, quæ a fibula oritur, etiam superficiem tendinosam habet (*e*). Tendo, ex carne oriens (*f*), pone malleolum internum procedit (*g*), qua crassior & durior. Juxta malleolum ligamento retinetur (*h*); post infra malleolum (*i*), procedit per latus internum pedis extremi plantam versus (*k*), ubi ligamento etiam

(*a*) Albin. Tab. Muscul. 24. Fig. 12. a.—f. Fig. 13. a.—e. Fig. 14. a.—p. Eustach. Tab. 37. x.

(*b*) Albin. Tab. 24. Fig. 12. a. a. b. b.

(*c*) Id. Tab. 24. Fig. 12. c. Eustach. Tab. 37. x.—α.

(*d*) Albin. Tab. 4. υ. υ. in crure.

(*e*) Id. Tab. 24. Fig. 12. d. d.

(*f*) Id. Tab. 24. Fig. 12. e. Eustach. Tab. 37. x.—β.

(*g*) Albin. Tab. 24. Fig. 12. f.

(*h*) Id. Tab. 5. e. in crure. Tab. 1. u. in crure & pede extremo. Tab. 9. δ. in pede dextro. Eustach. Tab. 30. ϱ.

(*i*) Albin. Tab. 24. Fig. 13. a.

(*k*) Id. Tab. 24. Fig. 13. b. Eustach. Tab. 33. n. 22. 23.

etiam retinetur (*l*). Qua ad tali caput (interveniente ligamento, quod, a calcaneo ad os naviculare per plantam deductum, ſuſtinet tali caput) & ad inferiorem quoque & eandem poſteriorem partem tuberis osſis navicularis applicatus tendo eſt, nodum habet (*m*). Præcipua pars tendinis ſubtus naviculari inferitur, in inferiora maxime eminenti parti tuberis craſſi & inæquabilis, quo os illud ab interno pedis latere eminet (*n*); excurrente portione tenuiore inſeritur osſis cuneïformis primi parti inferiori, juxta poſteriora (*o*); præterea portio tenuior ſe inſerit imæ deorſum protuberanti parti osſis cuneïformis tertii (*p*), excurritque præterea ad os metatarſi ſecundum (*q*), ad tertium (*r*), eorumque capitis primi parti inferiori ſe inſerit, ab illo latere, quo ſpectat digitum minimum. Dat portionem Flexori pollicis brevi (*s*), alia a tendine abſcedit portio (*t*) in duas abeuns; quarum altera inſeritur calcanei inferiori parti, (pro-

(*l*) Albin. Tab. 1. x. in pede extremo. Tab. 9. ζ. in pede dextro. Euſtach. Tab. 33. n. 24.
(*m*) Id. Tab. 24. Fig. 14. b.
(*n*) Id. Tab. 24. Fig. 14. c.
(*o*) Id. Tab. 24. Fig. 14. d. d. Euſtach. Tab. 33. n. 23.
(*p*) Albin. Tab. 24. Fig. 14. e, f.
(*q*) Id. Tab. 24. Fig. 14. g.
(*r*) Id. Tab. 24. Fig. 14. h.
(*s*) Id. Tab. 24. Fig. 14. i.
(*t*) Id. Tab. 24. Fig. 14. l.

Qq 2

prope cubiforme, haud longe a margine ejus illo, qui eſt juxta talum (*u*); altera inſeritur inferiori parti oſſis cubiformis, haud longe a poſticâ parte cuneïformis tertii (*v*).

Pedem extremum oblique in internam partem retrorſum attollit, in interiora poſterioraque convertens plantam.

PERONEUS LONGUS (*a*).

Oritur principio altero a laterali externa parte partis prioris radicis capitis ſuperioris fibulæ (*b*); a vicina, a priore parte, tibia (*c*); altero principio a plusquam dimidia, eaque ſuperiore parte illius ſpinæ fibulæ, quæ in externo ejus latere, non multum infra caput ſuperius, eminere incipit (*d*). Ex parte etiam abſcedit a vagina tendinea cruris, ejusque propagine, quæ inter hunc Peroneum & Extenſorem longum digitorum interjecta. Tendo, e carnis parte exteriore naſcens (*e*), ſe ad poſteriora malleoli externi flectit, ibique nodum primum habet (*f*), porro ad eminentiam,

(*u*) Albin. Tab. 24. Fig. 14. m. n.

(*v*) Id. Tab. 24. o. p.

(*a*) Albin. Tab. Muſcul. 24. Fig. 3. a.—i. Fig. 4. a.—g. Fig. 5. a.—l. Euſtach. Tab. 36. z.

(*b*) Albin. Tab. 24. Fig. 3. a. b. Fig. 4. a. Euſtach. Tab. 36. z.—α.

(*c*) Albin. Tab. 24. Fig. 4. b.

(*d*) Id. Tab. 24. Fig. 3. c. d. e. Fig. 4. c. c. d. d. Euſtach. Tab. 36. z.—β. β.

(*e*) Albin. Tab. 24. Fig. 4. g. Euſtach. Tab. 36. z.—γ.

(*f*) Albin. Tab. 24. Fig. 3. f. g. Euſtach. Tab. 36. z.—δ.

tiam, quæ eſt in latere externo malleoli, ubi nodus ſecundus datur (*g*), denique ad eminentiam, quam os cubiforme in inferiore parte habet, nodo inſigniore ibi gaudens (*h*), perque ſinum illum incedit, qui ante eminentiam illam. Retinetur tendo ad malleolum & calcanei tuberculum ligamento (*i*), ſimilique craſſo valente in ſinu cubiformis, hocque ab imo calcanei tubere, juxta ejus priorem partem eminente, in priora procedit, ſeſeque cubiformi inſerit (*k*). Extremo autem ſuo inſeritur imæ, deorſum maxime eminenti parti oſſis metatarſi pollicis (*l*). Abſcedit a tendine portio, quæ ſe circum tuber oſſis cubiformis flectit (*m*), inque duas partes abit (*n*), inſertas oſſi cuneiformi magno (*o*); aliaque portio, a tendine abſcedens, inſeritur oſſi metatarſi ſecundo (*p*).

Plantam vertit extrorſum, modice in poſteriora.

P E-

(*g*) Albin. Tab. 24. Fig. 3. h. Fig. 5. a. b.
(*h*) Id. Tab. 24. Fig. 3. i. Fig. 5. c.
(*i*) Id. Tab. 5. n. & p. in crure & pede extremo. A. in pede ſiniſtro Tab. 9. Euſtach. Tab. 31. u.
(*k*) Albin. Tab. 10. Fig. 21. N. O. Euſtach. Tab. 31. w.
(*l*) Albin. Tab. 24. Fig. 5. d.
(*m*) Id. Tab. 24. Fig. 5. e.
(*n*) Id. Tab. 24. Fig. 5. f. g.
(*o*) Id. Tab. 24. Fig. 5. h. i.
(*p*) Id. Tab. 24. Fig. 5. k. l.

PERONEUS BREVIS (a).

Oritur a fibula, & infra partem illam subtus pergit oriri a spina, quæ a posteriore parte latitudinem lateris externi fibulæ terminat (b); haud ita procul a malleolo oriri a spina illa desinens. Ex parte etiam oritur a vagina tendinea cruris, ejusque propagine, interserta Peroneo huic, longoque ab una parte, ab altera Extensori longo digitorum & Peroneo tertio. Tendo, ad quem, (ut in reliquis cruri appositis) caro forma pennata accedit, se ad malleolum inflectit (c), latior & crassior, ac ligamento, quod cum tendine longi commune habet, contentus (d), pergit juxta superiorem partem eminentiæ calcanei (e), per ligamentum alterum (f), sibi cum tendine longi commune, sed per proprium canalem, & inseritur superiori eidemque posteriori parti radicis illius tuberis, quod est in osse metatarsi quinto, ab exteriore parte capitis ejus primi (g).

Plantam vertit, ut longus.

EX-

(a) Albin. Tab. Muscul. 24. Fig. 1. a.—e. Fig. 2. a. a. Eustach. Tab. 37. y. Tab. 38. B. Tab. 33. n. 8.

(b) Albin. Tab. 24. Fig. 1. a. Fig. 2. a. a. Eustach. Tab. 37. y. -- α. α. Tab. 38. n. 8.—α. α.

(c) Albin. Tab. 24. Fig. 1. b. c. Eustach. Tab. 37. y.—β. γ.

(d) Albin. Tab. 5. n. in crure. Eustach. Tab. 31. u.

(e) Albin. Tab. 24. Fig. 1. d.

(f) Id. Tab. 5. o. in pede extremo. Tab. 9. F. in pede sinistro. Eustach. Tab. 31. w.

(g) Albin. Tab. 24. Fig. 1. e. Eust. Tab. 37. y. -- δ. Tab. 33. n. 19.

EXTENSOR LONGUS DIGITORUM PEDIS (a), ET PERONEUS TERTIUS (b).

Pofterior, fæpe prioris pars, una cum eodem defcribi commode poteft (c). Prima pars principii oritur a radice capitis fuperioris tibiæ, mox ante fibulæ caput fuperius (d); & a fpina priore fibulæ capitis illius (e); caro hujus principii fubtus quoque procedit a vagina tendinea cruris (f), a propagine, quam vagina illa interferit Extenfori huic & Tibiali antico. Principii pars altera, ab initio tendinea (g), oritur a fibulæ fpina priore (h), & quidem a margine ejus, qui fpectat tibiam. Tertia pars principii, ab initio maximam partem tendinea (i), oritur a fibulæ fpina priore, & a planitie, in quam fpina illa ab inferiore parte abit (k). Pars, quæ ad Peroneum pertinet, oritur etiam a propagine vaginæ tendineæ cruris. Tendo (*), ex mufculo hoc procedens,

(a) Euftach. Tab. 35. H. Tab. 32. n. 5.
(b) Id. Tab. 35. I. Tab. 32. n. 9. Tab. 29. Ψ. fin. Tab. 30. n. n.
(c) Albin. Tab. Mufcul. 25 Fig. 1. a. — z. α. — κ.
(d) Id. Tab. 25. Fig 1. a. b. b. Euftach. Tab. 35. H. — α.
(e) Albin. Tab. 25. Fig 1. c. c. Euftach. Tab. 35. H. — β. β.
(f) Albin. Tab. 25. Fig. 1. d.
(g) Id. Tab. 25. Fig. 1. f. g.
(h) Id. Tab. 25. Fig. 1. h. h.
(i) Id. Tab. 25. Fig. 1. i. i.
(k) Id. Tab. 25. Fig. 1. k. k.
(*) Euftach. Tab. 35. H. — γ.

cedens, ſub ligamento transverſo, ad cruris pedisque extremi confinium, decurrit (*l*), finditque ſe in quatuor tendines, per dorſum pedis ad digitos quatuor minores decurrentes (*m*). Qui per dorſum digiti minimi decurrit, tendo (*n*) inſeritur tuberculo oblongo transverſoque, quod in capite primo oſſis ſecundi ordinis hujus digiti, a ſuperiore parte (*o*); portiones autem, ad os tertium procurrentes (*p*), abeunt in extremum commune (*q*), inſertum ſuperiori parti capitis primi oſſis tertii (*r*). Ad tendinis hujus externum latus accedit aponeuroſis (*s*), producta ab Abductore minimi (*t*). Ad alterum hujus & cæterorum tendinum latus, accedit pariter aponeuroſis (*u*); quæ partim a capſa articuli digiti cum metatarſo, partim ab Interoſſeo primo, partim a Lumbricali, partimque a latere oſſis primi, procedit. Tendines trium ſequentium digitorum ſe con-

(*l*) Albin. Tab. 9. X. in pede ſiniſtro. Tab. 1. q. in pede. Euſtach. Tab. 38. n. 7. Tab. 30. λ.
(*m*) Albin. Tab. 25. Fig. 1. l. m. n. o. p. Euſt. Tab. 35. H. -- δ. ε. ζ. η.
(*n*) Id. Tab. 25. Fig. 1. q.
(*o*) Id. Tab. 25. Fig. 1. r.
(*p*) Id. Tab. 25. Fig. 1. s. t.
(*q*) Id. Tab. 25. Fig. 1. u.
(*r*) Id. Tab. 25. Fig. 1. v.
(*s*) Id. Tab. 25. Fig. 1. w.
(*t*) Id. Tab. 25. Fig. 1. x. Euſtach. Tab. 35. K. — β.
(*u*) Albin. Tab. 1. h. Tab. 2. q. Tab. 3. u. in pede extremo.

conjungunt cum tendinibus Extenſoris brevis digitorum pedis (*v*), deſinuntque ad oſſa ſecundi ordinis (*w*); portiones autem, ad os tertium procurrentes (*x*), quarum altera (*y*) eſt Extenſoris brevis, altera (*z*) longi, deſinunt in commune extremum (*a*), ſuperiori parti capitis primi oſsis tertii inſertum (*b*). Abſcedit ab Interoſſeis & a capſa articuli aponeuroſis, quæ a latere exteriore ad tendinis communis partem illam accedit, quæ ab Extenſoris brevis tendine effecta (*c*). Tendo ita dicti Peronei tertii, ex carne præcedentis ortus (*d*), inſeritur ſuperiori parti radicis capitis primi oſsis metatarſi quinti, juxta commiſſuram cum quarto, indeque continuo ſuperiori ſpinæ ejusdem illius quinti (*e*), ad cruris autem pedisque extremi confinium decurrit ſub ligamento (*f*) per canalem, ipſi cum Extenſore longo digitorum communem.

Ex-

(*v*) Albin. Tab. 25. Fig. 1. y. y. y. z. z.
(*w*) Id. Tab. 25. Fig. 1. β.
(*x*) Id. Tab. 25. Fig. 1. γ. δ.
(*y*) Id. Tab. 25. Fig. 1. γ.
(*z*) Id. Tab. 25. Fig. 1. δ.
(*a*) Id. Tab. 25. Fig. 1. ε.
(*b*) Id. Tab. 25. Fig. 1. ζ.
(*c*) Id. Tab. 25. Fig. 1. η.
(*d*) Id. Tab. 25. Fig. 1. θ. Euſtach. Tab. 35. I.—β.
(*e*) Albin. Tab. 25. Fig. 1. κ. Euſtach. Tab. 35. I.—γ.
(*f*) Albin. Tab. 9. X. in pede ſiniſtro. Tab. 1. q. in pede. Euſtach. Tab. 38. n. 7. Tab. 30. λ.

Extendit secundum, tertiumque ordinem ossium, qui in digitis sunt; extendit, & primum, eundemque postquam porrexit, sursum flectit Extensor longus. Peroneus autem tertius pedis extremi priorem partem attollit.

TIBIALIS ANTICUS (*a*).

Oritur a tibia (*b*) primum mox ante Extensoris digitorum longi ortum, occupans deinde ortu suo totam planitiei externæ tibiæ, a capite ejus secundum spinam priorem fere usque ad medium tibiæ longitudinis, latitudinem; & ex parte etiam affixus est proximo ligamento, cruris ossium intervallo interserto. Sed & exinde per cruris longitudinem ab eodem ligamento, & imprimis a tibia, juxta ligamentum illud oriri diu, & ad duas tertias longitudinis tibiæ partes plus minus usque, pergit. Præterea a vagina tendinea cruris subtus abscedit (*c*); oritur & a vaginæ illius propagine, quæ interserta Tibiali huic, & Extensori longo digitorum pedis. Oblique descendit ad partem interiorem pedis, tendo (*) sese subjicit cornubus ligamenti, quo ten-

(*a*) Albin. Tab. Muscul. 24. Fig. 6. a.—d. Fig. 7. a.—d. Eustach. Tab. 35. P.

(*b*) Albin. Tab. 24. Fig. 6. a. a.

(*c*) Id. Tab. 24. Fig. 6. b.

(*) Eustach. Tab. 35. P.—*a*.

tendines in flexu ad pedem extremum coërcentur (*d*), & in extremum bicorne desinit; cornu alterum inseritur rotundæ illi lævique superficiëi, quæ in ossis cuneïformis magni parte interiore eademque inferiore, & finitima ossi metatarsi primo (*e*); alterum, idque tenuius, mox ante finem præcedentis, desinit ad eminentiam, quæ in capite primo ossis metatarsi pollicis, ab interno latere, atque ibi fere in medio (*f*). Ante finem tendinis, ubi is ad dorsum pedis se atterit, subjecta & accreta tendini bursa tenuis.

Pedis extremi priorem partem attollit.

EXTENSOR PROPRIUS POLLICIS PEDIS (*a*).

Incipit a planitie fibulæ, quæ tibiæ a priore parte obversa (*b*); ab eaque planitie secundum totam fere longitudinem spinæ prioris; infra autem, ubi spina illa quasi retusa, a planitie inde nata. Perque originis hujus longitudinem oritur etiam a ligamento, quod ad tibiam pertinet, crurisque ossium intervallum maximam partem occludit: & exigua

(*d*) Albin. Tab. 1. r. t. in crure & pede extremo. Tab. 9. ι. κ. in pede dextro, & Y. Z. in sinistro. Eustach. Tab. 38. n. 7.

(*e*) Albin. Tab. 24. Fig. 7. a. b.

(*f*) Id. Tab. 24. Fig. 7. c. d.

(*a*) Albin. Tab. Muscul. 25. Fig. 11. a. -- f. Eustach. Tab. 33. n. 12.

(*b*) Albin. Tab. 25. Fig. 11. a. a. Eustach. Tab. 33. n. 12. α. α.

gua quoque portione procedit infra a tibia (*c*), proxime ligamentum. Descendit ad pedem, & retinetur utroque cornu ligamenti transversi, quod a priore parte cruris juxta pedis extremi principium est (*d*). Tendo autem inseritur superiori parti capitis primi ossis ultimi pollicis (*e*). Ad tendinis latus externum accedit aponeurosis, veniens e capsa articuli pollicis cum metatarso (*f*); ab altero latere accedit similis aponeurosis (*g*), procedens partim a tendine Abductoris pollicis (*h*), partim a capsa articuli pollicis cum metatarso (*i*).

Extendit, ac deinde sursum flectit, pollicis os ultimum, sic & primum.

REGIO XXIX. PEDIS EXTREMI DIGITORUMQUE EJUS DORSUM.

Solus in hac regione datur Extensor brevis digitorum pedis (*a*). Supra huncce autem musculum, per dorsum itaque pedis, aponeurosis excurrit, qualis per dorsum manus.

EX-

(*c*) Albin. Tab. 25. Fig. 11. b.
(*d*) Id. Tab. 9. Y. Z. in pede sinistro. Tab. 1. r. t. in crure pedeque extremo. Eustach. Tab. 38. n. 7.
(*e*) Id. Tab. 25. Fig. 11. d. e.
(*f*) Id. Tab. 25. Fig. 11. f.
(*g*) Id. Tab. 25. Fig. 13. f. i. i.
(*h*) Id. Tab. 25. Fig. 13. g.
(*i*) Id. Tab. 25. Fig. 13. h.
(*a*) Eustach. Tab. 33. n. 18.

EXTENSOR BREVIS DIGITORUM PEDIS (a).

Oritur a superiore parte tuberis, quo pars prior calcanei in superiora eminet (*b*). Angustior & tenuior primo initio, ab eo paulatim latior, & crassior, findit se in quatuor portiones (*c*), ad pollices & tres subsequentes digitos parvos pertinentes. Portio ad pollicem procedens (*d*), abit in tendinem (*e*), insertum eminentiae obliquae, quae in superiore parte ossis primi pollicis, mox ante caput ejus primum, juxta illud latus, quo spectat digitos parvos (*f*). Tendines, qui ad tres digitos parvos pertinent (*g*), cum tendinibus Extensoris longi digitorum conjunguntur in communes tendines, intermedia divisionis nota, & cum iis inseruntur (*h*).

Pollicem, digitosque in rectum porrigit, extendens omnes ordines ossium digitorum minorum, pollicis primum. Primum etiam tum pollicis tum parvorum flectit in superiora.

RE-

(*a*) Albin Tab. Muscul. 25. Fig. 9. a. — s. Eustach. Tab. 33. n. 18.
(*b*) Albin. Tab. 25. Fig. 9. a. a.
(*c*) Id. Tab. 25. Fig. 9. b. e. g. i.
(*d*) Id. Tab. 25. Fig. 9. b.
(*e*) Id. Tab. 25. Fig. 9. c.
(*f*) Id. Tab. 25. Fig. 9. d.
(*g*) Id. Tab. 25. Fig. 9. e. f. l, g. h. l., i. k. l.
(*h*) Conferantur, quae de insertione Extensoris longi digitorum dicta sunt pag. 316.

REGIO XXX. PLANTA CUM DIGITORUM PEDIS PARTE INFERIORE.

Ultimam hanc regionem occupant, Flexor brevis digitorum pedis (*a*), Abductor pollicis (*b*), Abductor digiti minimi (*c*), Lumbricales (*d*), Flexor brevis pollicis (*e*), Adductor pollicis (*f*), Transverſalis pedis (*g*), Flexor brevis digiti minimi (*h*), Interoſſei interni (*i*), Interoſſei externi (*k*).

Mox ſub integumentis plantæ occurrit Aponeuroſis, aponeuroſi volæ reſpondens. Hæc (*l*) oritur a calcanei tubere (*m*), lata ab ortu, inde primum paulo anguſtior, mox

(*a*) Albin. Tab. Muſcul. 25. Fig. 5. a.—p.
(*b*) Euſtach. Tab. 35. Q.
(*c*) Id. Tab. 36. A.
(*d*) Albin. Tab. Muſcul. 25. Fig. 8. t. u. v., w. x., y. z. α, β. γ. δ.
(*e*) Id. Tab. 25. Fig. 12. h.—s. Fig. 13. d. e.
(*f*) Id. Tab. 25. Fig. 14. f.—m.
(*g*) Id. Tab. 25. Fig. 14. t.—y.
(*h*) Id. Tab. 25. Fig. 15. d. e. f. g. Fig. 16. a.—e.
(*i*) Primus digiti tertii Id. Tab. 25. Fig. 4. l. m. m. n. o. p. Primus quarti Id. Tab. 25. Fig. 4. f. g. g. h. i. k. Primus quinti Id. Tab. 25. Fig. 4. a. b. b. c. d. e.
(*k*) Primus digiti ſecundi Id. Tab. 25. Fig. 2. t.—z. α. Fig. 3. r.—v. Secundus ejuſdem Id. Tab. 25. Fig. 2. n.—s. Fig. 3. l.—q. Secundus tertii Tab. 25. Fig. 2. g.—m. Fig. 3. f.—k. Secundus quarti Id. Tab. 25. Fig. 2. a.—f. Fig. 3. a.—e.
(*l*) Id. Tab. Muſcul. 10. Fig. 18. A.—H.
(*m*) Id. Tab. 10. Fig. 18. B.

mox latescens, craſſa, tenſa, & quaſi in faſciculos diſtincta eſt; ubi ad capita priora metatarſi appropinquavit, findit ſe in quinque portiones, ad digitos pertinentes (*n*), quæ ad poſtremum bifidæ complectuntur tendines, pollicis quidem Flexoris longi, reliquorum autem digitorum Flexoris brevis & longi: ab his portionibus propagines quoque tenues excurrunt ulterius per pinguem illam pulpam, quæ ſub extremis anterioribus oſſium metatarſi, & ad radices digitorum eſt. Portio, conjuncta cum aponeuroſi Abductorem pollicis tegente, accedit ad principium pollicis Flexoris brevis (*o*). Ab altera parte conjungitur cum aponeuroſi tegente Abductorem digiti minimi (*p*), quæ a tubere calcanei oritur (*q*); portionem inſerit capiti primo oſſis metatarſi digiti minimi (*r*), aliâ autem conjungitur cum aponeuroſi plantæ media (*s*), ſed hæc portio non ſemper talis invenitur; aliam porro portionem dat principiis Flexoris parvi digiti minimi, & Interoſſei ejusdem digiti (*t*). — Ab altera parte conjungitur plantæ aponeuroſis cum illa, quæ tegit Abductorem pollicis, pariterque a calcaneo oritur (*u*).

FLE-

(*n*) Albin. Tab. 10. Fig. 18. C. D. E. F. G.
(*o*) Id. Tab. 10. Fig. 18. H.
(*p*) Id. Tab. 10. Fig. 18. I. K. L. M. N.
(*q*) Id. Tab. 10. Fig. 18. K.
(*r*) Id. Tab. 10. Fig. 18. L.
(*s*) Id. Tab. 10. Fig. 18. M.
(*t*) Id. Tab. 10. Fig. 18. N.
(*u*) Id. Tab. 10. Fig. 18. O. P.

FLEXOR BREVIS DIGITORUM PEDIS (*a*).

Oritur ab ima parte calcanei, juxta radicem tuberis, quo calx efficitur, extrinſecus tendinoſus (*b*). A principio cohæret cum Abductore pollicis & minimi, ut & cum media plantæ aponeuroſi, ſic ut oriri ab ea videatur. Recta per plantam procedit, & in ejus prope medio partitur in quatuor portiones, ad quatuor digitos parvos pertinentes (*c*); quæque in tendinem vertitur (*d*). Quisque tendo abit in caudas duas (*e*), quæ cohærent inter ſe parte tenuiore (*f*), & ad poſtremum inſeruntur tuberculis (*g*), quæ ſunt in inferiore parte utriusque marginis oſſis ſecundi ordinis digiti, ante caput oſſis illius primum. Retinentur, ubi juxta digitos decurrunt, ligamentis (*h*). Per fiſſuras transeunt tendines Flexoris longi digitorum pedis (*i*). Tendines hujus itaque muſculi ſe habent, ut in manu Sublimis tendines (*k*).

Fle-

(*a*) Albin. Tab. Muſcul. 25. Fig. 5. a.—p.
(*b*) Id. Tab. 25. Fig 5. a. b.
(*c*) Id. Tab. 25. Fig. 5. c. l. n. p.
(*d*) Id. Tab. 25. Fig. 5. d. m. o.
(*e*) Id. Tab. 25. Fig. 5. f. g.
(*f*) Id. Tab. 25. Fig. 5. h.
(*g*) Id. Tab. 25. Fig. 5. i. k.
(*h*) Id. Tab. 18. Fig. 18. s. t.
(*i*) Conf. quæ de inſertione Flexoris longi digitorum pedis dicta ſunt pag. 307.
(*k*) De his dictum in deſcriptione Sublimis pag. 258.

Flectit offa fecundi ordinis, atque etiam illa primi, utraque deorfum.

ABDUCTOR POLLICIS PEDIS (a).

Ortus ex parte inferiore lateris interni radicis tuberis calcanei, quo calcem efficit (*b*), extrinfecus tendinofus (*c*), eaque parte a principio diu cohærens cum aponeurofi tegente, etiam procedit a ligamento, quod illi calcanei parti, qua fuftinetur cervix tali, ab inferiore parte adnexum, continet tendinem Flexoris longi pollicis. Incedit recta ab ortu ad finem, fibrarum autem decurfus talis eft, ut in angulos conveniant (*d*). Abeunt hæ in tendinem (*e*), qui ad poftremum conjunctus cum ligamento (*f*), quod ab offe fefamoïdeo pollicis exteriore pertinet ad os pollicis primum, cum eoque ligamento inferitur interiori, & eidem inferiori parti capitis, quo os primum pollicis incipit (*g*).

Abducit pollicem a reliquis digitis.

A. B.

(*a*) Albin. Tab. Mufcul. 25. Fig. 12. a.—e. Fig. 13. a. a. b. b. c. Euftach. Tab. 35. Q.

(*b*) Albin. Tab. 25. Fig. 13. a. a. Fig. 12. a. Euftach. Tab. 35. Q.—*α*.

(*c*) Albin. Tab. 25. Fig. 12. b.

(*d*) Id. Tab. 25. Fig. 13. b. b.

(*e*) Id. Tab. 25. Fig. 12. 13. c. Euftach. Tab. 35. Q.—*β*.

(*f*) Albin. Tab. 25. Fig. 12. f.

(*g*) Id. Tab. 25. Fig. 12. e. Euftach. Tab. 35. Q.—*γ*.

ABDUCTOR DIGITI MINIMI PEDIS (a).

Duabus partibus conſtat (b); quarum altera (c) ſeparatum tendinem efficit, qui ſe in aliis cum tendine partis alterius conjungit in unum, in aliis totus ſeparatus eſt. Oritur ab inferiore & exteriore parte tota radicis tuberis calcanei, quo calcem efficit (d); pars altera extrinſecus in totum tendinoſa (e), altera ex parte (f); partibus illis tendinoſis cum aponeuroſi, qua teguntur, cohærent. Recta procedit ad ſuum digitum. Tendo, in quem ad poſtremum abit (g), inſeritur externæ parti radicis capitis primi oſſis primi digiti minimi (h). Pars aponeuroſis, qua intectus eſt (i), inſeritur poſticæ parti tuberis magni & inæquabilis, quod e capite primo oſſis metatarſi digiti minimi in externum pedis latus eminet (k). Et hæc ſubinde portio eſt, a muſ-

(a) Albin. Tab. Muſcul. 25. Fig. 17. a. — g. Fig. 18. a. — g. Euſtach. Tab. 36. A.

(b) Albin. Tab. 25. Fig. 18. a. b.

(c) Id. Tab. 25. Fig. 18. a.

(d) Id. Tab. 25. Fig. 18. c. c. Fig. 17. e. e. Euſtach. Tab. 36. A. — α.

(e) Albin. Tab. 25. Fig. 18. d.

(f) Id. Tab. 25. Fig. 18. e.

(g) Id. Tab. 25. Fig. 18. b. Fig. 19. f.

(h) Id. Tab. 25. Fig. 17. c. Fig. 18. g. Euſtach. Tab. 26. A. -- B.

(i) Albin. Tab. 25. Fig. 17. f.

(k) Id. Tab. 25. Fig. 17. g.

a mufculo abfcedens. Adjungit porro aponeurofem ad Extenforis tendinem, qui digiti minimi eft (*l*).

Abducit digitum minimum a reliquis, & fimul flectit in terram.

LUMBRICALES PEDIS (*a*).

Oriuntur omnes ex tendinibus Flexoris longi digitorum, refpondent in genere Lumbricalibus manus, in tendines (*b*) abeunt, qui fe affigunt tuberculis digitorum offium primi ordinis, quæ funt in inferiore parte illius lateris capitum priorum, quo pollicem fpectant, tenuioremque aponeurofem adjungunt tendinibus Extenforis longi digitorum.

Agendi ratione refpondent Lumbricalibus manus.

FLEXOR BREVIS POLLICIS PEDIS (*a*).

Principio tendineo longiore oritur ab inferiore eademque pedem alterum fpectante parte extremi prioris calcanei, mox pone commiffuram ejus cum cubiformi (*b*); breviore ab ima parte offis cuneiformis, quod medium magnitudine (*c*); abit præterea aponeurofis plantæ mediæ in principium

(*l*) Albin. Tab. 25. Fig. 1. w. Euftach. Tab. 36. A.—δ.

(*a*) Albin. Tab. Mufcul. 25. Fig. 8. t. u. v., w. x., y. z. α., β. γ. δ.

(*b*) Id. Tab. 25. Fig. 8. v. x. α. δ.

(*a*) Albin. Tab. Mufcul. 25. Fig. 12. h.—s. Fig. 13. d. e.

(*b*) Id. Tab. 25. Fig. 12. h. i.

(*c*) Id. Tab. 25. Fig. 12. k. l.

pium Flexoris brevis pollicis (*d*). Accipit etiam partem a tendine Tibialis poſtici (*e*). Accedit pro parte ad tendinem Abductoris pollicis (*f*), caudasque ſuas inſerit oſſibus ſeſamoïdeis (*g*), alteram interno, illi nempe, quod reſpicit pedem alterum, alteram externo, atque etiam proximæ parti capitis primi oſſis primi pollicis, cum tendineo extremo Adductoris pollicis & Transverſalis pedis, commune extremum habens (*h*). Pertinaciſſime connexæ caudæ ſunt cum capſa, articulum pollicis cum metatarſo continente.

Deorſum flectit os primum pollicis.

ADDUCTOR POLLICIS PEDIS (*a*).

Oritur ab ima parte oſſis metatarſi quarti, juxta radicem capitis ejus primi, & a parte inferiore fere tota capitis primi oſſis metatarſi tertii, proximaque ſecundi (*b*); a priore parte vaginæ, Peronei longi tendinem in planta continentis, quæ eſt pars ligamenti, a calcaneo per plantam usque ad

(*d*) Albin. Tab. 25. Fig. 12. m.
(*e*) Id. Tab. 24. Fig. 14. i.
(*f*) Id. Tab. 25. Fig. 12. o. o. Fig. 13. e.
(*g*) Id. Tab. 25. Fig. 12. p. q. r. s.
(*h*) Id. Tab. 25. Fig. 12. t. v.
(*a*) Albin. Tab. Muſcul. 25. Fig. 14. f.—m.
(*b*) Id. Tab. 25. Fig. 14. f. g.

ad metatarſum pertinentis (*c*). Porrigitur inde ad pollicis initium, & extremo ſuo tendineo primum ſe conjungit (*d*) cum extremo tendineo Flexoris brevis pollicis (*e*), cum eoque ſe inſerit poſteriori & eidem inferiori, & digitum ſecundum ſpectanti, parti osſis ſeſamoïdei pollicis, quod e duobus ejus vicinius digito ſecundo; dein conjungitur (*f*) cum ligamento, quod ab oſſe ſeſamoïdeo interiore pollicis ad os ejus primum pertinet (*g*), & cum eo ſe inſerit oſſi illi primo, inferiori parti illius lateris capitis ejus primi, quo digitum ſecundum reſpicit, non multum ultra primum capitis illius marginem (*h*).

Pollicis primum os deorſum flectit, & oblique ſimul digitum ſecundum verſus.

TRANSVERSALIS PEDIS (*a*).

Naſcitur e capſa, qua continetur articulus digiti quinti cum metatarſo (*b*), porro e capſa articulum digiti quarti cum ſuo oſſe metatarſi continente, & a proxima aponeuroſi veſtien-

(*c*) Albin. Tab. 25. Fig. 15. a. b. Fig. 14. b. a.
(*d*) Id. Tab. 25. Fig. 15. i. k.
(*e*) Id. Tab. 25. Fig. 15. p.
(*f*) Id. Tab. 25. Fig. 15. l.
(*g*) Id. Tab. 25. Fig. 15. n. Fig. 12. y.
(*h*) Id. Tab. 25. Fig. 15. m.
(*a*) Albin. Tab. Muſcul. 25. Fig. 14. t. — y.
(*b*) Id. Tab. 25. Fig. 14. u. w.

veſtiente ibi Interoſſeos digiti illius (c). Per transverſum ſecundum condylos metatarſi incedit; extremo ſuo ſe adjungit extremo tendineo communi pollicis Adductoris, Flexorisque brevis (d).

Pollicem ad digitos poſtremos attrahit; priorem itaque plantæ partem, per quam incedit, facit ex transverſo in terram concavam.

FLEXOR BREVIS DIGITI MINIMI PEDIS (a).

Oritur a ligamento, quod a cubiformis tubere imo procedens inſeritur capitibus primis oſſium metatarſi ſecundi, tertii, quarti, quinti, & tendinem Peronei longi in planta, inſtar vaginæ, continet (b); & præterea, juxta hoc caput a margine externo oſſis metatarſi quinti, qui inferiora ſpectat (c), & a media inferiore parte radicis capitis ejusdem oſſis. Findit ſe in partes duas, altera inſeritur exteriori margini amplitudinis inferioris oſſis metatarſi digiti minimi, mox pone caput ejus prius (d), altera eaque præcipua

(c) Albin. Tab. 25. Fig. 14. x.
(d) Id. Tab. 25. Fig. 14. y. y.
(a) Albin. Tab. Muſcul. 25. Fig. 15. d. e. f. g. Fig. 16. a. — e.
(b) Id. Tab. 25. Fig. 15. e. a.
(c) Id. Tab. 25. Fig. 16. a.
(d) Id. Tab. 25. Fig. 16. b. c. c.

cipua inferitur tendineo extremo offi primo digiti minimi (*e*), capfæ articuli pertinaciter adhærens.

Flectit primum os digiti minimi deorfum.

INTEROSSEI INTERNI PEDIS. PRIMUS DIGITI TERTII (*a*), *QUARTI* (*b*), *QUINTI* (*c*).

Primus digiti tertii oritur a pofteriore parte marginis inferioris illius lateris offis metatarfi tertii, quo refpicit pollicem (*d*); tendo inferitur inferiori parti illius lateris capitis primi offis primi ordinis digiti tertii, quo id pollicem fpectat (*e*). —— Primus digiti quarti incipit a pofteriore parte marginis inferioris illius lateris offis metatarfi quarti, quo refpicit pollicem (*f*); ut & a ligamento Peronei longi tendinem in planta retinente (*g*); tendine fuo inferitur inferiori parti illius lateris capitis primi offis primi ordinis digiti quarti, quo id pollicem fpectat (*h*). —— Primus digiti quinti oritur a pofteriore parte marginis inferioris illius late-

(*e*) Albin. Tab. 25. Fig. 16. d. e. Fig. 15. f. g.
(*a*) Albin. Tab. Mufcul. 25. Fig. 4. l m. m. n. o. p.
(*b*) Id. Tab. 25. Fig. 4. f. g. g. h. i. k.
(*c*) Id. Tab. 25. Fig. 4. a. b. b. c. d. e.
(*d*) Id. Tab. 25. Fig. 4. m. m.
(*e*) Id. Tab. 25. Fig. 4. o. p.
(*f*) Id. Tab. 25. Fig. 4. g. g.
(*g*) Id. Tab. 10. Fig. 21. W. P.
(*h*) Id. Tab. 25. Fig. 4. i. k.

lateris ossis metatarsi quinti, quo respicit pollicem (*i*), ut & a dicto ligamento (*k*); desinitque ad inferiorem partem illius lateris capitis primi ossis primi ordinis digiti quinti, quo id pollicem spectat (*l*). Capsis articulorum pertinacissime adhærent; dant etiam aponeurosem, antequam finiant, quæ se cum illa Lumbricalis conjungit, & adjungit Extensorum tendini.

Flectunt digitos pollicem versus, simulque aliquantum in inferiora; flectunt articulum eorum cum metatarso.

INTEROSSEI EXTERNI PEDIS. PRIMUS (a) ET SECUNDUS (b) DIGITI SECUNDI. SECUNDUS TERTII (c). SECUNDUS QUARTI (d).

Primus digiti secundi incipit, capite crassiore, a plusquam dimidia posteriore parte illius lateris ossis metatarsi secundi, quo primum spectat (*e*), capite tenuiore, tendineo, a superiore parte mucronis ossis cuneiformis magni, qui

(*i*) Albin. Tab. 25. Fig. 4. b. b.
(*k*) Id. Tab. 10. Fig. 21. S. N.
(*l*) Id. Tab. 25. Fig. 4. d. e.
(*a*) Albin. Tab. Muscul. 25. Fig 2. t. u. u. v. w. x. y. z. α. Fig. 3. r. s t. u. v.
(*b*) Id. Tab. 25. Fig. 2. n. o. o. p. q. q. r. s. Fig 3. l. m. n. n. o. p. q.
(*c*) Id. Tab. 25. Fig. 2. g. h. h. i. k. k. l. m. Fig. 3. f. g. h. i. k.
(*d*) Id. Tab. 25. Fig. 2. a. b. b. c. d. d. e. f. Fig. 3. a. b. c. d. e.
(*e*) Id. Tab. 25. Fig. 2. t. u. u. Fig. 3. r. u.

qui, offi metatarfi primo, fecundoque infertus (*f*); tendo inferitur inferiori parti illius lateris capitis primi offis primi ordinis digiti fecundi, quo pollicem fpectat (*g*). — Secundus digiti fecundi oritur capite craffiore a plusquam dimidia pofteriore parte medii lateris offis metatarfi tertii, quo fpectat fecundum (*h*); tenuiore a pofteriore parte lateris offis metatarfi fecundi, quo tertium refpicit, & quidem ab inferiore parte eminentiæ oblongæ, quæ per latus illud porrecta (*i*); tendo definit ad inferiorem partem illius lateris capitis primi offis primi ordinis digiti fecundi, quo fpectat tertium (*k*) — Secundus tertii digiti procedit, capite craffiore fere a plus quam dimidia pofteriore parte longitudinis lateris offis metatarfi quarti, quo refpicit tertium (*l*), capite tenuiore a pofteriore parte marginis inferioris lateris offis metatarfi tertii, quo refpicit quartum (*m*); inferitur inferiori parti illius lateris capitis primi offis primi ordinis digiti tertii, quo fpectat quartum (*n*) — Secundus digiti quarti incipit, capite craffiore a plus quam dimi-

(*f*) Albin. Tab. 25. Fig. 2. w. x. y.
(*g*) Id. Tab. 25. Fig. 2. z. *a*. Fig. 3. v. w.
(*h*) Id. Tab. 25. Fig. 2. n. o. o. Fig. 3. o.
(*i*) Id. Tab. 25. Fig. 2. p. q q. Fig. 3. n. n.
(*k*) Id. Tab. 25. Fig. 2. r. s. Fig. 3. p. q.
(*l*) Id. Tab. 25. Fig. 2. g. h. h.
(*m*) Id. Tab. 25. Fig. 2. i. k. k. Fig. 3. h.
(*n*) Id. Tab. 25. Fig. 2. l. m. Fig. 3. i. k.

midia posteriore parte lateris ossis metatarsi quinti, quod est e regione quarti (*o*), tenuiore a posteriore parte marginis inferioris ossis metatarsi quarti, quo respicit quintum (*p*), ut & a ligamento, quod tendinem Peronei longi in planta retinet (*q*), & inseritur tendo inferiori parti illius lateris capitis primi ossis primi ordinis digiti quarti, quo spectat quintum (*r*).

Flectunt digitorum principium a pollice, simulque aliquantum in inferiora.

(*o*) Albin. Tab. 25. Fig. 2. a. b. b.
(*p*) Id. Tab. 25. Fig. 2. c. d. d. Fig. 3. c.
(*q*) Id. Tab. 10. Fig. 21. U. P.
(*r*) Id. Tab. 25. Fig. 2. e. f. Fig. 3. d. e.

SERIES REGIONUM,

QUAS MUSCULI OCCUPANT.

INDEX MUSCULORUM.

Ge-

Eum-

Rec-

FINIS.

Apud P. v. d. EYK et D. VYGH, Proſtant

Eduardi Sandifort Obſervationes Anatomico-Pathologicæ Lib. I. II. III. IV. Lugd. Bat. 1777. 1778. 1779. 1781.

——— ——— ——— Tabulæ inteſtini Duodeni. Lugd. Bat. 1780.

——— ——— ——— Icones herniæ inguinalis congenitæ. Ibid. 1781.